



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines


Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



1335

pl. 3.

Soc. 3974 e. $\frac{171}{7}$






VERHANDELING
VAN HET
PROVINCIAAL
UTRECHTSCH
GENOOTSCHAP
VAN
KUNSTEN
EN
WETENSCHAPPEN.
ZEVENDE DEELS
EERSTE STUK.



Te UTRECHT,
Bij DE WED. S. DE WAAL EN ZOON,
Drukkers van het Provinciaal Genootschap
1793.



A N T W O O R D
O P D E
V R A A G,

VOORGESTELD DOOR HET
PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP
VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

„ Welke is de aart van de Rhachitis, of zogenaamd
„ Engelsche Ziekten: welke zijn de Redenen, dat men
„ de eerste beginzelen zelden na het derde Levensjaar
„ der Kinderen bespeurt? Welke zijn hare kenmerken:
„ Welke is hare Voorzegging? Kan men ze door eenige
„ middelen voorkomen? Zo ja; door welke? Welke zijn
„ de beste Middelen tot hare genezing”?

D O O R
JOHANNES VEIRAC

M. D. enz. te Rotterdam.

ONDER DE ZINSPREUK

*Ware roem is roem bij God,
Maar niet bij Menschen Kinderen.*

G E L L E R T.

Waarom eene Goude Medaille is toegewezen.



VERHANDELING
OVER DE
ENGELSCH E ZIEKTE.

VERDEELING.

*Ter Verdeelinge dezzer Verhandeling' erlangen
wij, uit de Vraag, eene geschikte aanleiding:*

*Het eerste Hoofdstuk zal het onderzoek van den
aart der RACHITIS, of zoogenaamde ENGEL-
SCHE ZIEKTE, bevatten.*

Het tweede zal handelen over hare Oorzaken.

*Het derde zal de Reden, waarom men derzelver
eerste beginsels zelden na het derde levensjaar be-
speurt, onderzoeken.*

Het

VERDEELING.

*Het vierde zal spreken van de Kenmerken d
Ziekte.*

Het vijfde van hare Toevallen.

Het zesde van hare Gevolgen.

Het zevende van haare Voorzegging.

*Het agtste zal de Vraag onderzoeken, of
die Ziekte door eenige Middelen kan voorkomen
Zo ja; door welken?*

*Het negende zal de beste Geneesmiddelen me
aanwijzen.*

VERHANDELING

OVER DE

ENGELSCH ZIEKTE.

EERSTE HOOFDSTUK

Van den Aart der Ziekte.

§ I.

De aart eener Ziekte bestaat in dat geen, waar door zij onderscheiden is van alle anderen, en waar van de bepaling derzelve wordt afgeleid. — Wij zijn dus in de onvermijdelijke verpligting, om die onderscheidingen op te zoeken en aan te wijzen. — Ten dien einde zal ik die eigenschappen verzamelen, waar door de *Rachitis* (welke ik, in het vervolg, altijd den naam van *Engelsche Ziekte* zal laten be

A

hou-

houden) van die Ziekten, welken meest met dezelve overeenkomen, eigenaartig onderscheiden is.

De Engelsche Ziekte heeft de meeste overeenkomst met eene soort van Uitteeringen, welke den jongen kinderen eene langzame kwijning en doorgaands den dood veroorzaakt; — doch uit de navolgende bijzonderheden zal de verschillende geartheid dier Ziekten duidlijk genoeg blijken.

Voor eerst: de Engelsche Ziekte is nooit aangeboren; het geen van de Teering (*Marasmus*) niet altijd doorgaat. — Meermalen zag ik een kind dit gebrek ter waereld brengen, en daar door sukkelende sterven.

Ten tweeden: Beiden behooren zij op de lijst van die der Kinderen, maar dit verschil bestaat men de beginfels der Teering reeds zeer kort na de geboorte; doch de eerste blijkbare teekens der Engelsche Ziekte verneemt men zelden voor het einde des eersten Jaars. — De Teering verschijnt bij veele na het derde jaar en later; doch bijna nooit vertoont de Engelsche Ziekte zig als dan, in hare eerste verschijning.

Ten derden: Beider oorzaken, teekenen, toevallen, gevolgen, gronden van voorzeggings, voorkoming en geneeswijze, zijn, in veele opzigten, zeer onderscheiden, gelijk in het vervolg, met opzet, zal bewezen worden.

Een

Een oplettend Lezer zal (dit gevoel ik duidelijk) met deze algemeene teekenen van onderscheiding niet voldaan zijn. — Hij vordert middelen; om de Engelsche Ziekte alzoo te kunnen bepalen, dat hare natuur daar uit overtuigend blijkt; — doch hier omtrent eischt de voorzigtigheid eenigen aandacht. —

De meeste Schrijvers en Waarnemers waren omtrent de helft der voorgaande eeuw, toen men deze Ziekte voor de eerste maal, in Engeland ontdekte, met GLISSONIUS van gevoelen, dat hare natuur in eene vochtige koude ontaarting van het bloed moest gezocht worden, wanneer zij tevens een gebrek onderstelden, waar door de Zenuwen van het Ruggemerg gezegd werden beledigt te zijn, terwijl zij tevens bewaarden, dat de Zenuwen des Hoofds onbeledigt waren. — Hier uit verklaarden zij de toevallen en gevolgen: — Ook daar op steunde hunne Geneeswijs. — Daar na hebben velen den aart dezer Ziekte in eene Scheurbultige kwaadsappigheid gezocht. — Sommigen stelden eene Venerieke verdunning van het bloed. — Eenigen voegden het een en ander samen. — Anderen namen de toevlugt tot verstoppingen in het hoofd, of de ingewanden en klieren des buiks, of tot eene gebrekkige voeding, en dergelijke, meer of min oppervlakkige en ongegronde, meest al onbewezen, gissingen.

§ I I.

Wij zullen minst afwijken van de geschikste orde, wanneer wij op deze wijs te werk gaan, namelijk: dat wij *eerst*, eenige, ter zake dienende, aanmerkingen voordragen; — *daarna*, van dezelve gebruik maken, om de ware, en van alle andere Ziekten onderscheiden, geaardheid der Engelsche Ziekte te doen kennen; — en *eindelijk*, de bepaling van de natuur dezer Ziekte, als bij een wettig besluit uit het voorgaande, opgeven.

§ I I I.

De voorloopige *Aanmerkingen* zijn dezen.

Eerste Aanmerking.

Een Kind, het welk zonder Zog of Melkpappen opgevoed is, zal nooit door de Engelsche Ziekte aangetast worden.

De zeldzaamheid van de voorbeelden, ten bewijze van deze stelling, zal den Lezer dezelve met schroom doen instemmen: — dit kan zijn; maar ik bedien mij van deze Aanmerking, om dat ik er grond toe heb. — Trouwens, kunnen meenigvuldige ontdekkingen van eene, meer dan vijftwintigjarige, be-

beoeffening ~~eener~~ uitgestrekte Praktijk, eenig vertrouwen vorderen, dan meen ik, dat mijn gezag iets beteekend: — daar op durf ik te sterker aandringen, om dat mij dit, en verscheiden der overige Leden van ons Vraagstuk, jaren lang hebben bezig gehouden.

Verscheiden Kinderen, van zwakke Ouderen geboren, en opgekweekt op eene wijze, en in zulke gedeelten van dit Land, die tot de aanleidende oorzaken dezer Ziekte behooren, of daar toe medewerken, zijn mij voorgekomen; welke Kinderen echter geen schijn of schaduwe derzelve vertoonden.

Een oplettende navorsching van dit verschijnsel gaf geene andere voldoende reden aan de hand, dan, dat die Kinderen enkel met Water- en Bierpappen gespijst, en voorts met Vleesch opgevoed waren. — Deze ondervinding wordt belangrijker, door de opmerking, dat andere Kinderen, met het Zog van derzelve moeders gevoed, meer of min onder die ziekte lijkelden. — In mijne nabuurschap is een tamelijke uitgestrekte streek lands, alwaar de Boerinnen, vrij eenparig, ongenegen zijn om haar kroost te zogen, maar het zelve liever verkiezen met Waterpappen en gemeen Brood te voeden. — Schoon ik, bijna twintig jaren, op de gevolgen van die opvoeding gelet heb, is mij nochtans nimmer, onder de kinderen, een eenige voorgekomen, welke

iets van de Engelsche Ziekte te lijden had. — Dit weten deze Moeders, en even deze gelukkige uitflag dier opvoedinge is eene der drangredenen, waarom zij de Zóging verwerpen, te meer, daar zij door de ervarenis onderriocht worden, dat de Engelsche Ziekte onder hare medelandbewoneressen, of liever hare afstammelingen, welken door de Moedermelk of Melkpappen opgekweekt zijn, niet zeldzaam is.

Tweede Aanmerking.

Indien het Zog niet strookt met de verteeringkrachten van den Zuigeling, wordt daar door dikwerf het Zuur vermeerderd, en de Engelsche Ziekte veroorzaakt.

Dit heeft zelfs plaats in het omgekeerde geval, te weten, wanneer de Zoogster te zwak, of te sterk, en haar Zog te teeder, of te stevig is, in vergelijking van de krachten van het Kind.

Het zou minder moeilijk, dan nutteloos zijn, om deze stelling, uit mijne eigen ervarenis, proefondervindelijk te staven. — Laat mij slechts verzekeren, dat zij op een aantal waarnemingen steunt, en laat ik mij voorts beroepen op de beproefde-ondervinding van kundige en oplettende Geneesheeren, en het zal onnoodig zijn, om hier over verder uittewijden.

Der-

Derde Aanmerking.

Kinderen, die, na hun eerste levensjaar, iets vroeger of later, blijken vertoonen van de Ziekte, zijn vooraf onderhevig geweest, of worden als nog afgemat, door eene Zuure scherpte in de Maag en Darmen, en door de toevallen eener dergelijke ontaarting van het Bloed, zoo dat zelden een Kind, zonder dit voorafgegaan, of nog aanwezig, Zuur, door de beginsels der Engelsche Ziekte aangetast wordt.

De nauwkeurigste onderzoeking heeft mij het tegendeel slechts in zeer weinige gevallen getoond.

Deze aanmerking behoudt hare kragt, of schoon een Lijdertje, al ware het een Jaar na de speening, ziek werd, het geen op reden, naderhand aantewijzen, gegrond is.

Vierde Aanmerking.

De Engelsche Ziekte gaat, in haar eerste begin, altijd gepaard met de teekenen eener Zuure scherpte in het Bloed; en de daar van afgescheide vóchten, zoo wel als van die der Zuture vergooringe in de eerste wegen, dat is, in den Mond, de Maag en de Darmen.

Dit blijkt uit de fletschheid des aangezichts, ge-

paard met Zuure Brakingen, eenen heeten Zuuren Adem, vergoorde kappelachtige, of donker bruine, zuurftinkende Afgangen, Sprouw, Uitflag op den huid, en dergelijke toevallen, welken nimmer, op die wijs, door eene loogzoute, of andere fcherpte, veroorzaakt worden. — Dit zal, bij de overweging der toevallen, nader blijken.

Vijfde Aanmerking.

Indien deze teekenen en toevallen van het Zuur niet voorgegaan, of tegenwoordig zijn, dan zal de zwakheid der kinderen, hoe aanmerkelijk die ook bij deze Ziekte zij, hen wel eene voorgeschiktheid tot de Uitteering, waar van wij te voren gesproken hebben, maar nimmer van die, welke zig doorgaans bij de Engelsche Ziekte voegd, verschaffen.

Zesde Aanmerking.

Het zoo eeven gezegde heeft ook plaats ten aanzien der gevolgen van deze Ziekte, welken aan geene andere oorzaken, dan aan een Zuur bederf van het voedende gedeelte des Bloeds, met eenigen schijn van regt, kunnen toegeschreven worden.

Zevende Aanmerking.

Zaken , welken den gemeenen man ten nutte moeten dienen , kunnen hem niet genoeg geëin-
nerd worden , voor al ten aanzien der gronden ,
op welken die zaken steunen. — Daarom zeg
ik nog eens , het geen ik naderhand , ter gepas-
ter plaats , zal bevestigen : dat de wijs van voor-
behoedinge en genezing der Engelsche Ziekte ,
schoon zij beiden de versterking des Lijders , als
medewerkende hulpmiddelen , bedoelen , echter
allerbijzonderst tegen eene Zuure kwaadzappigheid
moet ingerigt worden. — De verschijnsels en
gewrochten , in en na eene meergevorderde Ziekte ,
of welken hunnen oorsprong aan andere bijkomen-
de oorzaken verplicht zijn , kunnen onse tegenwoor-
dige Aanmerkingen niet verzwakken. — Wij stem-
men nu , bij voorraad , zeer gaarne toe , dat de
tegenzuurige geneeswijs , in alle graden der Engel-
sche Ziekte , echter altijd in haar eerste begin ,
meest te pas komt.

Agtste Aanmerking.

Ten opzichte der bovenstaande Aanmerkingen
zal men , mischien , de ontdekkingen in lijkjes van
Kinderen , onder de Engelsche Ziekte gestorven ,

tegenwerpen. — Het zal onnut zijn, om die waarnemingen hier te laten volgen, om dat ik, zonder eenigen schroom, de strijdigheid dier ontdekkingen met mijne grondslagen toesta.

Maar die tegenwerping is, ten minsten, onzeker. — De Engelsche Ziekte is, in haar begin, zoo zacht van aart, dat zij, uit zich zelve, nooit den dood veroorzaakt. — Ja, ik heb de Engelsche Ziekte, als zoodaning, en in het afgetrokken van derzelver gevolgen beschouwd, zelfs in haren hoogsten graad, nooit doodelijk gevonden. — Bijkomende omstandigheden kunnen hier in eene aanmerkelijke verandering te weeg brengen. — Ik zag dit te dikwils, om 'er aan te twijfelen; — Maar is men dan niet in gevaar, om het geen in de lijken ontdekt wordt, aan valsche oorzaken, aan de Engelsche Ziekte, en niet aan de bijgekomen omstandigheden, of de uitwerksels van de toevallen der Ziekte, toeteschrijven, en alzoo eene tegenwerping, die op eenen valschen grond steunt, te vormen? — Stelt men echter, ondanks het gezegde, eenigen prijs op die tegenbedenkingen, dat zig mijn Kunstbroeder dan verledige, om alle de waarnemingen van dien aart, met den inhoud dezer Verhandeling, betrekkelijk tot de naaste oorzaak der Engelsche Ziekte, te vergelijken, en hij zal, vertrouw ik, mijn gevoelen beämen.

Nie-

Niemand echter moet, op gronden mijner stelling, eene beginnende Engelsche Ziekte verzui-
men, want zulk een besluit zou zeer valsch zijn. —
Ik herhaal, dat deze Ziekte, hoe zacht van aart,
aan zich zelve gelaten, de vochten en vaste deelen in dier voegen kan ontaarten, dat de gevolgen gevaarlijk, zelfs doodelijk, kunnen zijn; —
Doch indien men die ontaarting tegen mijne stelling, nopens den waren aart der naaste oorzaak van de Engelsche Ziekte, wilde doen dienen, dan zou men eene ongerijmdheid staande houden, welke lijnrecht strijdig is tegen de regels eener gezonde redeneeringe.

Het is wijders mogelijk, dat de oorzaak van de weekwording der beenderen, welke na den dood allerduidelijkst blijkt, als eené strijdigheid tegen mijn denkbeeld, aangemerkt worde.

Hier omtrent zal ik mij, in het vervolg, duidelijk genoeg verklaren, terwijl ik nu, als in het voorbijgaan, stel, dat die weekwording der beenderen en kraakbeenderen, waarschijnlijk, haren eersten grondslag, doch nimmer haren voortgang, aan de naaste oorzaak onzer Ziekte, dat is aan de Zuure scherpte des bloeds, verplicht is. — De ontaarting van het geene die deelen voedt, eenmaal bestaande, zal dit gebrek van voeding en verharding toenemen, al ware de werkoorzaak der
En-

Engelsche Ziekte volkomen uitgerooid. — Hoe weinig kan dan het besluit, van het geene in dergelijke lichamen gevonden wordt, gelden tot de naaste oorzaak der Engelsche Ziekte? —

§ I V.

Ik zal echter de bovenstaande Aanmerkingen met eenige Proeven staven.

Eerste Proef.

Een Kind van anderhalf Jaren stierf aan de Roodvonk, na dat het zelve, zedert vier maanden, met de Engelsche Ziekte was gekweld geweest, en de zelve tot die hoogte was geklommen, dat de uitgebreidheid van het hoofd de natuurlijke grootte verre overtrof, de buik aanmerkelijk opgespannen, arm - scheen - en kuitbeenderen eenigzins gekromd, en de knokjes aan de handen en voeten uitgezet waren.

Terstond na den dood verzamelde ik een gedeelte van het bloed. — Een weinig van het zelve, met overgehaalden azijn gemengd, onderging geene verandering. — In andere gevallen, bespeurt men eene ligte gisting.

Bij een ander gedeelte van dit bloed vermengde ik

Ik even zoo veel Geest van Ammoniak. —

Deze mengeling, even laauw gemaakt, vertoonde eene ligte opbruisching, en gaf eene zuurachtigen reuk, het geen nooit plaats heeft, wanneer de proef met het bloed van andere lijken genomen wordt.

Tweede Proef.

Hoe weinig vertrouwen op die proeven na den dood genomen, moge gesteld worden, meende ik echter de gelegendheid niet te moeten verzuimen, om eenige Scheikundige waarnemingen te doen op de beenderen, kraakbeenderen, het merg, en de geleiding-klieren van het zelfde lijk, in hoop van, door dezelve eenige nadere inlichting, ter ontdekkinge van de oorzaak van de belemmerden groei en de stevigheid der beenderen, te zullen verkrijgen, ten minsten iets zekerers, ten aanzien van den waren aart der Engelsche Ziekte, te kunnen navorschen. — Om hier in des te beter te flagen, nam ik even dezelfde proeven, met dezelfde deelen van een ander lijkje; ook met de Pis, de Kwijl en het Braaksel van levende kinderen. — Ik mag verzekeren, dat deze proeven met de meeste oplettendheid genomen zijn.

Dan, alles wel overwogen zijnde, zal eene korte

voor-

voordragt van den uitslag dezer Proeven voor den gemeenen Lezer verkieslijker zijn, dan een omslachtig verhaal van haare gantschen toedragt, welken ik echter, bij betere gelegenheid, niet ongenegen ben, bekend te maken. — Het kwam dan hier op uit. —

Voor Eerst, dat de vochten van een Kind, met de Engelsche Ziekte gekweld, eene Zuure geaartheid bezitten; — want Vlugzoute bijvoegfels bragten eene blijkbare gisting te weeg, gepaard met eenen Zuurachtigen damp.

Ten Tweeden; Even dit bleek uit de Proeven, genomen met het Merg der beenderen en de Klier-vochten der geledingen; in dier voegen, dat de kraakbeenen van een jong lijk, in een plantäartig zuur, onder eene natuurlijke warmte des ligchaams gestoofd, weeker en buigzamer werden, dan zij te voren waren. — Men moet, op dat deze waarneming niet mislukke, de hoeveelheid van het Zuur juist bepalen.

Ten Derden: de Proeven met Vlugzouten, op dezelfde wijs genomen, toonden duidelijk het regendeel: zoo dat de kraakbeentjes van het bovengemelde, onder de Engelsche Ziekte gestorven, Kind, harder werden, dan zij waren, en die van een ander, van die Ziekte vrij, daar door geene verandering ondergingen. — Ik heb mij, in dit ge-

val, altijd van den vluggen geest van Amoniak-zout bediend.

Ten Vierden: Ik heb ook de Kraakbeenen, het Gebeente en het Merg van eenige, aan de Uitteering, of aan Venus-smet gestorven, Kinderen beproefd, en ik heb daar door geleerd, dat de kwaadspappige natuur der vochten bij dezelve, blijkens die proeven, niets met den aart der Engelsche Ziekte gemeen heeft.

Ten Vijfden: De aart van het Zuur, indien ik mij niet bedrieg, strookte meest met die, gelijk ik zoo even aanstipte, van een zacht plantiaartig Zuur: — Een denkbeeld, waarin ik, door nadere proeven, volkomen gesterkt ben.

§ V.

Ik begeer niet, dat men op deze Proeven meer prijs stelle, dan zij verdienen, want wilde ik uit dezelve gewisse gevolgen trekken, dan zou dit tegen mijne bovengemelde gronden strijden; — zij zijn echter, mijns erachtens, niet geheel nutteloos, om eenig steunfel aan de, straks gegeven, Aanmerkingen te verschaffen.

Zij, die den waren aart der Engelsche Ziekte in eene Zuure scherpte niet willen gezocht hebben, maar dezelve beweeren in eene Scheurbuikige, of

Ve-

Venerieke kwaadfappigheid te bestaan, brengen de wijs van genezing, geenzins tegen het Zuur, maar tegen de laatstgemelde scherptens ingericht en gelukkig volbragt, ter ondersteuninge van hun denkbeeld bij.

Schoon wij hier te voorbarig van de herstelling zouden handelen, kan ik nochtans mij niet ontslaan, om deze tegenwerping optelosfen. — Niemand ontkent, dat de Engelsche Ziekte somtijds, en, laat mij zeggen, meestal, zoo zachtaartig is, dat zij, zonder gevolgen en geneesmiddelen, door den tijd slijt. — Ook niet, dat deze Ziekte zeer dikwils met andere ongesteldheden der vochten verzeld is, welke de toevallen der Engelsche Ziekte kunnen doen voortduuren, of schoon derzelver naaste oorzaak opgeruimd is. — Van de herstelling dier toevallen hebben sommige Artzenijen den grootsten titel van specifieke middelen tegen de Engelsche Ziekte, ten onrechte verkregen.

Bevroedt gij nu noch de zwakheid der tegenwerping niet? beschouw dan een Lijdertje, het welke onder de gevolgen eener overgeërfde besmettelijke Ziekte kwijnt, terwijl het zelve daarenboven onder de Engelsche Ziekte gebukt gaat. — De Arts behandelt dit kind ten tijde, wanneer Natuur of Kunst de naaste oorzaak der Engelsche Ziekte overwonnen heeft. — Hij slaagt niet met
de

de genezing' der gevolgen, welken Hij nog aan de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte toeschrijft. — Met het zelfde denkbeeld beproeft Hij andere Middelen: — Hij doet dit op het gezag van dezen of geen en waarnemer: — Hij geeft zijn Lijdertje de Kwik — het herstelt! — Vraag nu, of dit besluit doorgaat: „ Dit kind is van de Engelsche „ Ziekte genezen, door Middelen, welken eigent „ aartig ingericht zijn tegen de Venusmet: — „ bijgevolg bestaat de naaste oorzaak der Engelsche Ziekte in eene Venerieke ontarting van het „ bloed.” — neen; — de Arts is bedrogen. — De Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte had geen bestaan meer, en de Kwik heeft het kind van een Veneriek bederf genezen.

Anderen willen, dat de aart der Ziekte alleen in de vertlapte Veërkragt der vezelen bestaat. — Zij gronden hun stelsel op de genezing der Ziekte, door Staal — of andere Versterkende Middelen; — maar, behoudens de waardij van voortgelijke Middelen en leefwijze, ten regten tijde gebezigd, meen ik te moeten beweerē, dat dergelijke behandeling, gelijk in het vervolg blijken moet, eigenlijk ingericht moet worden tegen de Zwakheid, welke de Engelsche Ziekte verzeld, of na dezelve overblijft. — Op die wijs zou men zich dikwerf, ten onregte, beroemen. — Of bestaat eene Rot-

ziekte alleen in de Zwakheid der Vezelen , omdat de Lijder , na dat de rotting gestuit is , door den Koortsbast en Wijn , nieuwe kragten krijgt ?

Men voelt de zwakheid van dergelijke tegenwerpingen al te duidelijk , om 'er ons langer mede optehouden. — Wij zullen liever onze voorloopige Aanmerkingen en Proeven nader tot ons oogmerk bezigen.

§ V I.

Dit bevat het *tweede gedeelte* van ons tegenwoordig bestek (§ III.) het welk tevens strekken moest ter nadere aanduidiging' der eigenaartige onderscheiding' van de Engelsche — en alle overige Ziekten.

Dan , hier opend zich een onöverzienlijk veld. — Zou dit de ware bedoeling des Genootschaps zijn? — Zou het zelve dan niet bij den gemeenen man eene vatbaarheid begeeren , welke in dit antwoord niet kan worden ondersteld ; zelfs niet , al bepaalden wij ons alleen tot de Ziekten , welke het naaste met de onze strooken? — Neen , wij vermeenen het gezegde liever onder een korter gezichtpunt te moeten trekken , om daar na het besluit , bij wettige gevolgen , te kunnen opmaken.

Voor Eerst : De Engelsche Ziekte is zoo volstrekt

trekt eene Ziekte der Kinderen, dat daaromtrent geene uitzondering kan gemaakt worden.

Ten Tweeden: Dezelve bepaalt zich, ook zonder uitzondering, aan eenen zekeren Leefstijd, zoo dat de eerste beginsels zelden voor het eerste, en na het derde levensjaar, zich duidelijk vertoonen.

Ten Derden: Nooit valt zij in kinderen, welken niet met Zog, of Melkpappen gevoed zijn.

Ten Vierden: Weinige Lijdertjes worden door de Engelsche Ziekte aangetast, bij welken zich de toevallen van een overheerschend Zuur in de Maag en Darmen vooraf niet vertoond hebben. — Nu en dan heb ik echter het tegendeel opgemerkt.

Ten Vijfden: De Huid dezer kinderen is veelal, meer, dan bij anderen, geneigd tot Uitwaaseming en Uitslag.

Ten Zesden: Onze Aanmerkingen toonden datdelijk, en uit onze Proeven geven wij vrijheid eenigzins te gissen, dat de vochten, vooral het Weiächtige gedeelte van het bloed of liever dat gedeelte der vochten van het Lijdertje, (het welk onder de Ziekte kwijnt) door het welk anders de voeding en waschdom der vaten, zoo wel als de behoorlijke verversching der vloeibare deelen, geregeld voortgaat, zoo lang de naaste oorzaak der Engelsche Ziekte bestaat, eene scherpte bezit, waar door de regelmatigheid, op verschillende wij-

zen gebroken werdt; — als mede dat die fcherp-
te eene Zuure of Zuurachtige, natuur heeft.

Ik erken, dat de Klasse der Zuuren verscheiden
soorten bevat; — maar noch hier, noch elders
in dit antwoord, kan men daar omtrent een gezet
onderzoek verwachten. — Het zij genoeg te
hebben herhaald, dat deze fcherpte eene Zuure
Plantaartige eigenschap vertoont, terwijl eene meer
snipperachtige bepaling derzelve blijken zal onnut
te wezen.

§ V I I.

Nu kunnen wij aan de Vraag: *Welke is de
natuur der Engelsche Ziekte?* beter voldoen dan
te vooren, en daar door ook het *derde oogmerk*
van dit Hoofdstuk (§ II.) bereiken.

Wij bepalen dan de *Engelsche Ziekte*, opzigte-
lijk haren Aart, in onderscheiding van alle overige
Ziekten, „ dat zij bestaat in eene, door het Zog,
„ of andere Melk, veroorzaakte Scherpste des Bloeds
„ in 't gemeen, doch bijzonder van dat gedeelte
„ deszelven, waar door de wording, groei en ste-
„ vigheid der Kraakbeenderen, van het Gebeente
„ en deszelfs Hoofden, bij kinderen tuschen hun
„ eerste en derde levensjaar, op verschillende wij-
„ zen belemmerd en vertraagd worden, of onor-
„ de-

„delijk geschieden, terwijl het Lijdertje tevens in „eenen zwakken en kwijnenden toestand geraakt.”

Deze bepaling, aangedrongen met het geene boven (§ VI.) gezegd is, kan op geene andere, dan de Engelsche Ziekte, met eenig recht, worden toegepast. — Dit erkend elk bedreven Geneeskundige; en in deze erkenenis zal de gemeene man, zonder verder onderzoek, gelieven te berusten.



TWEEDE HOOFDSTUK

Van de Oorzaken der Ziekte.

§ V I I I.

DE naaste oorzaak der Engelsche Ziekte is, door haren geheelen loop, een en dezelfde, het geen hij, die het voorgaande Hoofdstuk, met eenige aandacht gelezen heeft, reeds zal opgemerkt hebben. — Zij bestaat in eene *Zuure scherpte*, uit de *Darmen* opgeslurpt en onder het *Bloed* gebracht, waar door bepaaldelijk het *Weiüchtig gedeelte* zoodanig ontaart wordt, dat, door die ontaarting, en de noodzakelijke gevolgen daar van, de toevallen ontstaan, welken dezer Ziekte eigen zijn.

Uit deze oorzaak kunnen alle verschijnsels dezer Ziekte, gelijk in het vervolg blijken zal, worden opgelost. — Ik beroep mij daar op, bij voorraad,

raad, in vertrouwen, dat zulks beter strookt met de hoofdbedoeling, ten nutte van het algemeen, dan dat ik mijne stelling met een drom van schijngeleerde aanhalingen bekragtigte.

Men besluite echter, uit deze opgave der Naaste Oorzaak, geenzins, dat ik de beletzels van den ordenlijken waschdom en de stevigheid der Beenderen, in alle gevallen, in een Zuurachtig bederf van het Lijm, het welk de beenwording bevordert, of der Kalkaartige stoffe, welke het beenwezen verhardt, wilde gezocht hebben. — Het beken- de geval van Juffrouw *Suppiot*, en anderen, weder spreken dit. — Ook toont de ervaring te dikwijls, dat een Lijmige, Scheurbuikige, Venerieke kwaadsappigheid de beengroei stremmen kan; — dat de te rug gedreven boosaartige Etter van vuile Zweeren, en van de Kinderpokjes; dat de Mazelen Roodvonkige Ziektestoffen even dezelfde uitwerking deden.

Deze ondervinding heeft, mijns oordeels, ten onregte, eene gelegenheid verschaft aan verscheiden verdeelingen en onderdeelingen der Engelsche Ziekte, welken geene andere nuttigheid hadden, dan dat zij blijken gaven van een uitspattend, en niet genoeg onderscheidend vernuft; — Doch wij zoeken geen pleitgeding over zaken van dien aard, en verkiezen liefst altijd het oog te houden

op zaken, die met de geheele Vraag een onmiddelijk verband hebben. — Wij hebben alleen te doen met de Engelsche Ziekte en hare toevallen, gelijk zij zich bij kinderen, voor hun derde jaar, vertoonen, en geenzins met toevallen en gevolgen, welke ook uit andere oorzaken kunnen worden verklaard.

Het verder beloop van dit Antwoord zal mijne stelling van de *Naaste Oorzaak* ophelderen.

§ I X.

De *verwijderde Oorzaken* zijn: 1. de *Ziektezaden*; 2. de *Opwekkende Oorzaken*.

§ X.

De *Vatbaarheid*, de *Voorgeschiedheid*, of *Ziektezaden*, zijn: 1. de *Algemeene*, 2. de *Bijzondere*.

§ X I.

De *algemeene Vatbaarheid* bestaat in die eigenschap der Ingewanden en Vochten, bepaaldelijk van dat gedeelte derzelven, het welke ter voedinge strekt, door welke eigenschap de Wei, van het

het Zog, of andere Melk, gescheiden zijnde, door de opslurpende einden der Melkvaaten, door de Darmen allerwegen verspreidt, ingezogen en onder het bloed gebragt wordt. — Indien deze Wei eene Zuure geëärtheid erlangt en het voedende gedeelte der Vochten onttaart, dan is het eerste beginfel der Engelsche Ziekte gevormd.

Deze Vatbaarheid, uit het natuurlijk gestel des ligchaams vloeijende, is aan alle kinderen eigen, en daarom algemeen.

§ X I I.

De *Bijzondere Vatbaarheid* (§ X.) is die, waar door het eene kind boven het andere geschikt is, om door dezelfde oorzaken der Engelsche Ziekte beledigd te worden.

Ik zal dit onderwerp zoo veel besnoeijen, als deszelfs gewigt en uitvoerigheid gedogen.

Na eene bedaarde overweging van het geen de Reden, eigen Ondervinding en het gevoelen van mijne Voorgangeren, aan de hand gaven, ben ik volkomen overtuigd, dat deze Bijzondere Voorgeschiktheid eeniglijk moet worden toegeschreven aan eene meer dan gewone zwakke gesteldheid van het kind, beschouwd in verband met den aart van het Zog.

Laar ons deze stelling, eerst in het gemeen; daarna met betrekking tot de Engelsche Ziekte, onderzoeken.

§ X I I L

In het gemeen. — Een zwak gestel en verminderde veêrkragt der vaten geven de voedzels tijd en gelegenheid, om in hunne eigen geaartheid te verwandelen. — Zij worden noch naar behooren opgeslurpt, bereid, noch gekleinsd. — De Melk, in de Darmen te lang verpoozende, schift niet alleen, maar het kazige gedeelte bezet de Darmen, en brengt tooneelen van rampen te weeg. — De Wei erlangt eene prikkelende scherpte, en veroorzaakt gedurige, somtijds uitteerende, Afgangen of andere Ziekten. — Gemaakt de Wei onder het Bloed, en wordt dezelve aldaar niet naar eisch bereid, dan erlangt zij ook eene nadeelige scherpte, schadelijker naar gelang van de grootere slapheid der vaten, en meerdere verdunning van het bloed. — Hier uit ontstaan Ziekten, onderscheiden naar mate van het verschillende vermogen der Opwekkende Oorzaken, waar in tevens de reden te vinden is, waarom niet alle zwakke zuigelingen door de Engelsche Ziekte aangetast worden.

§ XIV.

§ X I V.

Wij zullen , ten nanzien der *Bijzonderheden* (§ XII. n. 2) met betrekking tot de Engelsche Ziekte , deze zwakheid uit de volgende oogpunten moeten beschouwen , en toonen : —

Eerstelijk : dat die zwakheid in vergelijking staat met het Zog.

Ten anderen : dat zij kan aangeboren zijn en plaats hebben , schoon het kind anders gezond is.

Ten derden : Zij kan door eene Ziekelijke gesteldheid der Ouderen , en , vooral van de Moeder aan de Vrucht medegedeelt worden ; en

Ten vierden : Ook kan zij , door verscheiden Ziekten , na de geboorte , veroorzaakt worden.

§ X V.

Wat *het eerste* betreft , Elk kind heeft zijne bijzondere verteeringkrachten , zoo dat het zelve gelukkigst gevoed wordt met zulk Zog , het welk geene meerdere krachten ter verteeringe vordert , dan de Zuigeling bezit , en niet te slap is om het kind te voeden.

Deze onderlinge Overeenkomst van het Zog en de Krachten van het kind , is zoo volstrekt noodig , dat het tegendeel met regt tot de Opwekken-

kende Oorzaken der Engelsche Ziekte mag betrokken worden.

Het Zog eener sterke Voedster kan, zoo ten aanzien van deszelfs Kazig als Weiächtig gedeelte, te lijk zijn voor een gezond kind. — Dit voedsel kan door gemis van kragten, niet behoorlijk verteerd worden; wanneer het geval niets verschilt van eenen bejaarden, welke voedzels nuttigd, die door zijne maag niet gemakkelijk verduwd worden. — Het zwaare stremfel blijft onverteerd hangen, terwijl de Wei gemakkelijk vergoort, of naderhand onder het bloed eene Zuure kwaadsappigheid brengt.

Ik heb de Engelsche Ziekte dikwils ontmoet bij kindertjes, bij welken, in dit opzigt, de oplettendheid verzuimd was.

Te zwak Zog verslapt het kind, door mangel aan voedsel; — doch de nadere overweging hier van moet in het vervolg voorkomen.

§ X V I.

Ten tweeden: Dat veele kinderen gezond, maar zwak ter waereld komen (§ XIV. n. 2) weer elk. — BUCHAN, wiens *Huishoudelijke Geneeskunde* in elks handen zijn moest, meent zelfs, dat men, in onzen leeftijd, meerdere gelegenheid heeft

heeft om van de waarheid dezer ondervindinge overreed te worden, dan in vroegere dagen, wanneer ook de reden, waarom de Engelsche Ziekte nu gemeener is, dan voormaals, gemakkelijk zou te vinden zijn; — doch of, behalven de bijkbare meerdere slapheid des ligchaams van de Ouderen, ook des Vaders uitgemergeld zaad, hier van de schuld heeft, laten wij voor rekening van den gemelden Engelschen Arts. — Zeker is het, dat de voeding in de Lijfmoeder eener zwakke zwan-gere, eene flappe vrucht doet vreezen.

Deze stelling is nochtans aan uitzonderingen onderhevig. — Of zien wij niet veeltijds welgespierde en doorvoedde kinders uit zwakke en teedere Ouderen voortgebracht?

Wij nemen hier de gelegenheid waar, om de schande en schade der Zelfbevekkig te gispen, en hen tot nadenken te vermanen, welke hunne liefdedriften, in het bloeijen der jeugd, op allerlei wijzen, gaande maken, en zich daar door onwillig bevekken. — Daar men thans zoo ijverig werkt, om de Vrijheid der Drukpersse te bepalen, moest men ten minsten zorgen voor het toeneemende bederf der jeugd, door wellustige boeken en prenten. — Dit in het voorbijgaan.

Dat de zwakke ligchaamsgesteldheid der kinderen in de daad tot de Voorgeschiedheid der Engelsche Ziek-

Ziekte behoord, kan men ook daar uit gissen, dat dezelve gemeener is in laage moerige water-achtige strecken, dan elders. — Trouwens, oplettende Waarnemers verzekeren, dat zij in Engeland, in het laage gedeelte van Duitschland, en in Holland, onder een gegeven getal kinderen, meer voorkomt, dan in hoogere en bergachtige landen. — In Parijs is de Engelsche Ziekte veel gemeener, dan in het hooge en drooge gedeelte van Frankrijk.

Het is ook niet zeldzaam, dat zwakke Moeders gezonde kinderen voortbrengen, die naderhand met deze Ziekte zukkelen. — Ik zag vijf van de zeven kinderen éener Moeder daar mede behebr. — Een Duitscher verzekert, elf kinderen van dezelfde Ouderen daar onder te hebben zien kwijnen.

De ervaring toont, eindelijk, dat bejaarde en luije, vadsige Ouders inzonderheid geschikt zijn, om de zaden der Engelsche Ziekte, zoo veel die in de zwakke gesteldheid des kinds gelegen is, aan hun kroost te verschaffen. — Zou daarom deze Ziekte minder gemeen zijn bij den noetsen landman, dan bij den loggen stedeling?

§ X V I I.

Ten derden: De gemeene ondervinding leert,
dat

dat Ziekelijke, of, door Ziekte, verzwakte Moeders, flappe kinderen reelen: Zulken, die daar door vatbarer zijn voor de Engelsche Ziekte, dan anderen (§ XIV. n. 3)

Hier toe behooren alle Ziekten, vooral zulken, welken de vaste deelen van de vrucht verzwakken, hare vochten verdunnen, of kwaadsappig maken. — Onder de *kortstondige Ziekten*, behooren hier toe alle *Ontstekingen*, zoo wel bijzondere, als inzonderheid, algemeene; als mede *Galkoortsen*, vooral wanneer het bloed in het bederf der Galle deelt. — In het eerste geval moet de Kunst het bloed verdunnen; in het laatste doet dit de Natuur, terwijl de Arts de bedreigde rotting weert. — In beide gevallen komt eene verslappende Genees- en Leefwijze te stude.

Tot deze Clasfen van Ziekten behooren ook de *Bloedstoringen*, vooral uit de Schede, welken, behoudens het leven van de vrucht, doch met verlies van derzelver kragten, somtijds zeer aanmerkelijk kunnen zijn. — Het verlies van veel Bloed laat, ten minsten gedurende eenigen tijd, flappe vaten en verdunde vochten na, waarin het kind noodzakelijk deelt.

Tot de *sleepende Ziekten*, of *langdurige ongesteldheden der Zwangeren*, waar aan wij hier gedenken moeten, betrekken wij voornamelijk de
hard-

hardnekkige voor- en najaars Koortſen, de Verſtoppingen der klieren, vooral van den buik, doorgaans verzeld van kwaadſappigheid, eenen uitmergelenden witten vloed, en dergelijke gevolgen van een vadzige leefwijze; het misbruik van meel- en erwetſpijzen, Viſch, zoete lekkernijen; geſnerkte Olie, warme water- en melk- dranken; van een laauwvochtigen dampkring: zulke Moeders leveren ſchier altijd zwakke kinders.

Voor al gedenke men aan die traage Ziekten, welken eenen dikwils wederkeerende ſcherpen witten vloed veroorzaken en uit het Venusſmet ontſtaan. — Ach! hoe dikwerf leerde de treurige ervarenis de rampen, welken de onſchuldige wichten hier van te dragen kregen! — Sommigen ontkennen eene overgeërfde Venerieke vochtsgeſteldheid; maar de ondervinding heeft mij te vaak de valſchheid der gronden van die ontkenning geleerd, om op dezelve eenigen prijs te ſtellen. — Het zoude mij weinig moeite koſten, om een betoog te leveren, ten bewijze van het beſtaan eener meenigte van Huidgebreken, en andere kwaadſappige Ziekten, welken alleen door Kwikmiddelen konden gedempt worden. —

Van de overige min gewone Ziekten, als zoo veele bronnen van zwakheid der kinderen, zal ik thans niet reppen, om dat het gezegde, mijns oordeels, kan volſtaan.

§ X V I I I.

Ten vierden : Deze Zwakheid wordt het kind, niet zelden, door verschillende voorafgaande Ziekten (§ XIV. n. 4) berokkend.

De Engelsche Ziekte verschijnt niet na het derde levensjaar, des wij van geene andere Ziekten behoeven te handelen, dan van zulken, welken in de drie eerste jaren voorkomen. — Dezen zijn :

Voor eerst : De gevolgen van kwaad Zog. — Om het kind, door het Zoogen te verzwakken, behoeft het Zog niet altijd eene Ziekelijke natuur te bezitten. — Wij hebben reeds aangemerkt, dat te stevig; zoo wel als te slap Zog, in vergelijking van de kragten van het kind, deze nadeelige hoedanigheid bezit.

Het eene, zoo wel als het andere, verwekt Zuur, en een taaije Koek in de teedere Darmen — gebrek van Voeding — Verzwakking.

De scherpe Wei veroorzaakt Brakingen, Buikpijnen, gestadige Afgangen en Stuipen : — Omstandigheden, welken de kragten verarmen.

Goor en Scheurbuikig Zog paart de Knagingen en Kwaadsappigheid met het verval van krachten.

Zog, met het Venusëuvel doordrongen, bederft het ganfche ligchaamsgeftel des Zuigelings, en

beneemt de gelegenheid van geschikte voeding en versterking. —

Ten tweeden : Het gaat door , dat de gevolgen van Kappel en Zuur altijd aan het Zog moeten worden toegeschreven.

Zeer zelden verduurt een kind de Melk zonder hinder. — Zeer velen zijn onderhevig aan het Zuur, ondanks het geschikste Zog: — Getuigen zijn de Walgingen, Verstoppingen, Hardlijvigheid, Brakingen, Buiknépen, Buikloop en Kwaadfappigheid, waar mede onze kinderen veeltijds worstelen. — Zou zulk een kind die zwakheid niet erlangen, welke tot de Zaden der Engelsche Ziekte behoort?

Ten derden : De Kinderziekte, de Mazelen, de Roodvonk, het Schurft en andere gebreken van de huid, kunnen afzonderlijk, of gezamenlijk eene hebbelijke Zwakheid veroorzaken.

Ten vierden : Men denke ook om het moeilijke uitbitten der Tandén, als eene wezenlijke oorzaak van meenigvuldige Brakingen en Buikloop, Pijnen, Koorden, Hoesten, Rusteloosheid, Stuipe, en wat verder in staat is, om de krachten te ondermijnen.

Ten vijfden : Hier toe behoort ook de Geelzucht, welke bij ons gemeener is, dan elders, die somtijds zeer hardnekkig is, of dikwils wederkeert,

keert, waar door de vochten ontbonden, en de voeding belemmerd worden, en veelerlei Ziekelij- omstandigheden, Sprouw, Waterzucht, enz. ont- staan.

Ten zesden: Allerhande soorten van Hoesten, als zulken, die uit enkele verkoudheid, en ande- ren, welken uit aandoenlijkheid der Zenuwen en eene besmettelijke eigenschap der Lucht, geboren worden.

Hoe de kinderen, door de stuipachtige aanval- len van den Kinkhoest, gefolterd en verzwakt wor- den, is bijna aan elk, die kinderen heeft, be- kend.

Ten zevenden: Dat soort van Teering, waar van ik in het eerste Hoofdstuk gewaagde, en die kenbaar is uit den dikken en harden buik, de ver- magering der onderste ledematen, en de verba- zende verzwakking.

Ten agtsten: Wij zouden, op deze lijst, verscheiden andere Ziekten der kinderen, beneden hun derde jaar, kunnen stellen, indien dezelve, of, om dat zij te zeldzaam zijn, geene plaats ver- dienen, of, om dat zij gevolgen zijn van de op- gemelde Ziekten, daar onder moeten begrepen wor- den.

Wie een breeder verslag hier omtrent begeert, kan zich tot het werk van den Heer VAN RO-

SENSTEIN en TISSOT vervoegen, terwijl de bekroonde Verhandeling van den Rotterdamschen Arts VEIRAC, over den Kinkhoest, en die van zijne mededingeren, verscheiden nuttige zaken, ten aanzien van dit onderwerp, bevatten.

Schoon ik deze Ziekten als Werköorzaken der Zwakheid, welken eene meerdere Vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte verschaft, heb opgegeven, zou echter het besluit, dat alle, door dezelve in hunne kragten verarmde, kinderen, door deze Ziekten aangetast worden, tegen de ervaring strijsten. — Hem, die dit beweerde, zou toch de dagelijksche bevinding logenstraffen.

§ X I X.

Na de opgave der *Naaste Oorzaak*, en een kort verflag der Ziektezaden, treden wij nu tot de overweging der *Opwekkende Schadelijke Vermogens* (§ IX. n. 2.)

Hoe overbodig gul schier allen, welken over de Engelsche Ziekte geschreven hebben, in de optelling der Opwekkende Oorzaken geweest zijn, meen ik echter, dat slechts *éene oorzaak* daar op billijke aanspraak heeft. — Deze is de *Wei van het Zog, of andere Melk*, mits de invloed derzelve in verband met de Ziektezaden beschouwd worde.

§ X X.

§ X X.

Om deze stelling te voldingen, dient het volgende.

Voor eerst: Men moet zich herinneren, het geen ten aanzien van het Zog en de Wei, als mede van derzelver verspreiding' te voren gezegt is, en niemand, die de Natuurkundige werking van ons ligchaam weet, onbekend kan zijn.

Ten tweeden: De aart der Ziekte, gelijk wij die betoogd hebben, kan uit geene andere Opwekkende Oorzaak verklaard worden.

Dit zij ook herinnert ten aanzien van derzelver Oorzaak, en het zelve zal ook blijken bij de overweging der Toeyallen.

Ten derden: Ecne, te voren reeds gemelde, waarneming zet mijn gevoelen die kragt bij, welke van het sterkste bewijs kan gevorderd worden; te weten: *nooit word een kind door de Engelsche Ziekte aangetast, het welk met geen Zog of andere Melkspijzen, is opgevoed.* — De ondervinding is, in dit opzigt, zoo overtuigend, althans voor mij, dat geen gezag mij van het tegendeel kan overreden. (§ III. *Eerste Aanm.*)

Ten vierden: De wijze, op welke deze Gelegenheidgevende Oorzaak de Ziektezaden opwekt, en alzoo de Naaste Oorzaak vormt, staat mijn

denkbeeld al te nadruklijk, om daar over niet een weinig te handelen.

Bij de kinderen verkrijgt de Wei, van het Kazige gefcheiden en onder het bloed gebragt, eene Zuure eigenschap, en wordt, dus ontaart, door het geheele ligchaam gevoerd. — Dit heeft meer of min plaats, naar geraden van de meerdere of mindere vatbaarheid des kinds voor de Engelsche Ziekte. — De Zwakheid had de behoorlijke bereiding der Wei tot goed voedsel belet. — In dien staat wordt dit vocht met de waterachtige deelen des bloeds dus ontaart, dat de behoorlijke ftevigheid en groei van het Beengestel daar door belemmerd wordt. — Het zelve blijft, door gemis van het noodige steunfel, flap en buigzaam, of wordt zoodanig, door de ontbinding van het geene reeds eenige ftevigheid verſchaft had. — De eigenschap eener Zuure Kwaadſappigheid ſtaar toch, in werking, opzigtelijk de vœding der Beenderen, lijnregt tegen over de vereiſchten van het voedende Sap, het welk, uitwijzens de proeven van HALLER, en andere Onderzoekeren van ons geſtel, eene Vlugzoute Kleverige (*Plastieke*) hœdanigheid bezit. — Dit wordt, door het Zuur, van zijn vermogen beroofd, en daar door wordt de Groei en Verharding van de vaste deelen des Ligchaams belet. — Het Kraakbeenige blijft, of
wordt

wordt Vliezig, en het Been behoud, of erlangt, eene Kraakbeenige zachtheid. — Zij worden, en door de Ziekte, en door de Zwaarte des Ligchaams, uitgezet en misvormd.

Zie nu, hoe het Zuur, in verband met de Zwakheid, de Engelsche Ziekte veroorzaakt! — Zie ook tevens, bij voorraad, den eersten aanleg ter verklaringe van derzelver Toevallen en Gevolgen.

Deze Redenkaveling voldoet mischien den ligtgelovigen Huisvader; maar (zegt men verder) een belezen Arts is niet zoo gemakkelijk te overtuigen. — Laat ons, met verlof der Vrageren, ons denkbeeld tegen eene bedenking staven.

Heeft men, in deze Verhandeling, dus verre, geene gewigtige schadelijke Vermogens over het hoofd gezien? — Behoort daar toe niet inzonderheid het Stremsel van het Zog, het welk, in de Darmen gepakt, den Buik doet zwellen, de Voeding, de Werking der deelen, den Omloop des Bloeds naar beneden belet, en de onderste Leden uitmergeld? — In weêrwil van veeler toestemmend Antwoord op deze Vraag, vind ik mij gedrongen te stellen, dat daar in geene Opwekkende Oorzaak van de Engelsche Ziekte te vinden is.

De ophooping van het Kazige gedeelte van het Zog kan zeer aanmerkelijk zijn, en de bedenke-

lijkste toevallen , de Teering , zelfs den Dood , veroorzaken , zonder dat het kind de eigenlijk gezegde , en naar waarheid erkende Engelsche Ziekte heeft. —

Daar tegen kan deze Ziekte in haren hoogsten trap bestaan , zonder dat deze Kazige Koek eenige blijkbare toevallen te weeg brengt ; zelfs onder eene behoorlijke ontlasting van het Stremfel. — Even dit strookt met de ervaring.

Dit Stremfel heeft ook geene de minste gemeenschap met de echte Teeken en eigenlijke Toevallen van het geene wij , als de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte , beschreven hebben. — Ware dit alzoo niet , dan , voorzeker , zouden de vroegere Schrijvers deze Ziekte gekend hebben , en de kundige Italiaansche Arts ZEVIANI had zich in zoo veele bogten niet behoeven te wringen , om een voorraad van , waarlijk al te flauwe , drangredenen voor de Oudheid der Engelsche Ziekte bij de Geneeskundige Eerstvaders opte zoeken.

Deze wederlegging van de gewigtigste tegenwerping zal mij , hoop ik , van de moeite ontslaan , om met de ontknoping van anderen te verveelen.

Verwacht echter niet , dat ik mij tracht te ontslaan , om , ter vereischte plaats , van de Toevallen , welken uit deze Kazige inpakking ontstaan :

te gewagen. — Neen: zij heeft te dikwerf plaats, om dezelve niet te overwegen, als eene bijkomende Oorzaak van verscheiden Toevallen, die zich onder de Engelsche Ziekte vermengen.

§ X X I.

Dit zij genoeg van de Oorzaken der Engelsche Ziekte. — Het geen daar omtrent overtollig mogt schijnen gezegd te zijn, zal ons, in het vervolg, ontheffen van verscheiden Aanmerkingen, welken anders volstrekt noodzakelijk zouden zijn. — Men zal dit, reeds in het volgende Hoofdstuk, bemerken.



DERDE HOOFDSTUK.

De Reden, waarom de Engelsche Ziekte, in haar eerste Begin, zelden voor het derde levensjaar bespeurt word.

§ X X I I.

SCHOON de groote BOERHAAVE deze Vraag zoude bepaald hebben tot het *tweede* levensjaar, vinden wij echer de verschijning der Engelsche Ziekte tusfchen het *tweede* en *derde* Jaar niet zeldzaam genoeg, om van de bepaling in het voorstel afte wijken.

Maar, om welke reden heeft het Genootfchap geen onderzoek gedaan naar de Oorzaken, waarom de eerste beginfels dezer Ziekte zelden voor de eerste negen Maanden bespeurd worden? — Zekerlijk, om dat dit als eene erkende ondervinding onderfheld wordt. — Sommige Schrijvers echter verdedigen eene aangebooren Engelsche Ziekte, althans, dat dezelve zich kort na de Geboorte ver

vertoondt. — Doch hun getal is gering, in vergelijking van hen, die het een en ander ontkennen. — Bij dezen voeg ik mij. — Laat mij evenwel hier iets beantwoorden, het geen niet gevraagd wordt.

De reden, waarom de Engelsche Ziekte niet vroeger, dan wij stelden, wordt vernomen, is zeer eenvoudig.

Het kan zijn, dat de Vrucht de volkomenste Vatbaarheid heeft; dan deze kan haar, bij mangel der Opwekkende Oorzaak, niet deeren.

Het schijnt niet zoo gemakkelijk te bewijzen, waarom de beginsels van dit gebrek niet voor de negen eerste Levensmaanden ten voorschijn komen. — Het Zog heeft in de eerste Weken, even als de Biest der Runderen, eene Buikzuiverende eigenschap. — De Darmen van het Kind zijn, kort na de geboorte, bezet met een Vlugzoute drekstoffe. — Dezen maken zamen eene gisting, en de ontlasting te willig, om het Zog te doen verpoozen en stremmen.

Wijders zal men toestaan, dat de Engelsche Ziekte, gelijk getoond is, geen post vat, in weêrwil van alle teekenen eener Kazige ophooping, voor dat de Wei in het Bloed vergoord is, en het voedende Vocht bedorven heeft.

Alvorens dit kan plaats hebben, zoo dat men
de

de Engelsche Ziekte aan blijkbare verschijnsels ontdekt, schijnt de bepaalde levensstijd vereischt te worden; — Ik zeg met opzet, *blijkbare*, om dat niemand zal ontkennen, dat deze ontaarting eenigen tijd kan inwortelen, eer zich de Teekenen derzelve aan den doorzigtigsten Arts vertoopen.

Doch laat ons dit Bijpad niet verder bewandelen, maar een nuttiger Veld betreden.

§ X X I I L

Men vraagt: *waarom het begin der Engelsche Ziekte zelden na het derde Jaar vernomen wordt?*

Wat wij door het begin dezer Ziekte verstaan, zal naderhand gezegd worden. — Nu merkt men slechts op, dat daar mede eene Engelsche Ziekte word bedoeld, welke zich, door Teekenen en Toevallen, allereerst doet kennen.

Tot het bestaan van de Naaste Oorzaak hebben wij gesteld, eene meer dan gewone Zwakheid des Lijders, *als* eene Voorgeschiedheid, — en de verzuurde Wei, als de eenige en genoegzame Opwekkende Oorzaak.

Zoo even heb ik getracht te bewijzen, waarom de Engelsche Ziekte zelden voor de negen of twaalf eerste Maanden verschijnt. — Mischien is de

de Grond, aldaar gelegd, niet te zwak, om ons, in het tegenwoordig onderzoek te ondersteunen.

Wij zullen dit beproeven;

Voor eerst: De Zwakhéid is, om het bestaan aan de Naaste Oorzaak der Ziekte te verschaffen, betrekkelijk tot de Wei. — Dit staat de Lezer toe, welke de onderlinge werking dezer twee Oorzaken heeft bevat. — Deze Voorgeschiedheid houdt korter of langer aan, echten indervoegen, dat dezelve eindelijk niet meer kan worden opgewekt, om de Naaste Oorzaak te vormen. — Dit bepaakt men, op grond der bevinding, op het derde Jaar. — Dan is de Veérkracht der Vaten sterker, de vaste Deelen zijn steviger, en de Vochten beter bereid; zoo dat alles medewerkt, om het vermogen der Opwekkende Oorzaak te wederstaan.

Het kind wordt met Dranken en Spijzen gevoed, welken het overgeschoten Zuur omwinden, of kragteloos maken.

Dit bewijs dient echter eeniglijk, om meer of min te betogen, waarom de Ziekte, na dien Leef-tijd, zich, zelfs in haar eerste begin, niet vertoond; maar niet, om te ontkennen, dat zij, te voren bestaan hebbende, geene gevolgen zoude achterlaten.

Ten tweeden: Men begeert, met Reden, meer, ter

ter voldoende Verklaringe van dit Stuk. — Hoe, vraagt men, kan de Wei, als de Opwekkende Oorzaak, dan nog beschouwd worden, na dat het Kind Jaar en Dag gespeend is? — Kan eene Oorzaak werken, welke niet meer bestaat? — Ligt, in het verdedigen van deze Stelling, geene ongerijmdheid? — Geenzins, Lezer! deze zwaarigheid vervalt, na dat de volgende aan de voorgaande bewijzen gehecht zijn.

De eerste blijkbare Teekenen der Engelsche Ziekte zijn niet daarom hare eerste Beginsels. — Hoe lang aarzelt dikwerf de kundigste Arts, eer hij, met zekerheid, het bestaan dezer Ziekte durft bepalen? — De Wei heeft niet terstond het vermogen, om de blijkbare Teekenen van het gebrek te vertoonen, doch daarom mag het bestaan dier Opwekkende Oorzaak niet ontkend worden. — Zij ondermijnt de Vochten, bij trappen, en bederft de Voedingfappen, met langzame schreden; — Dit is de reden, waarom de kenbare toevallen der Engelsche Ziekte zich dikwerf zeer lang na de Speening vertoonen. — Ondertusschen mist het zeer zelden, of men ontdekt eene Zwakheid, en andere verschillende blijken van ongesteldheid, bij deze Kinderen, langen tijd voor de zekere Kenmerken van de Engelsche Ziekte.

Men zou hier, indien eenig uitslugt, ter red-
ding

dinge uit de moeilijkheid van dit onderwerp, noodig was, kunnen bijvoegen, dat het voorönderlijk begrip van velen, onder het gemeen, de gespeende Kinderen, tijden lang, met Koemelk spijzigt; een voedzel, meer dan het Zog, geschikt, om de zaden der Engelsche Ziekte bij daar toe vatbare Kinderen optewekken. — Ik heb opgemerkt, dat dit vooral plaats gehad had bij kinderen, welken, tuschen het tweede en derde Jaar, de beginfels van dit gebrek vertoonden. — Dezer dagen bezoek ik zes Kinderen, welken meer of min, echter allen blijkbaar onder onze Ziekte kwijnen. — Zij zijn alleen ruim twee Jaren oud. — Vijf van dezelve zijn, na dat zij de Borst verlieten, met Melkpappen onderhouden, terwijl de andere, die ook minst met dit Euvel besmet is, met de gewone Tafelkost is opgevoed. — Doch ik meen, dat wij deze waarneeming, ter verklaringe van het tegenwoordig onderwerp, niet noodig hebben.

Wij gaan over tot zaken van meer belang.

VIER.

VIERDE HOOFDSTUK

Van de Teekenen der Engelsche Ziekte.

§ XXIII.

DE Kenmerken der Ziekten zijn onderscheiden in *Algemeene*, welken ook bij anderen Ziekten voorkomen; en in *Bijzondere*, of *Karakteristieke*, ook *Beslisschende Teekenen* geheeten, door welken de eene van de andere Ziekte, ten allen tijde, onderkend wordt.

Zij verschillen ook, naar mate van het beloop der Ziekte, in haar *Begin* of *Voortgang*; als mede, naar gelang van derzelver hevigheid, zelfs in hare eerste verschijning.

De Kenmerken zijn ook niet altijd dezelfde, in dezelfde Ziekte, bij onderscheiden Lijderen; te weten, voor zoo verre die Teekenen niet beslisschende zijn.

§ XXIV.

§ X X I V.

Ik zal de Teekenen der Engelsche Ziekte verdeelen naar het *Begin*, den *Voortgang* en het *Einde* derzelve. — Welke drie verdeelingen den leidraad van dit Hoofdstuk zullen zijn; terwijl het, onder de opgave derzelven, wel haast blijken zal, welke Teekenen den naam van *Beslisshende*, al of niet, verdienen, en welke de *min of meer volkomen* Engelsche Ziekte verzellen.

§ X X V.

Wij zullen den voorraad van de overweging eener *beginnende* Engelsche Ziekte ontleenen

1. Van de beschouwingen des uitwendigen Ligchaams;
2. Van de gesteldheid der Adembalinge;
3. Van die der deelen van de Spijsverteering;
4. Van de gesteldheid en omloop van het Bloed;
5. Van de Ontlastingen; en
6. Van de vermogens der Ziele.

Deze, anders snipperachtige verdeeling, zal noodig zijn, om den onkundigen te beter te doen vreezen, wat in den verderen voortgang der Ziekte te duchten is.

§ X X V I.

Belangende *het eerste* : — De Oogen, te voren glanzig en schitterende, worden bleek en traanig. — Zij schijnen dieper, dan natuurlijk, in kunne kasfen gezonken. — Het kind wordt hol-
 òogig. — Het Aangezicht verbleekt en is somtijds bol. — De, anders naauw gespannen, Huid des Ligchaams wordt slap, ruim en rimpelig. — Dit heeft vooral plaats aan de Dijën en Beenen, terwijl de Huid des Buiks, door de opgezette Maag en Darmen gespannen staat. — Het Vel wordt, over het geheel, wankleurig en tanig.

Het eene Kind is meer, dan te voren, gene-
 gen om te leggen en te slaapen; terwijl het an-
 dere ongedurig is en onophoudelijk tobt en schreeuwt.

Betast men de Vleezige deelen onder de Huid, vooral der benedenste Ledénmaten, en bij sommigen ook der Armen, dan verneemt men, dat zij trapswijze in stevigheid afnemen, en langs zoo slapper worden.

Hier bij komt vervolgens eene ongewone hitte der Handpalmen en Voetzoolen.

Ziet gij zulk een Kind? Had het zelve eene voorgeschiktheid tot de Ziekte, en verkeerde het zelve onder de Opwekkende Oorzaak? — Vrees dan voor eene beginnende Engelsche Ziekte.

§ XXVII.

§ X X V I I.

Ten tweeden: Die vrees erlangt meer gronds, — wanneer de *Ademhaling*, bij korter poozen, dan gewoonlijk, geschied.

Dit kenmerk wordt afgeleid van den gezwollen Buik, en is een natuurlijk gevolg van de belemmerde nederwaardsche beweging' des Middenrifs, zoo dat de Longen zich niet genoeg uitzetten. — Indien deze Opspanning afwezend is, dan verneemd men ook dit toeval niet, als een Gewrocht dier *Zwellinge*, bij deze Kinderen.

De Uitgeademde Lucht is heet, heeft dikwerf eenen onaangenaamen gloed en Zuuren reuk. — Als dan wordt eene bezwarenis in de inademing, door Slijm in de Luchtblaasjes ophoepende, of door eene Krampachtige toetrekking derzelven, dikwerf vernomen. — Dit Teeken is echter veel tijds wankelbaar en onzeker, om dat de prikkeling van het Tandvleesch onder de uitborring der Tandden, welke veelal gelijktijdig geschiedt, met de eerste verschijnselen der Engelsche Ziekte, door medegevoel van den gerekten Zenuw in den wortel van den Tand met die der Longen, eene krampachtige belemmerde Ademhaling kan veroorzaken. — Een eenvoudige Lezer moet deze en soortgelijke stellingen, welker uitpluizing lastig en nutteloos

zoude zijn, op goed vertrouwen overnemen, terwijl hij zich op de toestemming van bekwame Ziektenkundigen kan verlaten.

§ X X V I I I.

Ten derden: Eenige wanorders in de *deelen*, dienstbaar voor de *Spijsverteering*, leveren eene nieuwe Bron van Kenteekenen.

De Tandēn komen traag en gebrekkig te voorschijn.

De Tong is doorgaans wit, beslagen en dikwijls droog.

De Sprouw is dezen Kinderen zeer gemeen.

Zij walgen dikwils, en braken het Zog, terstond na de Zooging, uit, wanneer de stof gekapeld en zeer Zuur is. — Dit Teeken is echter verre af, van op zich zelven iets te beslischen. — Bij de overigen komt het zelve niet te min in aanmerking.

Deze Kinderen zijn veelal ongemeen gulzig, een gevolg van het prikkelend Zuur in de Maag. — Doorgaans voegen zich hier Oprispingen en Winden bij.

Velen loozen bij mangel van Gal, met vrij wat moeite, witte, taaije, kazige, zuure Drekstoffen. — Anderen hebben meenigvuldige
Af-

Afgangen, die geel van kleur en scherp zijn, en eenen gooren, zuuren reuk geven, welke scherpte den Aars ontvalt. — Het inwendige gedeelte der Darmen wordt eindelijk raauw en zeer aan doenlijk, het geen niet lang na elke Zooging kan opgemerkt worden.

Is het wonder, dat de Vermagering hier op volgt, en dat, daar het Ligchaam bijna alleen zich zelve voeden moet, uitgeput, en de Huid ruim en rimpelig wordt? — Men kan dit gemakkelijker bevroeden, wanneer men weet, dat, onder deze ontlastingen, de Darmen, op sommige plaatsen, met het Kazige deel van het Zog als beplakt zijn, en dat aldaar (offchoon elders het Vlies der Darmen van zijn slijm ontbloot is) de opslurping van het voedende deel der Spijzen belet wordt.

Dit tuige de ontleding der Kindertjes, welken, gedurende dit tijdperk der Engelsche Ziekte, het Slagtöffer van andere Ziekten waren. — Eenmaal zag ik eene vrij aanmerkelijke lengte der Darmen, door deze stoffe, zoodanig vernauwt, dat schaarsch eene opening, ter dikte van een Tabakspijpsteel, overbleef.

§ X X I X.

Ten vierden: Hier bij komen de gesteldheid en amlaop van het Bloed.

Uit het reeds betoogde blijkt de reden van de Zuure kwaadsappigheid des Bloeds, van de Koortsige bewegingen en verhitting, daar door te weeg gebracht, terwijl de hevigheid van het een en ander, uit het meerder of minder gedeelte der Naaste Oorzaak, moet verklaard worden.

Opzigteijk den loop van het Bloed in het bijzonder, ontdekken wij dikwerf, dat de Kropslagaders, ter wederzijden van den Hals, meer uitspuiten en sterker slaan, dan zij anders doen, of schoon de Pols aan de hand slap en ingestrokken is. — Deze plaatselijke versnelde beweging des Bloeds naar het Hoofd, brengt toevallen aan, waar van wij naderhand spreken zullen.

De Koorts houdt geen strek, maar is sterker, naar mate de Vaten meer geprikkeld worden.

§ X X X.

Ten vijfden: De Ontlastingen of Uitwerpsels geven zoo vele Teekenen der Engelsche Ziekte, dat wij daar over iets meer te zeggen hebben.

Schoon wij het een en ander van het Braaksel

e

en den Drek gewaagden, zullen wij ook, daar omtrent, echter noch iets aantemerkten hebben, terwijl de goede orde de navolgende verdeeling billijkt.

Voor eerst: De Kwijl. — Deze is droog, taai, en de Klieren, geschikt tot afscheiding derzelve, zijn, bij velen, gezwollen en doen daarom de afscheiding niet naar behooren. — Hier van de droogte des Mondes en de dorheid der Lippen, welken somtijds met eene bruinachtige korst bezet zijn.

De gestadige onwillige afloop van het Spog is, als een Teeken dezer Ziekte, door anderen, als zoodanig erkend, niet te vertrouwen. — Een Arts begrijpt, waarom?

Ten tweeden: Veelen hebben eenen droogen, anderen eenen slijmigen Hoest, als uit verkoudheid, somtijds met aanvallen van eenen Stuiptrekkenden klank, bijna gelijk in den Kinkhoest. — Dit teeken echter is, in het afgetrokkenene, niet zeer voldoende.

Ten derden: Het geen meer onze opmerking, dan onze verwondering, verdient, is, dat deze Kinderen nooit eenige Galstoffen, onder het braken, loozen.

Een ervaren en veel gezochte Baker, welke op dit stuk jaren lang gelet had, verhaalde mij, nim-

mer ondervonden te hebben, dat Kinderen, welken nu en dan eenige Gal braakten, hoe zwak zij anders waren, naderhand de Engelsche Ziekte kregen; — Zij had, integendeel, menigmaal voorspeld, en hare voorspelling werd bewaarheid, dat Kinderen, welken veel Slijm en Zuur braakten, indien zij tevens leene geelachtige kleur hadden, in het vervolg door deze Ziekte zouden aangetast worden.

Ten vierden: Het vocht der Klieren in de Oogenhoeken is, bij deze Kinderen, zeer scherp, en, met de overige Teekenen gepaard, een kenmerk van belang. — Men kent dit aan de roodheid van de Wangen, en van den Neus, uit de knarig van het zelve ontsaande.

Men bespeurt dit Teeken echter niet altijd in het begin van deze Ziekte.

Ten vijfden: — Het Zweet is, van den eersten aanvang der Engelsche Ziekte, scherp, en goor van reuk, waar uit, bij sommigen, vrij lastige Huidgebreken, en bij anderen Ontvellingen in de Liezen, nabij den Aars, somtijds onder de Armen, ook, in enkele gevallen, aan het Voorhoofd, geboren worden.

Het is opmerkelijk, dat zij, welken zulk Zweet hebben, en naderhand dergelijken Uitflag krijgen, meestal van de Engelsche Ziekte vrij blijven.

Denk

Denk echter niet, dat, hoewel het Zuur in het Bloed, uit den opgemelden staat van het Zweet, vermoedelijk zij, even daarom de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte bestaat; neen; doch, bij de overigen gevoegd, geeft het zelve veel gronds.

Ten zesden: De Afgangen. — Men zij hier omtrent niet te gereed in zijn besluit, want dit zoude ongerijmd zijn, welke hoedanigheden ook in de Drekstoffe bespeurd worden; — Doch, zijn 'er te gelijk andere Kenmerken tegenwoordig, dan geven de lijmige graauwe Ontlastingen niet minder reden, om de Naaste Oorzaak der aanvangelijke Engelsche Ziekte te vermoeden, als de brui-
ne, geele, of zwarte zuurftinkende en meenigvuldige Drek.

Ik behandel, dezer dagen, een Kind van der-
tien Maanden, het Vijfde van dezelfde Moeder. — De Vier vorigen hadden allen eenige gevolgen van de Engelsche Ziekte.

De Vader had, in zijne Jeugd, de Waereld gezien. — De Moeder was sterk en gezond, haar Zog doorwerkt en stevig. — De Kinderen kwamen allen zeer zwak en teder ten voorschijn.

Behalven eenen opgezetten, echter zachten, Buik, eene beginnende vermagering der Dijën en Beenen, de ongedurigheid en gemelijkheid van dit Lijdertje, ontlaste het zelve menigvuldige, brui-

ne, zuure Drekstoffen. — Ik voorspelde de Engelsche Ziekte, en ik vertrouw, dat deze voorzegging, voor het verzenden dezer Verhandeling, zal bevestigd worden. (*)

Ten zevenden: De Pis. — Bij deze Kinderen is het niet gemakkelijk, Kenmerken, welken dit uitwerpsel zoude kunnen verschaffen, te verzamelen. — Ik zal mijne geringe ondervinding, daar omtrent, trouwhartig mededeelen.

Bij veele Lijdergjes, bij welken de Engelsche Ziekte vermoed wordt, is de Pis roodachtig en scherp van reuk: bij anderen is dezelve waterig, helder en dun. — De Pis wordt somtijds, vooral bij Jongetjes, druppelwijze en met pijn ontlast. — Zij doen, twee Jaren oud zijnde, zoo vele pogingen, zelfs met hunne Handjes, om zich van die knagende Pis te ontdoen.

Eenige Proeven met dit soort van Pis genomen, en vergeleken met die van Kinderen, bij welken geene reden van onderstelling der aanwezigheid — eener Zuure scherpte in het Bloed te vinden was, — toonden, na de bijvoeging van een Vlugzout, eene —
Zuur—

(*) Zes Maanden na dit ik het bovenstaande schreef — waren de Teekenen der Engelsche Ziekte zoo duid—
lijk en ontwijfelbaar, als ik immer bij eenen Lijde—
gezien heb.

Zuurachtige ligte opbruifing, welke anders alzoo, ten minsten met dien reuk, niet bespeurd werd.

. Dit meen ik, door herhaalde waarnemingen overtuigd, aan het nader onderzoek der Geneeskundigen te mogen overlaten, wanneer men die gisting aanmerkelyker vinden zal, dan bij de Pis van bejaarden, op gelijke wijs getoetst.

De blykbaarheid dezer Proeven wordt grooter, naar mate de Engelsche Ziekte meer gevorderd is.

§ X X X I.

De laatste soort van Teekenen wordt ontleend van de ongesteldheid der *Zielvermogens*. (§ XXV n. 6) zoo veel men over dezelve bij deze Kinderen kan oordeelen.

BoöTIUS, welke de eerste, in den beginne der voorgaande Eeuw, over deze Ziekte duidelyk schreef, en GLISSONIUS, na Hem, mitsgaders anderen, op hun voetspoor, beweerden, dat eene meer dan gewoone schrandtheid, zelfs in den eersten aanvang der Engelsche Ziekte, een harer Ken-teekenen opleverde. — Anderen, vooral de beroemde BUCHNER, hielden, in tegendeel, eene blykbare domheid voor een kenfchets dezer Ziekte. — Elk beriep zich op de ondervinding. — Deze Gids zal ook mij geleiden, zonder dat mijn
ge-

gevoelen op eene enkele waarneming zal gevestigd zijn.

De Kinderen, bij welken de Engelsche Ziekte plaats heeft, stammen veelal van vernuftige Ouderen. — Daarom zijn zij, misfchien, ook, naar hunnen Leeftijd, verbaarer dan anderen.

Doch dit ter zijde gesteld, of toegestemd zijnde, is voor mij om't even, en ik zie geene reden, om eenig Teeken eener beginnende Engelsche Ziekte van de gesteldheid der Zielvermogens (ondanks het gevoelen van anderen) afteleiden.

Wel is waar, dat de Ziekte zich fomtijds, in een' aanmerkelijken trap, spoedig verroondt, en dat als dan Teekenen, welken in eene ordenlijke Verhandeling niet gevoeglijk tot den eersten trap der Ziekte mogen gebragt worden, voorkomen. — In dat geval bescpeurd men eene versijnde, doch bij anderen eene verstompte werking van den Geest. — Maar wij zullen naderhand hier van opzettelijk spreken.

§ X X X I I.

Verneemt men alle, of de meesten der opgenoemde Teekenen, dan is de Engelsche Ziekte aanwezig, of zeer nabij. — Wie echter in zijn besluit aarzelt, zal in het vervolg beter overreed worden.

Over

Over dit stuk had ik nog eenige weinige Aanmerkingen.

Voor eerst. — Het eene Teeken is somtijds duidelijker dan het andere. — Evenwel krijgt men, over allen, meerdere toelichting, wanneer het Kind de Ziektezaden heeft, en het Zog de hoedanigheden, om dezelveu optewekken.

Ten tweeden. — Niet zelden vernemen wij één of meerder Teeken en, welken anders later voorkomen; bij voorbeeld, de uitzetting der Knokken, aan de Hapden en Enkels, (welken ROSEN, ten onregte onder de Teeken en der aanvanglijke Engelsche Ziekte teldt) de verwijding der naden van het Hoofd, de kromming der Arm-, Scheen-, en Kuitbeenderen, zwelling en verharding van den Buik, uitmergeling der onderste Ledematen, enz. — Alwaar dit gebeurd, is het gebrek des te gemakkelijker kenbaar.

Ten derden. — Hebt gij zulk een Kind, Lezer! — Zoek dan tijdig de voorschriften der Geneeskunde, ten besten van uw kroost, aantewenden, om aldus, door gewisfer Kenteeke nen, niet al te blijkbaar van uw verzuim overreed te worden.

§ X X X I I I.

Het verloop des tijds tusfchen het begin en den

den verderen voortgang der Engelsche Ziekte, is niet gemakkelijk met zekerheid te beperken. — Vele Kinderen blijven eenige Weken, anderen ettelijke Maanden, in eenen toestand, welke met regt tot de beginnende Engelsche Ziekte behoort. — Ik heb Kinderen, in die onzekerheid, Agt of Tien Maanden zien verkeerren. — Eenigen hebben de Ziekte zoo goedaartig, dat bijna niets van de Teekenen des tweeden tijdperks ontdekt wordt. — Bij sommigen zijn de Teekenen ingewikkeld, en de beginnende is van de meer gevorderde Ziekte bezwaarlijk te onderscheiden. — Hier toe behoort niet alleen de zwelling der Knokken, en het geene zoo even opgenoemd is, maar ook de verhinderde, of gestoorde, Beenverharding. — Wordt echter de Geneesheer tijdig geropen, of stelt een Huisvader de behoorlijke aandacht te werk, dan zal men ongetwijfeld, in bijna alle gevallen, tijds genoeg hebben, om de twee eerste graden der Engelsche Ziekte te onderscheiden. — Deswegens zijn zij niet vrij van wanorde, welke de Teekens van den blijkbaaren verschillenden loop dezer Ziekte onder elkanderen vermengen. — Of de Heer ROSEN, behoudens zijne verdiensten, van deze bedenking kan vrijgepleit worden, zullen wij nu niet onderzoeken, maar liever onzen weg vervolgen.

§ X X X I V.

Wij gaan over tot de aanwijzing der *Teekenen* van het *Tweede Tijdperk* (§ XXIV.)

Het zal best zijn, om de voorgaande verdeling (§ XXV.) te behouden. — Dit zal minst verwarren, en den Lezer genoeg in staat stellen, om over de meerdere afwijkingen van de gezonde werking der deelen te oordeelen.

Wij beginnen dan in de *eerste plaats*, met de *Beschouwing des Ligchaams*, bepaaldelijk, *Voor eerst*, van het Hoofd; Dit neemt langzaam toe in groote; — De Naden, welken bij andere Kinderen vernauwen; wijken van elkanderen; — Het Voorhoofdsbeen puilt uit, of wordt, schoon zelden, meer plat dan verheven.

De Beenwording gaat, hier en ginds, niet naar behooren, of wordt gestaakt. — In één geval zag ik het regter Sleutelbeen krom en knoestig worden; de Wervelen zetten zich zijdelings, of achterwaards uit, vooral de Rugwervelen; — Men heeft eens de voorwaardsche afwijking derzelven opgemerkt. — De Ribben worden, vooral waar zij met hunne Kraakbeenen vereenigd zijn, insgelijks tegennatuurlijk krom, en niet zelden knobbelig en knoestig. — De Beenen der Ledematen worden scheef en platächtrig, voor al de Dijen en Beenen. — Dit zien wij, wanneer de Kinderen staan en gaan:

een natuurlijk gevolg van het onvermogen dezer deelen, om de zwaarte des Ligchaams, zonder hinder, te wederstaan. — De Hoofden der Armbeenderen, en van die der Beenen aan Handen en Voeten worden dikker en breeder, dan behoorlijk.

Onder het zachtens wrijven van de Ledematen, verneemt men eenige ruwe ongelijkheden.

De Knieën zetten zich buiten, — doch meestal binnenwaards uit, zoo dat de Knieschijven eindelijk, geheel en al uit hare plaats wijken.

De Beenderen van het Bekken verkrijgen, veeltijds, eenen zoo ongeregelden groei, dat daar door, naderhand, vele Vrouwen en haar Vrucht, onder de Verlossing, ongelukkig worden.

Deze ongelijkvormigheid van den Wasdom der Beenderen is veeltijds zoo zichtbaar, dat ik verscheiden Kinderen heb behandeld, bij welken de Arm- en Dijebeenderen, naar evenredigheid der overigen, veel te kort of te dik en tevens te kort, hoewel anders niet boven mate, gebogen waren. — Een Meisje van ruim anderhalf jaren, heeft, door deze Oorzaak, den regter Arm, twee duimen langer dan den linker, welke de behoorlijke lengte heeft. — Bij een Jongetje, even oud, is het linker Dijebeen bijna drie duimen korter en veel dikker dan het regter. — Dergelijken wangroei bespeurt men ook in andere Beenderen.

Veele

Veelē ontkennen het dadelijk bestaan dezer Weekwordinge; Anderen erkennen dezelve, maar houden de stelling, om ze aan de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte toeteschrijven, voor eenen Hersenvond van geen waardij. — De meesten zijn van ons begrip, waar in wij stellen, dat de ervaring bij alle Kinderen, met de Engelsche Ziekte behebt, deze Wanstal meer of min toont; zoo dat dit, in dier voegen, in geene andere hunner Ziekten plaats hebbe. — Het is zelfs niet vreemd te ondervinden, dat, wanneer het tweede tijdvak der Ziekte omstreeks het tweede Jaar aanwezig is, en het Kind reeds gaat, dat als dan de Beenderen, welken eenige hardheid bekomen hadden, weder zacht en buigzaam worden. — Van de waarheid daar van ben ik, door de opening van een Lijkje, volkomen overreed.

De Kraakbeenen deelen insgelijks in deze zoo nadeelige uitwerking der Engelsche Ziekte. — Dezen zetten zich op verscheiden plaatzen uit; — anderen worden plat; anderen week, zoo dat eindelijk het Ligchaam zijn steun en stevigheid verliest.

Ten tweeden. — Beschouwt men het Lijdtje verder, dan ziet men zijn aangezigt gezwollen, en meer opgezet, dan de vermagering des overigen Ligchaams gedooft.

De Buik staat, hoe langs zoo meer, gespannen, vooral ter regter zijde, alwaar eene zachte betasting bij sommigen veel pijn verwekt.

De overige Huid, vooral der Dijën en nederwaards, is slap, dor en rimpelig, het geen aan de uitmergeling van het Vet, en den belemmerden omloop des Bloeds derwaards wordt toegeschreven.

De Palmen en Zoolen zijn, bij de meesten, brandend en heet.

De kleur is doorgaans bleek, tanig en ongedaan.

Bij sommigen zwellen de Klieren, inzonderheid van den Hals, onder de Ooren, en elders. — Deze zwelling, en bijkomende verharding, zijn bij dezen zeer weêrparstig, doch bij anderen verdwijnen dezelve, om naderhand op nieuw te verschijnen, of zich naar elders te verplaatsen.

Bij dit aantal overredende Kenmerken, zien wij somtijds plaatselijke Verhardingen en Zweeren onder de Huid, die de gedaante en den loop van Beenëeters hebben, en niet zelden averegts behandeld worden. — Wij zijn echter verplicht om, in dergelijke gevallen, te onderzoeken, of, met de Zuure, ook geene Venerieke kwade gesteldheid der Vochten gepaard zij, of deze Verzweeringen geen gevolgen zijn van verplaatsten Dauwworm, Schurft,

Schurft, of eenige andere Huidziekte, op dat ons de beste wijs van genezing, ten onpasse aangewend, niet te leur stelle.

Onder de Kenmerken der Engelsche Ziekte zag men wel eens zuchtige zwelling van Handen en Voeten, ook, maar zelden, van het gansche Ligchaam; een Kenmerk van een aanmerkelijke verdunning des Bloeds.

§ X X X V.

Ten tweeden. De *Ademhaling* wordt meer en meer belemmerd, en geschied bij tuschenpoozen, waar van wij terstond de reden melden zullen.

§ X X X V I.

Ten derden. Om die reden bij de hand te hebben, zullen wij overwegen, hoe de *omloop des Bloeds* gesteld is. — Deze kleene verschikking in de verdeeling (§ XXV n. 4) kan eenig gemak verzorgen.

Sommigen hebben reeds vroeg een klein Koortsje, welk langzaam toeneemt en hebbelijk wordt. Bij de meesten echter ontdekken wij het zelve eerst dan, wanneer de uitzetting van het Hoofd en de Knokjes zichtbaar wordt. — Dan heeft deze den

oop van eene gestadige uitteerende Koorts, welke duidelijk blijkt, door eene aanhoudende prikkeling, veroorzaakt te worden. — Zij gaat verzeld met meerdere Hitte en klam Zweet, vooral binnen de Handen, dan in het begin.

Men ziet de Kropflagäders en aders zwellen, en de eersten geweldig slaan; — of de zwelling van het Hoofd hier aan, voor een gedeelte, moet toegefschreven worden, zal in de beschrijving der Toevallen voorkomen.

Deze versnelde beweging van het Bloed is eene voorname Oorzaak van de moeilijke Ademhaling; terwijl de ontlasting van dat vocht, uit de wankeurigheid van den Huid, witheid der Oogen, bleeke Lippen, en rauwe Pis, 'genoegzaam blijkt.

§ X X X V I I.

Ten vierden. De overweging der Teeken en, welken de *Spijsverteering* verschaft, staat nu te volgen.

De Tand en verschijnen traag en ongeregeld. — Die er zijn, worden rottig en vallen brokkelings uit. — Dit veroorzaakt, bij velen, eenen hinderlijken stank uit den Mond, welke duidelijk verschildt van den heeten zuuren reuk uit de Keel. — Deze Tand en zijn meestal, bruin of zwart, en toonen genoeg, dat hun voedend Vocht bedorven is.

Het

Het Tandvleesch wort bleek , somtijds rood en ontveld. — Eenmaal zag ik de Tandenkassen , door Beenbederf , geknaagd.

De Tand en zijn , in enkele gevallen , veel zachter , dan naar behooren , zoo dat ik dezelve , eenige jaren geleden , bij een Meisje van ruim twee jaren , zoo week en buigzaam vond , als Wasch. — Dit Kind is Tandeloos gebleven.

De heete en drooge Mond wordt pijnlijk , door vlakke Zweertjes of Puistjes , die van eene Spruwachtige natuur zijn , verdwijnen en wederkeeren , wanneer tevens de Amandelen doorgaans gezwollen zijn.

Deze blijken eener scherpe en knagende Wanstalte der Vochten blijkt ook , uit de dorre Lippen en het ontfoken Keelgat.

De Zuure Oprispingen en Brakingen vermeerderen , omdat deze Kinderen veeltijds gulzig en onmatig zuigen , of schoon het Zog , in evenredigheid der toenemende Zwakheid van de Verteeringskrachten , voor hun een bezwarend voedsel worde. — In wederwil van dezen honger , mangelt het den eersten wegen (de Maag en Darmen) aan Gal , terwijl een overmaat van Zuur geworden Wei het gevoel van honger verwekt , en bij velen het Stremfel de Darmen uitzet , welken daar door vol winds zijn , ten zij menigvuldige afgan-

gen hen van de , anders befloten , lucht onthef-
fen.

§ X X X V I I I.

Ten vijfden. De Teekenēn , ontleend van de *ontlaste ſtoffen* , zijn , in wezen , dezelfde , als in het begin ; maar beter geſchikt , om den angel , die in het gras ſchuilt , te doen kennen.

De Kwijl wordt taaijer , goor en kleverig , — of dun , ſcherp en knagende . .

De Hoest wakkert aan , met eene bezetting van Slijm in de Long , die de Ademhaling veeltijds moeilijk maakt . — De Natuur herſtelt echter dit gevolg dikwijls , door eene Slijmbraking . — Dit ziet men dikwijler , naar geraten van het klimmen der Ziekte.

De Oogen traanen een Vocht , het welk hoe langs hoe ſcherper wordt , en het geen , proefkundig getoetst , blijkt , eene Zuure geäartheid te bezitten . — Dit ſcherpe Voçht ontvelt ſomtijds gansch het aangezicht , het welk ik , meer dan eens , daarna , met eene Dauwwormige korst bedekt vond.

Het Lijdertje is heeter , maar zweet minder dan te vooren , en wanneer dit laafte geſchiedt , dan geraakt het kind eene ſcherpe , knagende ſtof kwijt.

De Afgangen vermeenigvuldigen in getal , en nemen toe in de bruine kleur , den ſtank en de ſcherp-

scherpte. — Anderen zijn, in tegendeel, doch ten hunnen nadeele, hardlijvig.

Ontdekt men, dat de Buik, onder dezen ruimen Stoelgang, zwelt, hard wordt, of, als een trommel, gespannen staat, en dat de Ring-spier van den Aars verflapt, dan is de toestand zorgelijk, vooral indien het Kind, door Stuipachtige bewegingen, als van de vallende Ziekte, getrokken wordt. — Loost het Lijdertje, intuschen, boven — vooral benedenwaards, met vermindering der afgangen, der zwelling van den Buik, en der Zenuwtrekking, verwacht dan iets goeds. — Hier van zal in het Hoofdstuk der Voorspelling' breeder moeten gehandeld worden.

Schoon ik, in den aanvang der Engelsche Ziekte, weinig gewigt hechtte aan Teekenen, ontleend van de stompe of vlugge Geestvermogens (§ XXXI.) en de meeste waardij stelde op Teekenen van het vermogen des Ligchaams, op eene vatbare wys afgeleid, zoo meen ik echter ondervonden te hebben, dat men daar van, in eenen meergevorderden staat onzer Ziekte, ter onderscheiding derzelve van anderen, eenige opmerksaamheden kan aanwijzen.

Schoon de Reden in de Verklaring van dit onderwerp, niet allenthalven werkeloos is, zal nochtans de Ondervinding hier het meeste gezag hebben.

Vele kinderen zijn, onder den voortgang der Engelsche Ziekte, waarlijk vernuftiger en taaijer van geheugen, dan men van hunnen leeftijd zou kunnen verwachten. — Zou deze waarneming gelegenheid verschaft hebben aan eenige spreekwoorden: „ Vroeg „ rijp, vroeg rot! — Wacht u voor de getee- „ kenden! — Het kind is te slim, en zal niet „ lang leven!” enz. — Spreekwoorden, gewisfelijk niet ouder dan de Engelsche Ziekte.

Dat zulke kinderen spoedig blijken van een geestig vernuft toonen en naderhand uitstekende mannen werden, leerde de ervaring zeer dikwijls. — Of SOCRATES, CRATES en AESOPUS, door de Engelsche Ziekte, in hunne jeugd, gebocheld geworden zijn, weet ik niet; maar ik herinner mij, onder dit soort van, door de Engelsche Ziekte, verminkte *Cratesen*, Mannen van den eersten rang in het vak der geleerdheid, van welken eenigen hunnen roem nog dagelijks vermeerderen. — Het zou, des noods, niet mogelijk zijn, om de waarheid van dit onderwerp, met de schranderste antwoorden, opmerkingen, en blijken van een taaij geheugen, bij Kinderen van twee of drie jaren, te bevestigen.

Doch het tegendeel behoort ook niet onder de zeldzaamheden. — Vele Kinderen worden, door
en

en onder Engelsche Ziekte en hare gevolgen, slap-
perig, dom en ontvatbaar; — hun Geheugen
wordt verstompt, en hun Oordeel bekrompen.

Van waar komt dit verschil? — Van de on-
derscheiden gevolgen, welken, door den ongere-
gelden omloop van het Bloed naar de hersenen;
en deszelfs gevolgen, te weeg gebragt worden, —
als mede van de verschillende werkzaamheden der
werktuiglijke deelen der zinnen, op onderscheiden
wijzen, door de uitzetting van het Hoofd, be-
werkt; — Doch de Lezer, voor welken deze
Verhandeling meest ingericht is, zal weinig vor-
deren met de ontwikkeling van Wijsgeerige gisfingen.

§ X X X I X.

Thans, vertrouw ik, de Kenmerken der En-
gelsche Ziekte, in haar begin en verdere voort-
gang, klaar genoeg te hebben verzameld. — Velen
derzelven, ik erken het, besliffchen de Ziekte niet,
wanneer zij in het afgetrokkenene bespeurd worden. —
Het was ook geenzins mijn doel, om dezelve, elk
op zich zelve, met die waardigheid te vereeren. —
Maar, indien zij gezamenlijk, of velen derzelven,
op de beschreven manier stand grijpen, dan zijn
even deze zaamverbonden Teekenen genoegzaam,
om de Engelsche Ziekte te kennen, en van alle

anderen te onderscheiden. — Om dit laatste te bewijzen, moest ik nu de Teekens van alle andere Ziekten der Kinderen, met die der Engelsche Ziekte vergelijken, en daar mede mijn besluit voldingen. — Dan dit zoude meer omslags, dan onderwijs geven; meer verwarring voor vele Lezers, dan opheldering.

Besluit nu, indien gij in uw Kroost, de meesten dezer Kenmerken, in den voorgemelden leeftijd, ziet, dat de Engelsche, en geene andere Ziekte, hoe genaamd, zijn ligchaam foltert.

§ X L.

De Teekens van den laatste trap, of het einde der Ziekte, zijn zeer kennelijk.

De Kenmerken van het tweede tijdperk duren zoo lang, tot de Naaste Oorzaak der Ziekte, door de Natuur, of de Kunst, ten ondergebragt, en het Lijdtje in eenen volkomen staat van gezondheid gekomen is.

Het gaat echter niet altijd zoo voorspoedig, want met de verheffing der Toevallen klimmen de vorens beschreven Kenmerken tot die hoogte, dat zij gevaarlijke, en zelfs doodelijke, gevolgen doen duchten.

Andere overblijvende Teeken en wijzen de on-
vol-

volkomenheid der hertellinge , ten duideljksten aan.

Maar het een en ander behoort veeleer tot de overweging der Gevolgen , dan tot ons tegenwoordig bestek.

Om de mogelijke gebeurtenissen niet te verzwijgen , zal ik dezelve , met weinige woorden , beschouwen , en den Lezer voorts naar het Zevende Hoofdstuk zenden.

Eerstelijk : De Ribben en Wervelen worden somtijds hoe langer hoe wanfstaltiger , drukken de Long , leggen grond tot zeer benaauwde Ademhaling , Ontsteking en derzelve gevolgen. — De Teekenen dezer verschijnselen zijn niet duister.

Ten tweeden : Somtijds krijgen de Kwaadsappigheid en Koorts , blijkbaar uit de meerdere wan-
kleurigheid , hitte , versnelde pols en vermagering , de overhand. — De Luchtpijp wordt met slijm bezet , de kragten verminderen , het Kind wordt zwakker , teert uit , en sterft. — Men begeert geene Teekenen , welken dit gevolg doen vreezen.

Ten derden : Ik heb aangemerkt , dat deze Kwaadsappigheid ook uit de Zwelling van het aanzicht gekend wordt. — Indien deze zwelling verdwijnt , terwijl de sleepende Koorts voortduurt , en tevens eenige Stuipachtige trekkingen vernomen worden , de Buik opgezet blijft , en de onderste

Le.

Ledenmaten, tot het gebeente, uitgemergeld zijn, dan heeft men Teekenēn van een treurig vooruitzigt.

Ten Vierden : Indien de Oogen, te voren waterig, schielijk droog, fletsch worden, en hunnen glans verliezen, terwijl het Kind zeer zwak, en de Ademhaling, door taaije Slijm, aanmerkelijk belemmerd is, en een geratel onder dezelve gehoord wordt, dan zijn die Teekenēn even zoo vele Boden, welke den naderenden Dood verkondigen.

§ X L I.

Dit zij genoeg van de Kenmerken der Engelsche Ziekte, in haren onderscheiden loop, welken ik zoo duidelijk, als de vatbaarheid van den minstkundigen gedooft, heb trachten aantewijzen.

Doch het is voldoende, de Naaste Oorzaak eener Ziekte, uit gewisse Teekenēn, te kunnen onderscheiden, maar ter bekinge van eene meer volledige kennis der Ziekte, moeten de gewrochten dier Naaste Oorzaak op het Dierlijk gestel nader ontwikkeld worden.

VIJFDE HOOFDSTUK

Van de Toevallen der Engelsche Ziekte.

§ X L I I.

Op dat de goede orde en klaarheid onzen gang zoude befturen, meen ik, dat de overweging der Toevallen, naar de *drie onderscheiden Tijdvakken der Engelsche Ziekte* (§ XXIV) de geschikteste zijn zal, te weten; wij moeten dezelve overwezen, gelijk zij zich vertoonen,

eerst: in het *begin* der Engelsche Ziekte,

ten tweede: in haaren *voortgang*,

ten derde: in haar *einde*.

§ X L I I I.

De Toevallen der Naaste Oorzaak eener *aanzglijke* Engelsche Ziekte bepalen zich:

I. Tot de Maag en Darmen,

II. Tot de uitwerking van de Zuurgeworden Wei, in het Bloed.

§ XLIV.

§ X L I V.

Belangende het *eerste*. — Het Stremfel, en deszelfs hindernissen, zijn, wel is waar, geene eigenlijke toevallen van de Naaste Oorzaak; doch zij zijn, in de meeste gevallen, daar van niet wel aftecheiden, en kunnen op geen gevoeglijker plaats dan deze, beschreven worden.

Dit Stremfel brengt, uit hoofde van zijne zwaarte, taaiheid en bederf, verscheiden hinderlijke en gevaarlijke toevallen voort, welken of der eerste Teekenen van de Engelsche Ziekte voorgaan, of dezelve verzellen. — Gebrek aan Voeding en Uitteering waren, veeltijds, de gevolgen van dit Stremfel. — Ik zag tweemaal, in Lijkjes, een inkokering, door deze stoffe in de Darmen gevormd, waar door de opslurping belet was, en de Kindertjes tot den dood uitgemergeld werden.

Een ander soort van Toevallen in de eerste Weeggen heeft de Zuurgeworden Wei tot zijnen oorsprong, zoo dra deze Wei dien graad van scherpte bekomen heeft, dat zij het gevoelig binnevlies der Maag' en Darmen prikkelt, en somtijds van het zoo noodige Slijm berooft of ontvelt. — Van daar de meenigvuldige Walgingen, Brakingen, Stuipen, Buikpijnen en gestadigen Hoest, uit het medegevoel der Maag' met de Longzenuwen. —

Van

n daar ook meenigvuldige Afgangen; slijmige en medige Persloop, daar op volgende Zwakheid haar toevallen. — Uit deze Oorzaak zag ik in Koliekdarm, in een Lijkje van anderhalf jaar, ter lengte van drie duimen, — ontveld koudvurig.

Dit in het voorbijgaan, van Toevallen, welken eigenlijk tot ons bestek behooren, gezegd hebbende, komen wij nader tot ons onderwerp.

§ X L V.

De Toevallen der Engelsche Ziekte, in haar ste begin, zullen voor hem, die, het geen de Teekenen derzelven gezegd is, overweegt, duister zijn. — Men houde het daar voor, of die Teekenen, zoo verre zij Toevallen zijn, het geen gepoog is aangewezen, hierin ingelascht. (§ XXVI—XXXIII).

En, daar ik elders heb opgemerkt, dat de gesturpte Wei van het Zog, in den allereersten rang der Ziekte, dikwerf zoo zacht van aart is, dat de Toevallen, daar uit ontstaan, van geringe duur zijn, zoo zie ik geen reden genoeg, om een reeks van Toevalligheden, welken geene nader verklaring behoeven, te beschrijven.

Doch, daar men, aan den anderen kant, verplicht

pligt is te erkennen, dat eenige Toevallen, welken wij tot den tweede trap der Engelsche Ziekte betrekken, zich reeds onder de blijkbare Kenmerken derzelve, in den beginne vertoonen, zal ik, om in geene herhalingen te vallen, het daar voor houden, als of dezelve ook hier geplaatst waren.

§ X L V I.

Om de Toevallen, in het *tweede Tijdperk* der Engelsche Ziekte, tot het onderzoek van welken, zonder verwijl, overgegaan wordt, in eene geregelde schikking voortedragen, zal ik dezen leidraad volgen:

Eerst, zal ik de Toevallen opzamelen, welken hunne betrekking op de Adembaling en den omloop des Bloeds hebben.

Ten tweeden, zullen die Toevallen volgen, welken verzeld gaan met de onregelmatige Wasdom van sommige deelen.

Ten derden, zal ik eenige anderen, bij de voorgaanden niet wel gevoegd kunnende worden, laten volgen.

§ X L V I I.

Betrékkelijk de *Eersten*. — De Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte brengt in het Bloed eene
gis-

gting, en maakt het zelve tevens dun en scherp. — Hier uit ontstaan, Neusbloedingen, bloedige Fluimlozingen, Bloedhoest, welke Toevallen, bij deze Lijderijes, niet zeldzaam zijn.

Uit deze Kwaadsappigheid ontstaan ook velerlei soorten van hardnekkige Huidziekten en Keelgebreken, Vlakke Zweeren, Uitslag, enz.

Ook is de moeilijke Ademhaling, Hijging, en dergelijken, gedeeltelijk daar aan toeteschrijven.

De aanhoudende Prikkeling van dit, alzoo scherp geworden Bloed, met de uitwerksels daar van, veroorzaken, bij velen, eene Koorts, die gestadig aanhoudt; doch welke, bij anderen, tegen den nacht, heviger wordt, en met de gewoone toevallen eener sleepende Koorts verzeld is.

§ X L V I I L.

De Toevallen van het *tweede* soort (§ XLVI. n. 2) zijn niet minder blijkbaar, dan de voorgemelden.

De Gijl heeft de hoedanigheid verloren, om het Bloed, door behoorlijk voedende deelen, te herstellen. — Daar van de toevallen van Wangroei. — Sommigen Deelen zetten onmatig uit; anderen worden mager en uitgemergd; velen worden niet tijdig genoeg verhard, worden week of misvormd.

Naar mate van de onderscheiden Werking der aangedane Deelen, zijn de Toevallen, hier door ontstaan, ook zeer onderscheiden. — Dit verdient onze opmerking.

De Uitzetting van het Hoofd is een Toeval der Engelsche Ziekte, waarschijnlijk door den, gestadig vernielden, loop van het Bloed derwaards veroorzaakt.

Wij hebben te voren aangemerkt, dat deze Uitzetting een' zeer verschillenden vorm aan de Beenderen des Hoofds verschaft, en de Toevallen, naar geraden der verschillende, het zij gedrukte of gerekte, Deelen, onderscheiden zijn.

Eenmaal heb ik, door eenen nederwaardschen groei van het Voorhoofdbeen, waar door het zelve ongemeen plat werd, de Oogen uit hunne Kaslen zoo verre, en met zulk een gevolg, gedrukt gezien, dat het Kind bijna blind werd.

Eene meer gefnipperde Verklaring dezer Toevallen, en van hun vermogen op de aangedane Deelen kan even weinig dienen tot onderrichting van de gemeenen Man, als de vermeenigvuldiging v Waarnemingen. — Ook liep men gevaar, om af wijken tot het onderwerp der Gevolgen.

Onder deze Toevallen behooren ook die, wel uit de Zwelling en Verharding van den Buik staan. — Ik heb het oog niet op de dikte,

de Kazige Kappeling verwekt; maar op de verharding en zwelling der Klieren van het Darmscheil; op de uitgezette en verharde Lever, en voortgelijke gebreken, welken, na de ontleding van zulke Lijdertjes, ontdekt zijn, en uit de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte kunnen verklaard worden.

Welke Toevallen kunnen uit de gestremde werkzaamheid dezer Deelen ontstaan? — Kwaadsappigheid, Geelzucht, Waterzucht, gevolgen van eene werkeloze Lever, gebrek aan Gal en Gijl.

De verdorring der onderste Ledematen, de vermagering van het geheele ligchaam, is een Toeval der bedorven Voeding, des ook een gevolglijk Toeval van de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte. — Het streelend Melkachtig vocht, zoo onontbeerlijk tot onderhoud en waschdom van ons gestel, is in eene regtegegengestelde hoedanigheid verwandeld. — De Toevallen, welken hier uit noodzakelijk ontstaan moeten, zal de Lezer, uit het geene hem van de Wegen en Vereischten der voedinge niet meer onbekend zijn kan, en het geene hier omtrent verder gezegd is, genoeg opmaken. — Deze Toevallen staan, in hunnen aart en kragt, gelijk met het vermogen en aanzijn der Zuure scherpte. — Ik zou, met eene uitbreiding hier van, grooter onvatbaarheid, en minder oplettendheid, in den Lezer moeten onderstellen, dan

ik mag vertrouwen door de Utrechtsche Maatschappij bedoeld te zijn.

Men kent nu de Oorzaak van de gebrekkige Groei en Misvoeding, Zwelling, enz. der Beende-een en Kraakbeenderen, waar van, onder de Teekenen, uitvoerig gesproken is. — Daar door worden de Beenvliezen gerekt en gedrukt, de Zenuwen uit hun verband getrokken. — Welke pijnen en jammeren! — Zoo geweldig, dat de zachtste aanraking de bitterste smert, bij velen, veroorzaakt. — Even door dit Toeval der Engelsche Ziekte worden ook dikwerf de aanvoerende en terugbrengende Bloedvaten gedrukt en belemmerd. — Daarvan de Ontstekingen, Verhardingen in het Netvlies, Ontvellingen, Zweeren, Beenbederf, en dergelijke verschijnsels dezer drukking.

Deze smerten en koortsen zijn Oorzaken van Stuipen en Vermagering; inzonderheid, wanneer de tegennatuurlijke onëffenheid van de oppervlakte der Beenderen de pijnen vergroot.

§ X L I X.

De Toevallen van de *derde Verdeling* (§ XLVI) zijn hunnen oorsprong schuldig, of aan de Naaste Oorzaak, of aan de bovengemelde Toevallen.

Het zal met het oogmerk best strooken, weinig
te

te reppen van de zeldzaamste ; maar liever de meest voorkomende verschijnsels te verkiezen. —

Men kan , in dit geval , volstaan , met het geene de ervaring dikwils leert , zonder verplicht te zijn tot het verhaal van de speelingen der Natuur'.

Voor eerst. — Het Bloed van Kinderen , onder de Engelsche Ziekte kwijnende , is dun , los en onbewerkt. — Het Zuur maakt deze Ontbinding. — Hier uit ook ontstaan Bloedingen uit de Neus , het Tandvleesch , en uit de , door den zwakken toestand der Vezelen , verslapte en verwijderde uitwaasemende Mondjes in de Luchtpijp. — Dit laatste Toeval legt veeltijds den grond van Uitteeringen.

Ten tweeden. — De Sprouw , zoo gemeen aan deze Kinderen , komt dikwils , naar mate der zwakheid ; maakt de Doorzwelging , en het gebruik van ander , dan dun , voedsel , moeilijk. — De minste prikkeling der ontvelde plekjes in de Keel geeft Hoest , Hik , Walging en Stuipen.

Men heeft opgemerkt , dat alle Toevallen , vooral de Sprouw , van erger' aart zijn , wanneer de Vochten van het Kind , door de Venusfmet , vergifrigd zijn. — Een Uitslag , of eene Ontvelling , anders van weinig belang , wordt , daar door , van eene kwaadaartige natuur. — De ondervinding overreedde mij te dikwils van de deugdelijkheid dezer Praktikale stelling.

Ten derden. — De zwelling en verharding der Darmscheil-klieren, waar van wij boven spraken, zijn niet alleen onder de Toevallen der Engelsche Ziekte begrepen; maar, in eenen hardnekkigen staat derzelve, strekt zich even dit uit tot de Klieren van andere Deelen des Ligchaams. — Ik heb, meer dan eens aanmerkelijke Zwellingen en Verhardingen van een gedeelte der Klier, het Maagkussen geheel, of van die geheele Klier waargenomen. — Het is mede niet zeldzaam, dat de Klieren, in de groote Geledingen, vooral van het hoofd des Deibeens, zoodanig zwellen, dat het Been uit de holte gedrukt wordt. — Ook zwellen, bij sommigen, de anders onmerkbaar Onderhuidskliertjes.

Welk eenen nadeeligen invloed deze uitwerksels der Naaste Oorzaak van de Engelsche Ziekte hervoort brengen, kan gemakkelijk geraamd worden. — Welke gevolgen hier uit ontstaan, zal naderhand getoond worden.

Ten vierden. — Reeds met het begin, vooral in den tweeden trap der Ziekte, worden vele Lijdertjes, door eenen droogen Stuipächtigen Hoest, vooral des nachts, gekweld. — Dit toeval wordt, door de Prikkeling van het Zuur op de Zenuwen van de Luchtpijp, of van het Keelgat, of op de ontblootte Zenuwrepeltjes van de Maag en Slokpijp, te weeg gebragt,

Ten

Ten vijfden. — Deze ontaarting van het Bloed maakt, vooral bij Jongetjes, eene gedurige, zeer pijnelijke, droppelswijze ontlasting van de Pis, wanneer dezelve, meestal, eenen Zuuren reuk geeft. — Nog onlangs was ik gedrongen, om, wegens eene belemmerde Pislözing, dezelve, door den *Catheter*, te bevorderen. — Uit den stank en de gisting, door bijgevoegde tegenstrijdige dingen, werd ik, met dit nieuw bewijs, in het denkbeeld, nopens den Aart der Engelsche Ziekte, gesterkt.

Somtijds is de Pis slijmerig, en daar na, meer of min bloedig, maar dit heb ik zeer zelden ondervonden.

Ten zesden. — Het Tranen der Oogen, met eene blijkbare Zwakheid van het Gezigt gepaard, is, in eene vergevorderde Ziekte, niet ongevoen. — Even min als de Ontstekingen der Traanklieren, derzelven Verstopping, en loopende Oogen, of Traanfistels.

Ten zevenden. — Door de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte en haren invloed op het dierlijk gestel, worden ook onderscheiden Toevallen der zintuiglijke vermogens verwekt. — Wij hebben hier van reeds gesproken. — Het zij genoeg, bij het gezegde te voegen, dat de Lusteloosheid en Dommeligheid, somtijds, eene ware Slaapziekte te

weeg brengt. — En dar, indien de zinvermogen op eene voordeelige wijs, bewerkt worden, dwerf het eene Zintuig boven het andere uitmunt. Sommigen zijn wel alzins schrander, doch ander blinken uit in taaligheid van geheugen. — Het zigt van den eenen wordt opgescheept, bij anderen het Gehoor, enz.

§ L.

Na deze korte, doch, mijns bedunkens, voldoende opgaaf der Toevallen, in het begin en den voo gang der Engelsche Ziekte, moet nu derzelver ei overwogen worden. (§ XLII. n. 3).

Dit *einde* is, *of gunstig*, *of* meer *of min bed kelijk*. — Het een en ander wordt door de T vallen aangeduid.

§ L I.

Deze Toevallen geven hoop op een *voordee* einde der Ziekte, wanneer zij trapswijze in hevigh verminderen, de Teekenen van Kwaadsappigheid Vermagering wijken, en de kragten van dag tot vermeerderen.

§ L I

§ L I I.

De *bedenkelijke*, of *min gunstige Uitslag* der Engelsche Ziekte, kan billijk in twee verschillende soorten verdeeld worden, want zij eindigt met één, of meer *gevolgen* nadelaten, of zij eindigt in den dood.

§ L I I I.

Van de *gevolgen* der Engelsche Ziekte, behoudens 's Lijders leven, zal het volgende Hoofdstuk handelen. — Des moeten nu, eeniglijk, die Toevallen aangewezen worden, welken het Kind, hoogstwaarschijnlijk, of gewis, ten slagtoffer van de wreedheid dezer knagende, en alles ondermijnende, Kwaadsappigheid stellen zullen, of gesteld hebben.

Uit de herinnering der zwaarste Toevallen, in het tweede tijdperk, zal men de mogelijkheid van dergelijke verschijnsels begrepen hebben. — Zij bestaan ook alleen in de Verheffing derzelven. —

Trouwens

Voor eerst. — Wat heeft men van dikwijls wederkerende Ontlastingen van 't verdunde Bloed uit de Longvaten te vreezen? — Eene toenemende verzwakking van het gansche ligchaam, bepaaldelijk

der Longe, eene ophooping van Slijm in dat ingewand; een volstrekt onvermogen om het zelve te ontlasten, en den Dood.

Zulk een Toeval, met deszelfs treurig, of liever, om s'Lijders Jammer, gewenscht einde, werd meermalen, door den bijblijvenden Zuuren Prikkel des Bloeds te weeg gebracht. — Men houde dit, indien de Ziekte in haar begin, of voortgang, verwaarloosd wordt, voor eenen zeer mogelijken Uitslag derzelve. — Dit wordt ook, door verscheiden Waarnemingen, al te duidelijk, om er aan te twijfelen, bevestigd.

Verneemt gij, bij uw aëmechtig Kind, in dezen toestand, een gereutel op de Borst, wacht dan eenen langzamen, of met Stuipeu verzelde, doodsangst.

Ten tweeden. — Bij vele Lijvertjes wordt het scherpe Bloed niet alleen Waterig, maar, ook tevens Slijmig, terwijl met de medewerking van andere Toevallen, de krachten des Ligchaams trapswijze verminderen.

Bij zulken bespeurt men, eindelijk, bolle, zuchtige Zwellingen der Voeten, somtijds, daar na, ook van de Handen, eindelijk van de Beenen. — Het Kind wordt voorts, naar het schijnt, geheel Waterzuchtig. — Zulk een vermogen heeft de Kwaadspijghel! — Zulke Toevallen ontstaan uit het verzuurde Bloed.

Ik

Ik zag, nu en dan, zelf in eenen zeer verregaander staat der Engelsche Ziekte, dat deze Zwelling meer Windachtig, dan Waterzuchtig was; even als of de Huid opgeblazen ware, en dat die opblazing somtijds, door onverwachte, of stoutmoedig verwekte, Brakingen, spoedig verdween. — Doch, daar tegen, komt dezelve, bij herhaling ten voorschijn, en de Lijdertjes sterven dan aan de Waterzucht.

Ten derden. — Dat bij deze Lijderen, de Galmaking niet zelden gebrekkig is, en de Darmen, door gebrek aan Gal, niet genoeg geprikkeld worden, steunt op de ondervinding, en is door ons te voren opgemerkt. — Dat dit, door de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte, kan veroorzaakt worden, zou ik kunnen bewijzen, uit de strijdige innerlijke eigenschappen van de eene en andere vochten; doch dit zou weinig dienen tot ons een-vouwig oogmerk.

Uit dit Toeval ontstaan vertraagde en belemmerde Buikzuiveringen, die, door de beste Ontlastmiddelen bezwaarlijk bevorderd worden. — De Buik spant meer en meer op; de Darmen verliezen hunne veêrkragt, de Ademhaling wordt, door de opspanning des Buiks, bezwaarder. —

Voegen zich, bij dit Toeval, noch anderen van gewigt, des te kommerlijker zal de uitflag dezer Ziek-

Ziekte zijn. — Het zou mij waarlijk, in dat geval, niet bevreemden, dat het Koud Vuur het binnenbekleedfel der Darmen, voor een gedeelte aangreep, dat het Lijdertje Stuipen kreeg, en stierf.

Ten vierden. — Bij anderen, in tegendeel, nemen de Ontlastingen van den Afgang, in getal en kwaadaartigheid, toe, zoo dat zij, eindelijk eene rottige scherpte verkrijgen, de Darmen ontvellen, en eenen doodelijken, slijmigen, of bloedigen Loop te weeg brengen. — Vooral heeft men dit, na eene verzuimde Engelsche Ziekte, te vreezen, bij kinderen, welken zwaar gezoogd, of met Melk gevoed worden. — Ook zijn deze Ontlastingen des te gevaarlijker, wanneer tevens de Pisloozing belemmerd is. — De eenige Erfgenaam van aanzienlijke Ouderen was, weinige Jaren geleden, het treurig offer van dit moorddadig Toeval.

Men beschuldige echter de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte niet al te veel; want deze doodelijke Ontlastingen verneemt men dikwerf bij zwakke Kinderen, hoewel bij hen geen schijn der Engelsche Ziekte te vinden is.

Ten vijfden. — Wanneer, gedurende de bovengemelde Toevallen, het te voren gezwollen Aangezigt krimpt, en als kleiner wordt; wanneer de voormaals heldere Oogen verduisteren, en eenen vochtigen Ring zich rondom het doorschijnende

Hoorn-

Hoornvlies vertoont; de flauwe, schoon radde, Adem, eenen hinderlijken zuuren en heeten reuk geeft, en, daarna, de zoolen der Voeten ongevoelig worden; de poozen, tuschen de uit- en inademin-gen, eerst korter, daarna langer worden, afbreken, dan zal de flauwe lamp des jongen levens spoedig gebluscht worden. — De gansche Geneeskunde is onvermogen, om eenige Olie van gezondheid in te gieten.

§ L I V.

Dit is de onderscheiden loop der Engelsche Ziekte. — Dit zijn de verschillende Toevallen derzelve. — De Natuur herstelt haar, indien zij zacht van aart is, dikwerf zonder eenigen onderstand. — De Kunst, door onkundigen bestuurt, stremt de heilzaamste pogingen der Natuur meer dan te dikwijls. — In zulke handen is vaak de beste Artzenij een moordmiddel. —

De beste Geneesheer, de ervaren, de getrouwe en op alles werkzame Menschenvriend slaagt somtijds in dit, veelmaal netelig, gebrek zelden volkomen; maar het zelve laat Gevolgen na van verschillenden aart en gewigt. — Welke zijn die Gevolgen? — Dit is het onderwerp van het volgende Hoofdstuk.

ZES-

ZESDE HOOFDSTUK

Over de Gevolgen der Engelsche Ziekte.

§ L V.

DE Gevolgen der Engelsche Ziekte worden verklaart, *Voor eerst*; uit de, na de herstelling der Naaste Oorzaak, overgebleven gesteldheid des ganschen Ligchaams.

Ten tweeden; Of zij hebben hunne betrekking tot eenige van deszelfs Deelen, of

Ten derden; Zij blijken uit den Toestand van de vermogens der Ziele.

Dit verdient nadere overweging.

§ L V I.

Wat *het eerste* betreft: — De Engelsche Ziekte kan in gansch het Ligchaamsgestel Gevolgen nalaten, welker belangrijkheid gelijk staat met de meerdere of mindere hevigheid der Naaste Oorzaak, of van hare gewrochten.

Be-

Befchouwd dit Kind, van de Engelsche Ziekte genezen, doch gekweld door hare overblijffels; — Befchouw in dit Kind het beeld der meesten. — Zijn Bloed is Slijmerig, en, hoewel thans vrij van eene Zuure fcherpte, echter zeer Kwaadfappig. — Hoe zouden dan de Vochten, van zulk Bloed gefcheiden, dien graad van deugdelijkheid, welken zij in een gezond geftel hebben, kunnen bezitten? — De Gal mist hare zeepachtige hoedanigheid, de Gijl zijn voedend vermogen, en ieder der overige Kliervochten hunne eigenaartigheid, welke tot eene volkomen welvaart gevorderd wordt. — De bleeke kleur van het Aangezicht, de raaije aschkleurige Drek, de heldere witte ongekookte Pis, zijn waarborgen voor de opgemelde Vochtsgefteldheid.

Befeft gij nu nog de reden niet, van den langzamen groei, en trage volkomenheid dezès Kinds? Gist gij nog naar de Oorzaak, waarom velen zoo langzaam en onordelijk ontwikkeld worden? Waarom sommigen, Jaren lang, de Teekens van kwaad Bloed vertoonen? Waarom de meesten, eenige jaren, zwak en teeder blijven?

Let op de vaste deelen van het Kind. — Zij staan in eene gelijke reden van deugdzaamheid met de vochten. — De Vezelen zijn week en flap. — De Vaten, van allerlei foort, missen de genoegzaame

zaame veêrkragt, of weêrkeurig vermogen op de Vochten.

Gansch het gestel van dit Ligchaam ademt Broosheid en Werkeloosheid.

De Zenuwen, in zoo verre dezelve aan den Waschdom medewerken, en den Deelen, daar toe geschikt, vuur en leven moesten verschaffen, zijn noch aandoenlijk noch werkzaam genoeg.

Vereenig deze algemeene Gevolgen, en de Reden van des Kinds overgebleven zwakheid en langzamen groei zal ten overvloede blijken. — Gij zult daar uit de bleeke kleur der Lippen, het, meest altijd, wit beslag op de Tong, de Kortademigheid, de spoedige Vermoeidheid, de flaauwe Pols, den tragen en lijmgigen Stoelgang ontwaren, — ook geene duisterheid vinden, om te bevroeden, waarom dit zelfde Kind dikwerf zeer loslijvig is.

Deze Gevolgen bragt de Engelsche Ziekte te weeg! — Gevolgen, waar aan dit Kind, waarschijnlijk, eenigen tijd lang fukkelen zal!

Deze gesteldheid verpligt de Ouderen tot eene verdubbelde zorg voor den welvaart van dit Kind. — Het zelve is, ja! minder vatbaar voor Ziekten, welken eene meerdere aandoenlijkheid en prikkelbaarheid der Zenuwen vorderen, dan dit Kind bezit; doch, daar tegen, heeft het zelve voor andere Ziek-

Ziekten eene overheerschende voorgeschiktheid, die bij Kinderen, welken stevige Vezelen en gezonde Vochten hebben, in dien graad geen plaats vindt. — Hier van zult gij, door de meer bijzondere overweging dier duchtige Gevolgen van de Engelsche Ziekte nader overtuigd worden.

§ L V I I

Wij moeten ten dien einde, de Gevolgen, gelijk dezelve zich in de *bijzondere Deelen* des ligchaams vertoonen, (§ LV n. 2.) aanwijzen.

Laat ons dit ruime veld, voetslaps echter, zoo lijnregt en zeker betreden, als de waardij der zaak en het verlangen des Genootschaps vorderen.

De Deelen, welken de meeste aandacht vereischen, zijn:

Voor eerst, het Hoofd;

Ten tweeden, de Borst;

Ten derden, de Buik;

Ten vierden, de Nieren en de Blaas;

Ten vijfden, het overige Gebeente, waar van niet gesproken is.

§ L V I I I.

De gesteldheid van *het Hoofd* is, onder en na

G

de

de Engelsche Ziekte, zeer onderscheiden. — Het eerste zagen wij elders (§ XXXIV.), van het laatste is nog iets te zeggen.

De Beenderen van de Hersfenpan behouden veel-tijds een gedaante, welke aan het Hoofd eenen onderscheiden vorm, levenslang, overlaat, en (mag ik eens gissen?) somtijds een voordeeliger staat der Hersfenvermogens aan zulke Menschen geeft, dan zij mogelijk anders zouden gehad hebben. — Ziet gij eenen Man, met een holwijs, breed Voorhoofd, overhangende bovenranden der Oogholten, en daar door diepgedolven Oogen, — is hij tevens klein van postuur, en hier of daar verminkt, scheenkuitig, enz. — Vraag hem of deze Wanfstalte door de Engelsche Ziekte veroorzaakt is; en indien het antwoord onzeker is, houd dan die voorafgaande Oorzaak voor hoogst waarschijnlijk.

Ik heb verscheiden Mannen van Naam gekend, van wier vernuft de geleerde Waereld en Nederlands Kerk dagelijks de vruchten trekken, terwijl de even-gemelde gesteldheid des Voorhoofds, ten hunnen aanzien, op de gunstigte vooroordeelen aanspraak maakt. — Ik ken drie Gebroeders, welken (indien ik mij niet bedrieg) in hunne Kindsheid met de Engelsche Ziekte zijn gekweld geweest. — Dezen althans zijn van zulk een Voorhoofd voorzien, en daar door, als mede door hun overig zamenstel,

zoodanig aan elkanderen gelijk, dat de een van den anderen, hier omtrent, even als met betrekking tot hunne verheven Geestgesteldheid, naauwlijks kunnen onderscheiden worden.

Anderen behouden, als een gevolg der Engelsche Ziekte, een plat en weinig gebogen Voorhoofd, met meer of min uitpuilende Oogen, en een buitenwaards uitgezet Achterhoofdsbeen, of verheven Opperhoofdsbeenderen. — Doch indien mijne opmerkingen gegrond zijn, dan is deze gesteldheid niet voordeelig aan het vernuft.

Bij eenigen sluiten de verwijderde Naden der groote Hoofdbeenderen zeer traag. — Bij eenen Jongeling van tien Jaren, welke, na deze Ziekte, een ongemeen groot Hoofd heeft overgehouden, kan ik het middenste gedeelte van het Opperhoofd dagelijksch nog zoo zacht en vliezig bespeuren, als bij een Kind van één Jaar.

De wanstaktigheid van het Hoofd blijft somtijds zeer ongeregeld; elders verheven, elders ingedoken, plat, of gansch misvormd. — Wanneer de eene Oogholte grooter is, dan de andere, het eene Oog scherper gezicht heeft dan het andere enz. — Doch deze snipperingen verder aan te wijzen, of dezelve met Waarnemingen te bevestigen, zoude mij, en den Lezer, die daar van, uit het voorgaande, kennis genoeg heeft, verveelen.

Men houde echter deze gestalte van het Hoofd niet altijd voor een beslisschend Teeken en een zekere Gevolg der Engelsche Ziekte. — Ik zou, met levende voorbeelden de faalbaarheid van zulk een besluit kunnen bevestigen. — Heden nog zijn drie Kinderen onder mijne behandeling, bij welken de Engelsche Ziekte geen twijfel laat, doch hun Hoofd ondergaat, dus verre, geene de minste verandering.

§ L I X.

Ten tweeden, de Borst. — Dat de Engelsche Ziekte veeltijds verschillende, dikwerf hinderlijke veranderingen der Borstholte nalaat, is overbekend.

Evenwel zijn, bij sommigen, de Wervelen, de Borstbeen en de Ribben in diervoegen geschikt dat de, anders Wanfstaltige, mensch, even, daardoor, ten voordeele der Ademhalinge, geen klein gewin deed. — Ik ken twee, door de Engelsche Ziekte gebogchelde Leeraars, welke in kragt van Stem, en langte van Adem, boven hunne Amptgenoten uitmunten.

Dit gevolg is, meest al, zoo gunstig niet, want doorgaans maakt dit soort van Wangroei eene vernauwing dezer holligheid, welke, op de minst versnelde beweging, de Ademhaling moeilijk, en de Spraak bezwaarlijk maken.

Me

Met opzigt tot de Ingewanden der Borstholte, ontmoeten wij Gevolgen van aanbelang. — Ik zwijg van de Ademhaling en Hartkloppingen, als noodzakelijke Gevolgen van de Wanfstalte der Beenderen, om dat daar van reeds genoeg gezegd is. — Wij hebben hier vooral het oog op het werktuiglijke gestel der Long', en hare afwijking van den gezonden staat, door voorafgaande Knagingen en Bloedheest veroorzaakt. — Immers, een Kind aan eene uitteerende verzwearing der Longe, het zelve door de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte berokkend, te zien kwijnen, en zelfs, in eenen gevorderden Ouderdom, te zien bezwijken, kan, door geenen bedreven Arts, onder de bijzonderheden zijner Praktijk gerekend worden.

Eenigen zagen wij, omstreeks de huwbare Jaren, herstellen, doch anderen, die, al kwijnende, voortleefden, stierven eindelijk aan de Teering.

Ik meen te hebben opgemerkt, dat, wanneer zulke Kinderen, omstreeks den Ouderdom van zeven Jaren, eene Schurfsiachtige, of andere hardnekkige Huidziekte krijgen, dat, zegge ik, als dan die nieuwe Ziekte, bij den eenen, eene merkelijke beterschap, door de afleiding der Stoffe, en, bij eenige weinigen, zelfs eene volkomen herstelling aanbragt.

Andere Gevolgen van dit gedeelte des Lichaams

ontdekt men eerst na den dood, gelijk een ophooping van Water in de Borstholte, eene slijmige inpakking in de Long, of eene aanmerkelijke verharding van derzelver Klieren. — Verschijnsels! welken mij, na ontleding van eenen twaalfjarigen Lijder, welke, na de Engelsche Ziekte, aan eene hebblijke Borst-benaauwtheid kwijnde, gezamenlijk zijn gebleken.

Sommige gewrochten behooren tot de schaarsch voorkomende bijzonderheden, of zijn van weinig aanbelang.

§ L X.

Ten derden, de Buik. — Hier opent zich eene nieuwe bron van rampen. — Mijn gevoelig hart trilt door het aantal der treurige Gevolgen eener enkele Ziekte. — Wien treft deze sombre lijst van ellenden niet? — Het menschelijk medegevoel doet mij dubben, om liever mijn Plan te staken, dan om het aandoenlijk hart van tederlievende Ouderen nog meer te treffen; — Maar eerezucht vordert, in weérwil van alle tederhartigheid, dat ik mijn begonnen werk niet stake. — Men schrijve dit uitstapje toe aan ware Kindermin.

Eene hardnekkige, en der beste poogingen van den kundigsten Geneesheer wederstreevende, Verharding en Opspanning van den Buik, behoort tot de

de Gevolgen van de Engelsche Ziekte, welken dikwerf voorkomen.

Van de Loslijvigheid, en tegenövergestelde Hardlijvigheid, welken dezen Kinderen, dikwerf, bijblijven, heb ik te voren gesproken. — Sommigen moeten, door Stremmende, anderen, door Ontlastmiddelen, telkens bijgestaan worden.

Wanneer de gezwollen Buik slinkt, verneemt men, bij eenigen, ongelijke Verhardingen, welken, na den dood, door eene Klierachtige verharding ontwaard worden ontstaan te zijn. — Ik heb nooit een Lijk geopend, het welk men vermoedde, zijn noodlot aan de Gevolgen der Engelsche Ziekte verschuldigd te zijn, of ik heb de Klieren van het Darmscheel opgezet en wankleurig gevonden. — Dit wordt ook door andere Waarnemingen bevestigd.

Mag ik hier iets laten volgen, het geen ik geen beter plaats weet te geven? — Men stelt op de Lijst der Gevolgen onzer Ziekte de Wormen en de Vallende Ziekte. — Ik geloof, dat geen van beiden, dien Blaam verdienen. — Ik ontken niet, dat vele Kinderen, na de Engelsche Ziekte, Wormen hebben; maar andere Kinderen zijn ook daar mede gekweld. — Dat velen Zenuwtrekkingen, als die eener Vallende Ziekte, vertoonen, is ook waar; maar of dit, in de daad, een gevolg der Engelsche

sche Ziekte zij, zal ik liever in twijfel laten, dan tegenspreken. — Het is intuschen zeker, dat, wanneer een Kind, beneden tien of twaalf Jaren, door de Vallende Ziekte geschokt wordt, dezelve doorgaans het gewrocht is van Wormen, en dat de genezing dier Ziekte, in het dooden of uisdrijven van dat Ongedierde, te vinden is.

Wat reden heeft men dan, om de Engelsche Ziekte, die waarlijk meer dan te vele treurige nasleepen achterlaat, met twijfelachtige Gevolgen te bezwalken? — Het gaat zoo! — Men is vaak te overbodig gul met eene Ziekte, aan welker Beschrijving men bezig is, Gevolgen optedringen, waar aan zij geen deel heeft. — Hier mede wil ik echter geenzins ontkennen, dat het geprangd Hersfengestel soms Stuipen, die naar die der Vallende Ziekte zweemen, na de Engelsche Ziekte, kan veroorzaken, om dat ik door de ondervinding, daar van te wel overreed ben.

De Breuken en Uitzakkingen des Endeldarms kunnen, met meer regt, onder de Gevolgen van de Toevallen der Engelsche Ziekte betrokken worden. — De geweldige Hoesten, door eenen scherpen zuuren Prikkel, door slijm in de Luchtpijp, of uit Meêwarigheid ontstaan, de Walgingen en Brakingen, gevoegd bij de Zwakheid der Darmen, en geringen wederstand van de ringen der Buikspieren, zijn

zijn zamen juist geschikt, om die Gevolgen nate-
laten.

§ L X I.

Het vierde soort van Gevolgen, tot deze Klasse
betrekkelijk, (§ LVII. n. 4.) zoude in de wer-
king, of gesteldheid der *Nieren*, en van de *Pis-
blaas* te vinden zijn.

Eenigen der jongste Schrijveren over de Engel-
sche Ziekte willen, dat de Zuure Wei des Bloeds,
of Naaste Oorzaak van die Ziekte, de Wijnstee-
nige aardstofte van het Bloed vermeerderdt en ver-
dikt, en dat de Kinderen, daar door, eene bijzon-
dere geschiktheid voor Graveel- en Steenziekten
erlangen, om dat deze stof het voornaamste Steug-
sel en Voedsel aan de Steenen verschafft.

Men kan dit zeer spoedig beweeran; — Doch
dewijl mij geene gisfingen, in de Praktikale be-
fchouwing der Ziekten, wanneer de gronden der
Geneeswijze daar op steunen, bekooren, en mijne
ervaring hier omtrent, niets ter hand stelt, ver-
kies ik deze Stelling zoo lang voor rekening dier
Schrijveren te laten verblijven, tot dat, uit eene
vergelijking der Graveel- en Steenziekten Lijderen,
welken voor af, al of niet, met de Engelsche
Ziekte zijn gekweld geweest, de waarheid dier
Stelling' genoegzaam blijkt. — Want van de moge-
lijk-

lijkheid eener zzak tot haar wezenlijk bestaan te besluiten, is strijdig met gronden, waar op echte Waarnemers hunne ondervinding verplicht zijn te vestigen.

Wij brengen, met meerder zekerheid, de *Drop-pel-pis* op de Lijst dezer Gevolgen, om dat dezelve, na de Engelsche Ziekte, niet ongewoon is, inzonderheid bij Jongetjes, welken, onder den loop dezer Ziekte, slijmig of bloedig Water geloosd hebben.

De tegennatuurlijke grootte van de Blaas, even als van de Lever en Longe, door eenige Ontleders waargenomen, wordt insgelijks gerangschikt onder deze Gevolgen; doch mijns oordeels, zoo lang ten onregte, tot het verband tusfchen de Naaste Oorzaak der Ziekte en deze Gevolgen getoond wordt. — Of verneemt men dit altijd bij zulken, die deze Ziekte ondergingen? — In tegendeel. — Of vernemen wij even dit niet dikwerf in Lijken van Menschen, welken nimmer iets van deze Ziekte ondergaan hadden? — Men verdenke mij niet van eenen tegenstribbeligen ijver. — Daar het der waarheid geldt, mag geen gezag ons kluisteren. — Ook verbied de edelmoedigheid, om eene Ziekte met Gevolgen, waar aan zij geen deel heeft, te bezwaren.

§ L X I I.

Eindelijk. — Dat een aantal *Misvormingen* van het gebeente tot deze Gevolgen behooren, zal men reeds hebben opgemerkt.

Zamengroeiing, Uitzetting, ongelijke Grootte, Scheefte en Knaging der Beenderen, zijn zoo veele onderscheiden wanorden, welken, afzonderlijk, of gezamenlijk, tot nasleep der Engelsche Ziekte behooren. — Dat eigen bevinding ook hier mijne gidse zij! — Ik zal, met een eerbiedig stilzwijgen, nopens het toestemmend of ontkennend gezag' mijner Voortgangeren, niemand beledigen, en, met eene korte ontwikkeling van dit onderwerp, mijn oogmerk best bereiken.

§ L X I I I.

De *Zamengroeiing* bespeurt men meest in de Ligchamen der Wervelen, somtijds ook van de benedenste Ribben, en, schoon zelden, vinden wij de Knieschijf onbeweegbaar gehecht aan de Hoofden van het Dei- en Scheenbeen. — Van elk dezer Aanëenhechtingen bezit ik voorbeelden, welker bestaan in geene andere, dan de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte, kan gevonden worden.

§ L X I V.

De *Uitzetting*, of tegennatuurlijke dikte der Beenderen (*Exostosis*) kan insgelijks een overblijfsel van dezelfde Ziekte zijn. — Dit gebrek heeft vooral plaats aan de hoofden der groote Beenderen, schoon zij, welken eene verzameling van Zieke Kinderbeenderen bezitten, met duidelijke proeven, kunnen toonen, dat dit Gevolg ook dikwijls aan het overige gedeelte van deze, en van andere Beenderen te vinden is. — Ik bezit het Borstbeen van een Kind, vier Jaren oud, aan een Longzweer, na dat de Engelsche Ziekte zijn ligchaam gemarteld had, gestorven; welk Borstbeen zeer sponsachtig en tweemaal dikker is, dan naar gewoonte; — als mede een Deibeem van het zelfde Kind, welks midden zeer knobbelachtig, sponsachtig, bros en ongemeen dik is. — In dit geval was geene reden, hoe genaamd, om eenig overgeërfd kwaad te vermoeden.

§ L X V.

Het geen wij elders, als een Teeken, naderhand als een Toeval der Engelsche Ziekte hebben opgegeven, heeft ook geene mindere aanspraak dan anderen, om onder den rang der Gevolgen geplaatst te worden. — Ik bedoel den *ongelijken Groei* der Beenderen, schoon die anders gezond zijn.

Deze brengt, gelijk men zich, uit het voorgaande

de herinnert, dikwerf Misvormingen des Ligchaams te weeg, welken, naar de onderscheiden werkzaamheid der Deelen, ook verschillende Gevolgen nalaat. — Mij is een Huis-gezin bekend, van het welke vier Kinderen, door deze Oorzaak, zonderling wanstaltig zijn. — Een Dochtertje van agt Jaren heeft een zeer groot Hoofd, wederzijds plat, en het Voorhoofd breed en uitpuilende. — De Arm- Scheen- en Kuitbeenderen van de Linkerzijde, zijn merkelyk korter, dan naar behooren. — Dit heeft ook plaats aan het regter Deibeene. — Het voorste Beentje van de linker Pink, en van den middensten Vinger, hebben ook de vereischte lengte niet, maar zijn veel te dik.

Het Gebeente van de andere Kinderen is, op eene dergelyke wijs, misgroeid.

§ L X V I.

Ten aanzien van de *Kromte* der Beenderen, heeft men slechts de ondervinding te raadplegen. — Deze bespeurt men meest aan de Dei- Scheen- en Kuitbeenderen. — De reden is te vinden in het gewigt van het Bovenlijf, vergeleken met de zwakheid van het Kind, en de buigzaamheid dier Beenderen. Om deze reden vangt het gebrek zelden aan, voor dat het Kind gaat.

§ L X V I I.

§ L X V I I.

Eene, telkens wederkeerende, en verscheide deelen des Ligchaams teisterende, *ontsteking van het Beenvlies*, met de daar op volgende *Beenletters*, of ander soort van bederf, hebben wij di werv na de Engelsche Ziekte zien volgen, en, weêrwil van den besten raad, hardnekkig bijbiven. — Dit is te bekend, om eenig bewijs vorderen. — Gebeurtenissen van aanbelang hebben mij echter nimmer de voorzigtigheid doen klagen, om rijpelijk te onderzoeken, of ondie gebreken, ook een verholten Venusmet schuilt.

Nochtans moeten de *Tanden* en *Kiezen* deze bedenking, immers meestal, uitgezonderd worden. — Eene ernstige Engelsche Ziekte schijnt vooral, eenen schadelijken rol te spelen op geen tot den Groei en Stevigheid dezer Deelen eischt wordt; zoo dat dikwerf een beletsel van dezelve levenslang overblijve. — Trouwens meesten dezer Kinderen krijgen zeer laat hun gebit. — De Tandem, indien zij al ten voorschijn komen, zijn veelal bedorven en uitgevreeten zwart brokkelig en murw: — wordt zelfs, bij eenigen, niet het Tandvleesch, als door de scherpste Blaauw schuit, weggevreeten en stinkend, zonder dat men reden heeft om iets Venerieks te onderstellen?

§ LXVIII

§ L X V I I I.

Dat de werkoorzaak van deze Gevolgen (§ LXII — LXV) in de Ontaarting van het voedende Vocht, door de weekmakende zuurachtige Kwaadsappigheid, bevorens gewrocht, in de daad te vinden zij, kan men thans niet meer vergen te bewijzen.

§ L X I X.

Sommigen dezer Gevolgen verdwijnen van zelve, of, met behulp der Kunst, in rijper Jaren. — Anderen misvormen den Mensch zijn leven lang. — Eenigen verschaffen hem hindernissen, die onoverkomelijk zijn. — Ettelijken belemmeren hem in de Voortteeling, of liever in de voortbrenging van zijn geslacht. — Ik bedoel hier voornamelijk de miswasfing der Beenderen van het vrouwelijke Bekken, welke door de Engelsche Ziekte te weeg gebragt wordt. — Wie wil, leze hier over de Werken van MORGAGNI, LIEUTAUD, LEVRET, PUZOS, SMELLIE, en anderen, welken de verschillende foorten der hindernissen van de Verlossing, met ondervindelijke bewijzen, bevestigden.

Zal ik der waarheid hulde doen, dan ben ik hier verplicht, om zulken te wederspreken, welken beweeren, dat eene Zwangere, die een, door de
En-

Engelsche Ziekte, mismaakt Bekken heeft, eve daarom *altijd* gevaar loopt van eene moeilijik Verlosfing. — Het tegendeel ziet men dikwerf: — Ik heb een Meisje, na de Engelsche Ziekte, m een scheef en gedraaid Bekken, opgegroeid gezier zoo dat zij, ter naauwer nood, vier Voeten lan werd. — In weêrwill van alle waarfchouwingen trad zij in den Echt met een lang en gewigtig Mar die, op het geld verliefd, misfchien het vooruitzi had, om eerlang daar van alleen bezitter te zijn. — In die verwachting werd hij te leur gefield: — De fcheeve mismaakte is thans Moeder van Zes Kinderen, van welke allen zij zeer voorspoedig en natuurlijk verlost is, en welken door haar zelve gezoog zijn.

De meesten van zulke misgroeide Vrouwen zij echter zoo gelukkig niet, om dat dergelijke War groei het Bekken doorgaans vernaauid; en dikwe kost dit Moeder en Kind, of een van beiden, he leven. — Dit met overredende Voorbeelden te toen, zou gemakkelijk genoeg, maar ontijdig zijn.

§ L X X.

De Gevolgen welke de Engelsche Ziekte in d *Zintutglijke vermogens* nalaat, moesten wij thar aanduiden (§ L.V. n. 3.) — Doch, om in he tegen

tegenwoordige onderzoek geene gaping overtelaren, zal ik alleen te herhalen hebben, het geen, onder de Toevallen, daar van gezegd is.

Het berigt der Waarnemers is, in 't gemeen, hier omtrent, vrij gunstig, om dat zij meenen, dat de Engelsche Ziekte de Kinderen vernuftiger en rijker van geheugen maakt, dan die anders zouden geweest zijn. — Ook hebben zij, mijns oordeels, geen ongelijk; — Echter zouden wij kwalijk doen, met hier omtrent geene Uitzondering te maken. — Velen toch mijner Lijderen bleven stomp van oordeel, en behielden een zeer bekrompen geheugen. —

Een Zoon van een' mijner waardigste Vrienden, (die, wegens zijnen uitmuntenden Geest en blinkende Godsvrucht, een Star van de eerste grootte aan het gewelf van Neêrlands Kerk was, en ons helaas! te vroeg onttrokken wêrd) bleef, na de Engelsche Ziekte, tot zijn negende jaar, toen hij tierf, kindsch, en onvatbaar voor een denkbeeld, het welk uit twee of drie woorden bestond. — Zijn Hoofd was wederzijds plat gedrukt, en bovenwaards opgetogen, als een Suikerbrood.

Een Meisje van voornamen Huize, gaf sterke teekens van een schranderen Geest, tot omtrent hetzelfde tweede Jaar; toen vermeerderden de Toevallen der Engelsche Ziekte. — Het Hoofd werd

wanftalzig; de Rugwervelen zetten zich uitwaards; levendigheid van den Geest, en de sterkte van de Geheugen verminderden traspwijze, en de Verftandlijke vermogens werden eindelijk, en bleven voort zeer bekrompen.

Ook krijgen de bijzondere Zintuigen, bij fomnigen, eenen zwaaren krak. — Deze wordt en blijft na de Engelsche Ziekte, kortzigtig. — Een ander verliest grootendeels, zijn gehoor. — Een derde, bij welken de Oog- en Neusbeenderen ingevallen zijn, die geenen reuk altoos heeft.

Zijn deze, zoo verfchillende, Gevolgen te verwonderen, na eene Ziekte, welke zoo veele verfchillende veranderingen in het Hersfen- en Zenuwgeftel te weeg brengt, als wij, meer dan eens getoond hebben?

Dan, hoe de Naaste Oorzaak en de Gevolgen dezer Ziekte eigenlijk op het verband van Ziel en Ligchaam werken, zal ik, voor als nog, uit enkel onkunde, niet bepalen. — Wij zijn te vreden met het geene de ondervinding leert. — Men zag (dit strekke tot troost dier ongelukken) dat ook de Gevolgen, met den tijd, meer of min, verdween

§ L X X I.

Deze zijn de Gevolgen, welken de Engelsche Ziekte

Ziekte kan nalaten, en welken, somtijds voor een groot gedeelte, bijblijven.

Wie zou zich niet beijveren, om dezelve te voorkomen? — Wie niet, die de bezwaarnis, om dezelve te genezen, bij ondervinding, kent?

Men zal echter best doen, alvorens men zich ter voorbehoedinge dier Gevolgen schikke, te onderzoeken, of zij waarlijk te verwachten zijn, en voor welken men meest te duchten heeft.



ZEVENDE HOOFDSTUK

De Voorzegging der Engelsche Ziekte.

§ L X X I I.

WAT is de *Voorzegging* der Engelsche Ziekte? — Is dezelve gegrond op eene voorafgaande ontdekking van het geene uit den zamenloop der *Voorgeschiedheid en opwekkende Oorzaken*, na de eerste negen levensmaanden van een Kind, zoo verre dit de Engelsche Ziekte betreft, te hoopen of te vreezen zij? — Of is die *Voorspelling* alleen *betrekkelijk* tot het geen te wachten is, *wanneer de Ziekte bestaat, of in trap gevorderd is?* — Naar mijn begrip, behoort het eene daar toe zoo wel, als het andere.

Dit *tweeledig Onderwerp* heeft eenen billijken aanspraak op des Lezers aandacht.

§ L X X I I I.

De gronden der *Voorspelling* eener nog niet aan-

aanwezige Engelsche Ziekte worden eenigzins ontdekt:

Voor eerst, uit de gesteldheid der Ouderen, vooral van de Moeder, ook der Minne;

Ten tweeden, uit de gesteldheid van den Jonggeboorenen;

Ten derden, uit de vergelijking van beider onderling Vermogen.

De ontvouwing, waar toe wij hier verplicht zijn, zal minder uitvoerigheid noodig hebben, wanneer men zich herinnert, het geene, ten aanzien der Oorzaken, gezegd is.

§ L X X I V.

Eerstelijk. — Al wat aan de zijde der Ouderen, of van de Zoogster in 't bijzonder, de voorschikgende Oorzaak der Engelsche Ziekte, bij den Zui-geling, bevordert, levert gronden van waarschijnlijkheid, om dezelve te voorspellen.

Is de Vader, op eenigerhande wijze, vooral door Zaadverspilling, verzwakt; is hij, door het minnevuur, uitgemergeld, en heeft hij zijne kragten voor het altaar van *Venus*, verlooren; zijn zijne Vochten, door Brasferijen, het misbruik van Wijn, Sterken-drank, of door andere wangedragingen, bedorven, dan is zijn Zaad (BOERHAVE getuigd het) zooda-

nig verminderd, dat het zelve ongeschikt is om steevig Kinderen te teelen. — Voorſpel gerust, dat zij Kroost, waarſchijnlijk, bijzondere Zaden der Engelsche Ziekte zal medebrengen, of ligtelijk verkrijge

Deze Voorzegging zal nog meer gronds hebben indien de Moeder Zwak, Scheurbuigig, of Venerisch; indien zij, tijden lang door den witten Vloed of sterke Stonden, is gekweld geweest; eene zeer zwakkende Leefwijze gehouden; zich met zoete gesuikerde Lekkernijen, warme Water- en Melkdranken, zoete Wijnen, enz. gevoed heeft; — indien zij een vadſig en werkeloos leven leidde, met overvloed, indien haar Ligchaam, uit Kwaadſappigheid onbestand is om hare Vrucht eene andere Ligchaamgeſteldheid te verſchaffen, dan die tot de bijzondere Zaden der Engelsche Ziekte behoort.

Ontmoet gij zulk een paar, ontleen dan gerust daar uit een grond van Voorzegging der Engelsche Ziekte. — Neem anders de ondervinding te hulp en aarzel vooral niet, om, wanneer een der Kinderen van deze Ouderen, of van dergelijke Zoogsters, de Engelsche Ziekte aangetast wordt, dezelve zo lang zij in dien ſtaat blijven, ook bij hun nadergend kroost, te voorspellen. — Of herinnert u niet, het geene deswegens, bij de aanwijzing voorschkende Oorzaken, gezegd is?

§ L X X V.

Heeft men, *ten tweeden*, tevens, uit aanmerking van het gestel van het Kind, gronds genoeg, om te vermoeden, dat het zelve eene meer dan gewoone vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte met zich voert, en welke te voren beschreven is; dan, voorwaar, heeft men te meer reden, om de nadering dier Ziekte te duchten. — Maar dit uittebreiden zou mij afleiden.

§ L X X V I.

Ten derden. — De waarheid van een dergelijke Voorzegging blijkt ook, uit den invloed van de gesteldheid der Zoogster op die des Zuigelings. — Hoewel wij hier van te voren mede gewaagden, zullen echter de *drie* volgende *Aanmerkingen* niet ongepast zijn.

Eerstelijk. — Indien de Ziektezaden dan zoo aanmerkelijk zijn aan de zijde van het Kind, en de gesteldheid van de Moeder, en Zoogster zulk Zog doet vreezen, het welk wij elders bewezen in betrekking tot zulk een Kind, de meestvermogende opwekkende Oorzaak te zijn, dan loopt alles zamen, om de Voorzegging der Engelsche Ziekte te billijken. — Edoch een voorzigtig Geneesheer

zal niet te voorbarig zijn in de Voorspelling van onaangename vooruitzichten, uit vreeze, dat de uitslag, het geen meer gebeurd is, hem bedriegen zoude, en de Praktijk daar door bezwaakt worden.

Ten Tweden. — Ik moet hier echter iets behalen, het welk thans zijn juiste plaats befaar.

Uit het zoo even gezegde zou men verkeerdelyk besluiten, dat eene aanmerkelijke zwakheid van het Kind, en het slappe Zog, waar mede het zelf gespijst word, twee altijd noodige, en doorgeaazekere, vereischten zijn der gronden van Voorzegginge der Engelsche Ziekte. — In tegendeel, indien het Kind anders gezond is, en het Zog geen Ziekelyke geaardheid heeft, dan kan daar van te aanzien van deze Voorspelling, niets worden afgeleid. — Zulk een Kind zal mogelijk slap, maar gezond blijven.

Zelfs is de slappe en onbewerkte toestand van het Zog, met betrekking tot het Kind, niet als noodig, om de Zaden der Engelsche Ziekte op te wekken. — Verre van daar: want zwaar, doet werkt, of oud Zog, vordert meer kragten, dan zwakke Zuigeling bezit. — Dit Zog wordt niet hoorlijk gekleinsd. — De Wei, hoe zoet en zach is zelfs voor de zwakke Vezelen van het Kind verteenbaar. — Dezelve wordt zuur en scheer maakt het Bloed kwaadsappig, en is dus gefekt

om de Zaden der Engelsche Ziekte optewekken. — De ondervinding staakt deze stelling. — Immers, zoo min het zeldzaam zij, dat stevige, gezonde Moeders, zwakke, teedere Kinderen voortbrengen, even min zeldzaam is het, dat zulke Kinderen al tijdig door de beginsels der Engelsche Ziekte gekweld worden. — Vooral bespeurden wij dit, wanneer eene dwaze verkiezing, of de noodzakelijkheid, eene Minne vorderde, en haar Zog, door ouderdom, te wreed en zwaar, of anderzins, voor den zwakken staat van het Kind, ongeschikt was.

Het tegengestelde is min gewoon. — Ik heb echter, meer dan eens, gezien, dat zeer gezonde en sterke Kinderen, onder het Zuigen eener zwakke en reedere Moeder, langzaam verslapten, en dat hunne Vochten en Kragten zoodanig bedorven en ondermijnd werden, dat zich eindelijk de Engelsche Ziekte vertoonde.

Zie daar de Voorspelling van dezelfde Gevolgen, uit strijdige Oorzaken.

Ten derden. — Indien een Zuigeling, bij welken geene reden was om deze Ziekte te voorzien, veel min die te voorzeggen, door eenigerhande Ziekte verzwakt, en daar na met eene Uitteering bedreigd wordt, vreës dan, dat zijne Klieren en Vaten onbestand zullen zijn, om de Wei van het beste Zog behoorlijk aftecheiden en te bereiden,

en voorſpel, dat de Engelfche Ziekte, even a
wel, als de Teering, zal kunnen volgen.

Welken nu die Ziekten, hare Toevallen en C
volgen zijn, die dezen grond van vreze verſcl
fen, ware, mogelijk, niet ondienſtig om t
onderzocht te worden, indien ik anders niet v
verveeling vreesde. — Ik berust deswegens d
in, tot wij de regels der Voorbehoeding' zullen c
geven.

§ L X X V I I.

Welke is de Voorzegging van de *beginne*
of reeds *eenigzins gevorderde Engelfche Ziekte*?
Dus treden wij tot het *tweede Deel* van ons teg
woordig beſtek. (§ LXXII n. 2.)

§ L X X V I I I.

In den *eerſten trap* der Ziekte, even als
haren voortgang, zal de gunſtige, of nadelig
Voorzegging uit de Toevallen, dan aanwezig, me
ten afgeleid worden. — De verlangens van teede
lievende Ouderen, de eer der Geneeskunde,
het vertrouwen, waar op een Arts aanspraak heeft
zijn zoo veele drangredenen, om, in dit opzig
allen mogelijken aandacht te beſteden.

Alv

Alvorens derhalven iets te bepalen, moet men zich dit foort van Vragen beantwoorden: — Was de *Vatbaarheid* van het Kind voor de Engelsche Ziekte gering, en algemeen? — Of liepen de omstandigheden, in merkelijken getale, zamen, om zijne *Vatbaarheid* te vergroten? — Verkeerde het *Lijdertje* in vele Oorzaken, welken *gelegenheid* gaven, om zijne *Vatbaarheid* te vermeerderen? — Hoe was het met de *opwekkende Oorzaak* in verband met het gestel van 't Kind? — Zijn de *Toevallen*, in het eerste tijdperk, langzaam, of spoedig, in aantal of hevigheid toegenomen?

Hoe gunstiger de Onderzoeker deze zaken kan beantwoorden, hoe voordeeliger zijne Voorspelling van het vervolg wezen kan: en zulks omgekeerd.

Maar, niet voldaan over deze algemeene beschouwing, overweegt men den Lijder meer van nabij. — En let op deszelfs *Ouderdom*. — Hoe jonger het Kind is, bij den eersten aanval der Engelsche Ziekte, hoe onaangenamer het vooruitzicht is van haren voortgang, inzonderheid wanneer de hevigheid, of meenigte der Toevallen dit vooruitzicht versterken.

Men heeft opgemerkt, en het is waar, dat, wanneer de Ziekte ten tijde van de Uitbotting der Tanden ontdekt wordt, en deze zich niet, of traag, of moeilijk vertoonen, dat dan zulk een Kind,
hoogst

hoogstwaarschijnlijk , eene hevige Engelsche Ziekte zal moeten doorstaan. — Men verneemt ook naar andere *Bijzonderheden* , of , namelijk , het Kind , in de gelegendheidgevende Oorzaken gestadig blijft verkeeren. — Men onderzoekt de gesteldheid van het Hoofd , van de Borst en den Buik , en besluit , wat daar van naderhand te hopen of te vreezen is. — Men onderzoekt ook , hoe het met de werking der Klieren en andere afscheidende Deelen gelegen is. — Of het Kind spoedig vermagerd , en de Knokjes aan de Geledingen zich uitzetten : — hoe de omloop des Bloeds , kenbaar aan de Pols , op verschillende tijden van den dag , zich bevindt. — Men onderzoekt van nabij den aart en de uitwendige gesteldheid der Ontlastingen , het zij dezelve natuurlijk zijn , of uit ontaarte Vochten of Stoffen bestaan. — Met één woord ; alles , wat den tragen en zachten , of spoedigen en hevigen voortgang der Ziekte aanduidt , wordt geschift en gescheiden , zoo dat , op alle deze , en soortgelijke Teekenen en Toevallen , de Voorspelling in dit eerste tijdsgewricht der Ziekte moet gegrond zijn.

Naar gelang der kunde en aandacht der Waarnemers op vorige bevindingen meer gevestigd is , zal men ook in de Voorzegging minder falen.

Zijn de redenen van een zeker besluit niet vast genoeg , dan zal de Arts , onder de bezorging van

van het noodige, den tijd verbeiden, en hij zal wachten, tot het klimmen der Ziekte hem meer zekerheids geeft.

Wie de lijst der Toevallen, en het geene van dezelveu gezegd is, herleest, zal geen breeder verflag van het tegenwoordige onderwerp begeeren.

§ L X X I X.

De Voorspelling zal in het Tweede Tijdperk, wanneer de Ziekte gevestigd is, ruim zoo gemakkelijk en zeker zijn, dan voor, of met haar eerste begin.

Ook dan worden de middelen der Voorzegging' ontleend van de Toevallen; maar, vermits dezelveu dan meer gevestigd zijn, zijn zij ook meer aan den Voorpeller, tot zijn oogmerk, dienstig.

Indien het Gebeente of deszelfs Geledingen, merklijk uitgezet, gebogen, of misvormd zijn, heeft men weinig reden, om eene volkomen herstelling van het zelve te hoopen. — Zijn de Knieën binnen- of buitenwaards geweken, vooral van een Kind, het welk een zwaar bovenlijf heeft, dan vreest men, met reden, dat die wanstaltigheid niet gemakkelijk zal kunnen verholpen worden. — Naar mate van de grooteren bogt der Kuit- en Scheenbeenderen, als mede van hunne Weekheid, en de lijvigheid van
het

het Kind, zullen die Deelen hoe langs zoo krommer worden.

Men houde deze Voorzegging echter niet voor onfeilbaar, want somtijds komen de Wanfaltens, zelfs zonder het geweld van werktuigen, door den tijd, te regt.

Wanneer een of meer Beenderen van de Borst zoodanig mismaakt zijn, dat de holligheid der Borst, daar door, merkelyk verëngd is, dan zal het deel, aldaar gelegen, bij den minsten versnelden omloop des Bloeds, geprangd worden, en eene moeilijke Ademhaling te vreezen zijn.

De verschillende buitenwaardsche, of zijdelingsche Uitzettingen der Wervelen, der Ribben, of van het Borstbeen, voorspellen eenen onherstelbaren Bogchel, ten zij dit, door geschikte werktuigen, tijdig voorkomen worde.

Zijn een of meer der Beenderen, welken het Bekken zamenstellen, plat gedrukt, binnenwaards gebogen, of uitgezet, zoo dat deszelfs holte daar door vernauwd is, dan heeft men reden om, bij de Vrouwen, eene moeilijke dragt, ten minste eene moeilijke Verlosfing, te voorzeggen.

Indien de Tanden, gedurende de Engelsche Ziekte, afgebroken, uitgevreeten, of meerendeels losgeraakt en uitgevallen zijn, dan vreest men, dat de Uitbotting, ten tijde der Verwisfeling, niet behoorlijk
zijn

zijn zal, en dat de zachte Lil, welke naderhand tot de hardheid der Tanden en Kiezen moest verwandelen, in dergelijken gevallen, zelden onbeschadigt blijft, en de Tandenkassen veeltijds misvormd worden.

Dit is het niet al, wat op goede gronden, kan voorspeld worden.

De belediging der zachte Deelen, de Ontaarting of Ontlasting der Vochten, de Verharding der Klieren van de Longe en elders, leveren eenen voorraad van Voorzegginggronden.

Hoe menig Kind erlangt door, en behoudt na deze Ziekte, na herhaalde Bloedhoesten, eene etter-achtige Longziekte, een etter- of waterige verzameling in de Borstholte, met derzelver Gevolgen? — Velen sakkelen onder een lastig en slepend verderf in het Cellenweeffel van verschillende Deelen des Ligchaams.

Wanneer de Buik zeer hard en dik blijft, ten tijde dat de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte bijna, of geheel, verdweenen is, wanneer tevens de onderste Leden slap hangen, meer en meer vermageren, de Lijder door Avondkoortjes al verder verzwakt wordt, dan is het Lijdertje in gevaar, om aan eene Uitteering te sterven. — Het vooruitzigt, om tot eene volkomen gezondheid te geraken, zal ten minsten, zeer gering zijn.

§ L. X X X.

Om de gronden van Voorspelling met nadruk te bevestigen, zal de volgende Waarneming niet ongepast zijn.

Een arm Meisje bekwam, tien maanden oud, de eerste Teekens der Engelsche Ziekte. — Het Hoofd behield de gewone grootte, — de Wervelen van de Rug zetten zich buiten. — de rechte Ribben binnenwaards. — De Buik werd, daar na, zeer hard en gezwollen. — De Knokken aan Handen en Voeten werden spoedig merklijk grooter, terwijl de Dijën en Beenen, trapswijze, zeer vermaerden. — Bijna anderhalf Jaren oud zijnde, kreeg dit Kind op de Borst en Rug, eenige ligtblauwe Vlekken, die dan eens verdweenen, dan zich wederom vertoonden. — De Ademhaling was meest benaauwd, tot het Kind, toen omtrend drie Jaren, eenige Bloedfluimen loosde. — Het gemak, 't geen de Ademhaling daar door scheen te bekomen, was niet bestendig; zij werd, integendeel, veel moeilijker. — De Buik bleef hard, gezwollen en nu en dan pijnlijk. — De Lijderes leed zulk een kwijnend leven, tot haar elfde Jaar, toen zij in eenen ellendigen staat was. — Zij droeg een Bogchel, — de Handen, Voeten en Buik waren Waterzuchtig gezwollen. — De Ademhaling was kort en hijgend;

en

en de Zieke ontlastte, vooral s'morgens, sluimen van etter, die eenen benaauwdten stank gaven. — De zwakheid was verbazend. — De Armen en Beenen geleken naar die van een geraamte. — Zij stierf.

Voor eene kleine gift, stond men mij de vrijheid toe, om het Lijk te openen.

Onder de Hersfenpan was niets ontfeld. — De vierde, vijfde en zesde Wervelen vormden eene puntige bogt, waar door het Ruggemerg vrij was geklemd werd. — De regter Borstholte was zeer eng. — In deze, en in de linker Longe, waren verscheiden verzamelingen van Slijm en Etter, eenige purperachtige Vlakken en Zamengroeiingen. — In de Linkerholte vond ik zes oncen geelachtig Water, het geen, met den Geest van Sal Ammoniak, een weinig bruischte. — Men zag ook eenige kleine Klierverhardingen in en op de Longe, welken met een lijmig Vocht gevuld waren. — In de regter Buikzijde was een harde Klomp, ter groote van een Kinderhoofd, welke, bij naauwkeurig onderzoek, in eene verzameling van verharde en opgezette Klieren des Darmscheils bleek te bestaan. — De Lever was zeer groot, hier en daar wankleurig en verhard. — De Galblaas was groot, maar ledig. — In de oppervlakte der Darmen bespeurde men insgelijks veele Klierverhardingen. — De Nierbekkens hadden eene Graveelige

Pis. — De Blaas was ontflooken, en veel grooter dan natuurlijk.

Binnen de Geleding van den linker Knie was een lijmig Vocht verzameld.

Het Scheenbeen, vertoonde nabij den Enkel een purperkleurig Beenvlies. — Het Beenvlies zelfs was sponsachtig uitgezet. — Het overige was naar behooren.

Oorzaken genoeg van den dood! — Ik had dezen uitslag voorzien en voorspeld. — Dit zou elk oplettend Arts hebben gedaan.

De loop der Ziekte, en het volstrekt onberispelijk gedrag der Ouderen, gedoogden geene andere verklaring dezer verschijnselen, dan uit de Kwaadsappigheid, door de Engelsche Ziekte voormaals bewerkt.

§ L X X X I.

Om dit Hoofdstuk de vereischte volkomenheid te verschaffen, zou men kunnen vergen, dat de Lezer onderricht wierd in de Voorzeggingen, welken gegrond zijn op de Uitwerksels, niet alleen van de Engelsche Ziekte, maar ook van alle anderen, welken zich met dezelve kunnen vereenigen.

De ondervinding leerde te dikwijls, dat eene Engelsche Ziekte, in het afgetrokkene, weinig
na-

nadeels zoude hebben toegebracht, maar dat zij gevaarlijke, zelfs doodelijke Gevolgen, door de medewerking van andere gebreken, naliet. —

Men overweege deeze twee *Aanmerkingen*:

Voor eerst. — Indien zich eene andere Ziekte onder de Engelsche Ziekte mengelt, en de omstandigheden eene Voorspelling met den mogelijken uitslag vorderen, dan moet de beschouwer van de, daar toe noodige, kundigheden uit andere geschriften voorzien zijn, en zijn aandacht moet klimmen tot die hoogte, welke de ontwikkeling der verschillende Oorzaken, ter ontdekkinge van te vrezen overblijffelen, volstrekt vereisfchen.

Hier komt een bedaarde Geest [van schifting en onderscheiding te pas. — Is de gemeene Man daar van verstoken, wij raden dan van de

Tweede Aanmerking gebruik te maken. — In deze gevallen, meest al van eenen tragen aart, moet hij, ter verkrijging van de begeerde Voorzegging, met eenen bedreven edelmoedigen Arts raadplegen. In dat geval zal de Huisvader de noodige voorschriften erlangen, waar na hij zijn volgend gedrag te regelen heeft.

De weg van eene dergelijke raadpleging staat overal open, en wordt, door de Vaderlijke zorg

der Provinciale Regeringen , meer en meer gebaant.

§ L X X X I I.

Thans vordert onze Verdeeling de opgave der Voorbehoedingsmiddelen , daarna van zulken , welken ter Genezing strekken kunnen.



AGTSTE HOOFDSTUK

Van de Voorbehoeding der Engelsche Ziekte.

§ L X X X I I I.

INDIEN wij, *eerstelijk*, bewijzen, dat de Engelsche Ziekte kan worden voorgekomen, dan zullen wij, *ten tweeden*, ons niet kunnen onttrekken van de voordragt der Middelen, daar toe dienstig.

§ L X X X I V.

Belangende *het eerste*. — Men vraagt: kan de Engelsche Ziekte worden voorgekomen? — Wij antwoorden, ja; om deze reden.

Indien de Oorzaken, of een gedeelte derzelver, immers zoo velen als vereischt worden, om de Ziekte te doen bestaan, kunnen afgeweerd, gestuit, of verzwakt worden, dan kan zulk eene Ziekte worden voorgekomen. — Maar dit heeft plaats bij alle Ziekten, welker opwekkende Oorzaak niet in

eene befmettelijke gesteldheid des Dampkrings gelegen is: — Ik zou zelfs niet gaarne op mij nemen te bewijzen, dat deze laarsten, mits onder behoorlijke bepalingen, niet kunnen voorgekomen worden. — Maar dit daar latende, zal ik de Oorzaken der Engelsche Ziekte doorloopen, om mijne stelling te staven.

Welke haare Naaste Oorzaak zij, (althans naar mijn begrip) kan den Lezer niet ontglipt zijn; — en hij zal reeds hebben opgemerkt, dat, in de Voorbehoeding derzelve, geen schijn van onbestaanbaarheid te vinden is, en, uit eene vergelijking van het geene hij, nopens den invloed der Oorzaken, uit deze Verhandeling heeft kunnen leeren, zal hij reeds besloten hebben, dat, met het sluiten der Oorzaak, ook de Ziekte zelve voorgekomen wordt.

Voor de minöplettenden zal dit onderwerp echter eenige Verklaring noodig hebben.

De *opwekkende Oorzaak*, de Wei van het Zog of de Melk, aan het Kind, terstond, of niet lang na de geboorte onttrokken zijnde, zal dezelve de *voorschikkende Oorzaak*, hoe aanmerkelijk die anders zij, niet opwekken, gevolglijk geen bestaan aan de *Naaste Oorzaak*, dat is, aan de Ziekte verschaffen.

Maar hier spreekt het teeder hart van eene Kinderlievende Moeder; „Zou ik volle beken van ge-
„ zond

„zond Voedzel aan mijn lieveling weigeren? Neen!
„de Natuur zou mij, op het gezigt van Zuigen-
„de Dieren, doen bloezen!” — Wat dan? —
Verlaat ons hier de voorkomende Ziektekunde? —
Neen! — in dat geval moet het gestel van het
Kind in dier voegen verbeterd worden, dat de
opwekkende Oorzaak kragteloos worde. — Of
haar schadelijk vermogen moet, op de geschikte
wijze, worden verbeterd.

Hij, die, het geen, ten aanzien der Ziektezaden, in het algemeen, en bijzonder van die der Engelsche Ziekte, betoogd is, met eenige opletendheid herleest, zal met mijn gevoelens ijlings instemmen. : — Of kan de gesteldheid van het Zog niet worden verbeterd? — kan eene min geschikte voor geene meer geschikte Zoogster verwisseld worden? — kan de Zwakheid des Ligchaams en de Kwaadsappigheid van het Kind door geene geschikte Middelen worden voorgekomen, of veranderd? — Het tegendeel zal naderhand blijken.

In zoo verre, wijders, het gestel van het Kind roone, of uit de geaartheid der Ouderen vooraf blijke, dat de bijzondere zaden der Engelsche Ziekte, of aanwezig of te vreezen zijn, zien wij, voor ons, geene reden van strijdigheid, om de gesteldheid der Ouderen, of van de Voedster, alzo te verbeteren, dat, daar door, de vermenig-

vuldiging, of het vermogen der Ziektenzaden bij het Kind voorgekomen worde.

Wijders mag de herstelling, of behoorlijke behandeling van zoodanige Ziekten, welken eigenaartig dienen om eene meerdere Vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte natelaten, onder de zeer mogelijke middelen ter Voorbehoedinge gesteld worden.

De ondervinding bevestigt, immers zoo veel zij dit doen kan, deze mogelijkheid, het geen in dit Werkje klaar genoeg is gebleken, en naderhand hog duidelijker blijken zal.

Op deze vlugtige herschouwing van den Aart der Oorzaken onzer Ziekte, en op de verdere Aanmerkingen, mag dit besluit steunen: — *De Engelsche Ziekte kan worden voorgekomen.* — Ik zie geene reden, om hier op verder te dringen, te minder, dewijl de aart der Voorbehoedingmiddelen zelven, een kragtig bewijs voor die stelling zal opleveren.

§ L X X X V.

Wij komen dus tot het *tweede gedeelte* van dit Hoofdstuk, (§ LXXXIII.) moeiende bestaan in *een verslag der Middelen, om de Engelsche Ziekte te voorkomen.*

Wij moeten de Middelen, of wijze van Voorbe-

behoeding uit twee zeer verschillende Oogpunten beschouwen, namelijk :

Voor eerst. — Wij zullen die, welken *onder de Zwangerheid* noodzakelijk zijn, laten voorafgaan ;

Ten tweeden. — Daarna zullen die, welken *na de geboorte* van het Kind, te stade komen, moeten volgen.

§ L X X X V I.

Ik zeg, *onder de Zwangerheid.* — Wij beslo-
ten voormaals, uit de Reden en Ervaring, dat uit
eene wekelijke zwakke gesteldheid der Ouderen,
doorgaans een diergelijk kroost te wagten is.

Wij beweerden, op grond van het onderling
verband tusfchen de Zwangere en hare Vrucht, dat
het Ligchaamsgestel der laatste veeltijds strookt
met dat der eerste. — De gronden van een tegen-
gesteld gevoelen, zelfs ten aanzien van den invloed
der zintuiglijke vermogens, waar mede sommigen
thans te veel ophebben, kunnen ons niet behagen.
— Dan wij zijn nu tot een onderzoek daar van
niet verplicht.

Indien nu de Zwangere eene gesteldheid heeft,
welke, met regt, doet vreezen, dat hare vrucht,
of ten aanzien der kragten, of ten aanzien van de

geaartheid, eene meer dan gewone vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte zal medebrengen, dan, meenen wij, dat de voorkoming van dit gevolg moet bestaan in de verbetering van de gesteldheid des zwangeren Ligchaams, namenlijk in zoo verre die gesteldheid dat gevolg anders zoude kunnen te weeg brengen.

Welken zijn de Middelen daar toe? — Deze vraag is kort, maar uitvoerig. — Zij behoort ook niet zoo lijnrecht tot mijnen taak, om dezelve opzettelijk te beantwoorden.

Eenige *Regelen*, ter Voorbehoeding, in dit geval, zullen mij, hoop ik, van de verdenking van nalatigheid ontheffen.

Eerste Regel. — Een Man, wiens Zaad, door eene losse leefwijze uitgemergeld is, moet, alvorens hij der reijne min³ hulde doet, ter zijner herstellinge, den raad van eenen bekwamen Arts innemen en volgen. — Mag ik hem iets raden? — Hij ontwijkte alles, wat hem verder kan bederven, en doe het tegenovergestelde. — Rust, voedende dierlijke spijsen, eene koele Dampkring, versterkende koude Baden en Wrijvingen, de ontwijking van alles, waar door zijne dierlijke driften worden opgewekt, zija voor hem, in dezen toestand, meest geschikt.

Ik gaf dezen raad aan een Vader, wiens twee
eerste

eerste Kinderen met een Zwak en Kwaadfappig gestel ter waereld kwamen, en daar na onder de Engelsche Ziekte gevaarlijk kwijnden. — Hij volgde mijnen raad, met dien uitslag, dat de vier volgende Kinderen gezond en sterk ten voorschijn kwamen, en zonder schijn van Engelsche Ziekte voortleefden.

Is 'sMans Bloed met het vuile Venus-gif bezoedeld, dan zal de Arts hem, daar en boven, de noodige Middelen ter verbeteringe aan de hand geven.

Naar mate hij meer tijds heeft, moet hij, eer hij ook zijne Echtgenooten en kroost bederft, de raadgevingen des te vlijtiger en bestendiger opvolgen. — Men is hier in, ik weet het al te wel, veel te nalatig.

Tweede Regel. — De Zwakke, Ziekelijke of Kwaadfappige Vrouw moet den zelfden raad volgen. — zij moet, in het bijzonder:

- I. in hare leefwijze, voor en onder den Echt, vooral staande de Dragt, alles in dier voegen besturen, wat minst strekken kan, om zich zelven en de vrucht te verflappen, of kwaadfappig te maken. — Hier toe behooren, voornamelijk, de laauwe vochtige Dampkring, waterige laauwe Dranken, Melkspijzen, Bladgroentens, zoete Kost en Wijnen,
al

al wat moeilijk verteerbaar is, alsmede de warme Voedstoven, en dergelijken.

- II. Hier door zal de gemeene plaag van zwakke Vrouwjes, de uitmergelende witte Vloed, gestuit, of deszelfs scherpte verbeterd worden. — Men bezige anders, ten dien einde, al wat gepast is. — Dit is te noodzakelijker, om dat de ondervinding leert, dat vele Kinderen, welken naderhand door de Engelsche Ziekte aangetast worden, van Moeders afstamden, welken door den witten Vloed verzwakt waren.

Men vergelijke de bevinding hier omtrent, aan de Stranden en modderige streeken, met de hoogere gedeeltens onzer Provinciën: — Men zal, onder de bewooners der eersten, de Engelsche Ziekte (al het overige gelijk gesteld) veel gemeener vinden, dan onder die der laarsten. — Men zal geene andere Oorzaak, dan de Gevolgen van den witten Vloed, ontdekken, en, gelijk mij meer dan eens gebeurd is, met dezelve te stuiten, de meerdere vatbaarheid des Jonggeborenen voor die Ziekte, voorkomen.

Derde Regel. — Blijkt, uit den aart der witte Vloeistoffe, en uit andere Teekenen, dat de Vochten door de Venusmet, vergiftigd zijn, dan
voor-

vooral moet het vermogen der Kunst beproefd worden. — Vindt iemand dit onnoodig ter voorkominge van de bijzondere Vatbaarheid der Engelsche Ziekte, die zal evenwel erkennen, dat hetzelfde dienen kan, om de meerdere kwaadaartigheid der Toevallen van dezelve te temperen.

Vierde Regel. — Somtijds bespeurt men de Engelsche Ziekte bij Kinderen van dezelfde Ouderen, zonder dat men eene blijkbare reden daar van kan ontdekken. — BUCHAN heeft dit bij elf Kinderen gezien. — Ik zag het, in één huis, bij agt; in een ander, bij vijf van dezelfde Ouderen.

In deze vertwijffeling is niets te doen, dan met eenen kundigen Arts te raadplegen. — De grondoorzaak ligt noodzakelijk in de geëärtheid van Vader of Moeder, vooral der laatste. — Deze zal de Geneesheer navorschen, en, indien hij kan, opruimen. — In 't gemeen zullen versterkende Leefwijze en Geneesmiddelen de hoofdzaak zijn. — De bekrompen omtrek eener Prijsverhandeling duldt hier omtrent geene uitvoerigheid, vooral daar het bestek ons roept tot onderzoekingen van meer gewigt.

§ L X X X V I I.

Wij moeten de Middelen aanwijzen, welken *na de geboorte van het Kind* ter voorkominge der Engelsche Ziekte, geschikt zijn. (§ LXXXV. n. 2.)

Men zou hier met weinige woorden, veel kunnen zeggen, en alles afdoen met dit voorschrift. *De onthouding van Zog en verdere Melkspijzen*, voorkomt de Engelsche Ziekte.

Doch wie zal op zulk een raad dringen? — Dit ware even zoo veel, als eene Oorlogsverklaring aan de meeste Moeders, — even zoo veel als of wij gaarne van eene spoorlooze ongerijmdheid wilden beschuldigd worden.

Men begeert eene wijze van Voorbehoeding, welke met de Zooging, indien dezelve om geene andere reden moet gestaakt worden, bestaanbaar is.

Alles, wat der Kinderen bijzondere vatbaarheid voor deze Ziekte verbeterd: — het nalaten van alles, wat dezelve bevorderlijk is, levert, *in het gemeen*, de bedoelde Middelen op.

§ L X X X V I I I.

In het bijzonder zullen deze Behoedmiddelen moeten ontleend worden,

Voor

Voor eerst : van de *Lucht*, waar in het Kind verkeert ;

Ten tweeden : van het *Voedsel* ;

Ten derden : van de *Beweging* en *Rust* ;

Ten vierden : van de onderhouding eener geregelde *Doorwaasfeming* ;

Ten vijfden : van de *Behandeling* der Ziekten, welken de bijzondere vatbaarheid vermeerderen ; en, eindelijk ,

Ten zesden : van het *Bestuur* des Kinds, ten tijde, wanneer die Voorgeschiedheid zoo aanmerkelijk is toegenomen, dat men twijfelt of de Engelsche Ziekte niet reeds, in haar begin, besta.

Tref ik het doel, dan zal de nadere overweging dezer onderwerpen, hoewel eeniglijk ter voorkominge van de Engelsche Ziekte ingericht, eene meet uitgebreide nuttigheid hebben.

§ L X X X I X.

De *Lucht*, matig koud, droog en zuiver, zal, voor meest alle onze Kinderen, de geschikste zijn.— Zij versterkt en verfrist, en is daarom ook dienstig, om de meerdere vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte te helpen voorkomen.

Elk doe, naar zijne omstandigheden, en die des tijds, wat hij vermag, om eene soortgelijke Lucht
aan

aan zijne Kinderen, in hunne eerste levensjaren, te verzorgen. — Een gegoed, ten minsten belezen, mensch behoeft hier omtrent geene onderrichting. — Een min gegoedde ontwijkt de vochtigste, en des Zomers ook de heetste gedeeltens van zijn huis. — Des Kinds verblijf moet dikwijls gelucht, gezuiverd en gedroogd worden. — Onder eene, niet beplante, Schoorsteen moet niet meer Vuur zijn, dan noodig is tot onderhoud der natuurlijke warmte van het Kind. — Voor ieder een, en dus ook voor den armsten ingezeten staat de Lucht vrij. — Hij moet zijn Kind aan dezelve zoo veel meer gewennen, als het zelve daarna in dezelve meer zal moeten verkeeren. — De gemeene Hutten en Keldertjes, in onze meest bevolkte Steden, brengen alles mede, om hare bewoners te bederven. — Waarom verneemt men, onder het Kroost van die Menschen, de Engelsche Ziekte niet nog menigvuldiger dan tegenwoordig? — Voornamelijk, om dat de nood hen veeltijds dwingt van de open Lucht gebruik te maken, terwijl de burgerbaker, of vrouw, den Jonggeboorenen niet zelden voor een Vuurtje, in een laauw en vochtig vertrek koestert en verzwakt.

Bij mistige en regenachtige Dagen zal een klein Vuurtje volstaan om het Vertrekje te droogen.

Van het nut dezer eenvoudige raadgeving ben ik eenmaal, door de ervaring, volkomen overreed geworden.

worden. — De Ouders van twee Kinderen bewoonden een laag gelegen, vochtig benedenhuis. — Ik schreef meerendeels daar aan den oorsprong van de Engelsche Ziekte toe, met welke die twee Kinderen behebt waren. — Men verplaatste zich, op mijn raad, in een droog bovenhuis. — De Lijdertjes niet alleen, maar ook geen der vier volgende Kinderen, werd, schoon de verdere opvoeding dezelfde bleef, door eene der geringste Toevallen van de Engelsche Ziekte aangetast. — Is hier geene reden, om te gissen, dat de betere Luchtsgesteldheid van het huis aan dit heilzaam gevolg veel deel had?

Men kan zich ook, ter verbeteringe eener bedorven Lucht, van Aziëndampen, versche Bloemen en Planten, of iets dergelijks bedienen.

§ X C.

Ten tweeden. — Het Voedsel. — Hier omtrent kan men niet oplettend genoeg zijn.

Gedurende de Zooging. — De hoedanigheid en hoeveelheid van het Zog moet altijd betrekkelijk zijn tot den toestand des Zuigelings. — Ik herhaal, dat zwaar, lijvig Zog van de gezondste Zoogster, voor een zwak Kind, zoo schadelijk kan zijn, als slap, dun Zog, voor een sterk Kind.

Over het geheel is echter niets nadeeliger, dan

K

de

de magere schrale Borst eener uitgemergelde Minne. — Dit beweerde BUCHAN, op gronden van ervaring. — Agt Kinderen, door hunne Moeder gezoogd, bleven gezond. — De nood eischte, voor het negende, eene Minne. — Dit Kind kreeg de Engelsche Ziekte. — De Waarnemer schreef dit toe aan het schrale Zog. — Zijn gezag gedooft geene twijfeling aan de juistheid zijner Waarneming.

De Moeder, of Minne, richte deswegens hare leefwijze naar het gestel van 't Kind. — In het eerste geval zullen verflappende, verdunnende Spijzen en Dranken; het tegendeel in het tweede geval, noodzakelijk zijn. — Dit evenwigt onderhoud de kragten, verschaft eenen geregelden Wasdom en Voeding.

Weinig Zog tevens te geven, en dit dikwijls te herhalen, schikt beter, dan dat het Kind, nu en dan, tot de keel toe overladen worde.

De tijd van Speening moet insgelijks bepaald worden na de kragten van het Kind, en den aart van het Zog. — In 't algemeen kan men hier te Lande met tien of twaalf Maanden volstaan. — Langer uitsfel verzwakt Moeder en Kind. — Het laatste wordt slap, slijmig en zwak van Veezelen, dat is, het krijgt ongevoelig eene meerdere vatbaarheid voor de Ziekte, welke een beter bestuur had kunnen voorkomen. — De wijze van Speening, wel-

welke langzaam, en deels met behulp van de Pap-pot geschiedt, keuren wij de beste.

Het *Zag*, door eene, meer of min, kwaad-aartige gesteldheid van het Bloed, *bedorven*, moet liefst onthouden, of, op de geschikteste wijs, overeenkomstig de natuut van het bederf, verbeterd worden. — Eene Tegenscheurbuikige of Tegen-veneriesche Leef- en Geneeswijze, door een bedre-ven Arts te bepalen, zal de hoofdzaak zijn. — Doch hier omtrent heb ik reeds genoeg gezegd. — Men dulde echter de volgende Waarneming.

Eene brave Burgerdochter, werd gehuwd aan een losbandig Knaapje. — Het eerste Kind was ziekelijk, zwak, en vol Hairworm, en had hier en daar Beenëters. — Het tweede was, voor zijn zestiende Maand, gekweld met de Engelsche Ziekte. — Het werd geknaagd door kwaadaar-tige Zweeren. — De Regterhand en Voet wa-ren hard en knobbelig, rood en pijnlijk, als van beginnende Winddoorns. — Niets was in staat, om den dood dier twee ellendelingen te voorko-men. — Het doet hier niets ter zake, dat de Vader, zijns kwaads bewust, moorddadige handen aan zijn schuldig leven sloeg. — Na dat de Moe-der, van eenee kwaadaartigen witten Vloed en verdere Toevallen van het Venusgif genezen was.

bragt zij, na een tweede Huwelijk, zes Kinderen ter waereld, die allen gezond bleven.

Was dit geval eenig in zijn soort!

Een dergelijk bederf van het Zog is niet, zelfs door den oplettendsten Arts, altijd even gemakkelijk te ontdekken. — Elk verheelt liefsr zijn schuld, of schuift die van zich af. — De Minne, vooral eene zoogenaamde bedrogen Dochter, bezit veeltijds kunstgreepen, zoo listig, dat zij naauwelijks te achterhalen zijn. — Ik was daar van, meer dan eens, het slagtoffer.

Wij raden de Ouders, die hier omtrent in twijfeling geraken, dergelijke Minne voor eene betere te verwisfelen, of hunne Kinderen met de lepel te voeden. — Laat uwe zorg, ten besten uwes geslachts, de logen vergaauwen, eer het verzuim te laat beklagd worde. — Deze raadgeving mag men veilig verder strekken, dan tot de Burgerhuizen; of erwaarde gij nimmer, oplettend Geneesheer! hardnekkige Ziekten, Huidgebreken, enz. bij Kinderen van goeden Huize, die alleen van eene vuile Minne afkomstig, alleen door Kwik hersteld werden? — Het denkbeeld van velen der beste Schrijveren over de Engelsche Ziekte, welker Naaste Oorzaak, door hen, in eene Venusfmet gesfeld wordt, staaf meer of min mijne waarfchouwing. —

wing. — Doch men weet mijn denkbeeld ten aanzien dier stelling!

Eenige jaren geleden, zag ik dagelijksch een Kind, het welk, der Engelsche Ziekte onderhevig, eene schijnbaar gezonde Minne zoog. — Hare Kaken droegen de kleur van roode roozen. — Zij was het toonbeeld der bevalligheid. — Doch ik bespeurde eene zekere heeschheid in hare spraak, en vond de Lel met kleine Puistjes, en aan het Bovenghemelte eene vlakke zweer. — Men ruilde de Minne, en het Kind genas, onder het gebruik van Kwik en *Kina*.

Men houde deze, mogelijk kwalijk geplaatste Waarneming, ditmaal, ten goede:

Het Voedsel *na de Speening*, of *wanneer het Kind, zonder Zog, met de lepel, onderhouden wordt*, vordert, ten einde de Engelsche Ziekte te voorkomen, onzen aandacht.

Men lette dan op de soortgelijke eigenschap van het zelve.

Alles, wat bezwaart, de Melk daar onder begrepen, is, uit hoofde van de Zwakheid der eerste Wegen, onverteerbaar, en verwekt Raauwheid, Koorts en Zwakheid. — Men geve des het tegendeel; alles echter naar geraden van de sterkte van het Kind.

Hier staat aarrig, ik beken het, dat een Kind,

in de Kakstoel, Melkbrei, Vleesch en Spek eet, dat het daarin zijne Ouders beschaamt en niets weigert; — maar die aartigheid verliest haar fraai, wanneer het Kind, even daar door, gelijk ik dikwijls heb waargenomen, de beginsels der Engelsche Ziekte erlangt. — Al het overdrevene en tegennatuurlijke moet achtergelaten, en de voetstappen der Natuur moeten gevolgd worden.

Onthoud daarom uwen Kinderen de zoete Popjes, de Macarons, Bonbons, met één woord, alle Suikerkost en Meelgebak. — Niet te kragtige Soupen, met oud gebakken Brood, Bierpappen, Waterpappen en dergelijken, zullen meer nuts doen. — Ook zal koud zuiver rauw Water de geschikste Drank zijn. — Toen God den Mensch schiep en voor zijn Kroost zorgde, gaf hij hen Groentens voor Spijze, en Water tot Drank.

§ X C I.

Wij moeten, *ten derden*, aan de *Beweging* en *Rust* gedenken. — Te veel van beiden is even schadelijk, en verwekt Koorts, Zwakheid, Verdikking en bederf der Vochten.

Men zondigt doorgaans meest met het Kind vadsig te maken, even of het Kind geboren ware om eeuwig te rusten. — Velen zelfs, on-

danks

danks de getrouwe raadgevingen , stommelen het Kind in prangende dekzels en kleeding , even als of men hetzelfde , met opzet , de zaden der Engelsche Ziekte wilde berokkenen. — Men doe het tegendeel , en versterke daar door de wekelijkste Kinderen.

§ X C I I.

Ten vierden. — Eene geregelde *Uitwaasfeming* behoort onder de Behoedmiddelen der Engelsche Ziekte.

Indien zij te sterk is , wordt het Kind verzwakt : — Is zij te gering , dan blijft eene stofte terug , welke naderhand hinderlijk kan zijn. — Wij verwerpen daarom , ten minstert voor onzen landzaat , ten aanzien van hitte en koude , alle uiterstens , althans in zoo verre men nu eeniglijk op de voorkoming der Vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte het oog hebbe. — Doch , wen men eigenlijk , voor de versterking van het Kind , alleen moet zorgen , dan kunnen de koude Baden van de grootste nuttigheid zijn. — Maar dit behoort tot het volgende Hoofdstuk.

§ X C I I I.

Het volgende Middel van Voorbehoedinge (§ LXXXVIII. n. 5.) bestaat in de *Behandeling der Ziekten*, welken, verzuimd zijnde, eene meerdere Vatbaarheid voor de Engelsche Ziekte kunnen achterlaten.

Dan, Lezer, wanneer dit onderwerp, in het afgetrokkene, overwogen wordt, kan deszelfs belangrijkheid niemand ontglippen; — zelfs erken ik, dat hij, die de Engelsche Ziekte zoo uitvoerig moet beschrijven, als de uitgestrektheid der Vrage hem verplicht, wel degelijk mag, en moet ondersteld worden, die Ziekte, en derzelver beste wijze van Voorkoming en Genezing, te kennen. — Maar, voelt gij niet, dat dit geheel iets anders is, dan den gemeenen Man eene eenvoudige handleiding te verschaffen, in de manier om de Engelsche Ziekte te kennen, en te voorkomen. — Beschouwt men de zaak van dien kant, dan zal niemand mij vergen, dat ik de kennis der genezing der *Gevolgen* van *Ziek Zog* breder uitbreide; — dat ik de manier, om het *Zuur* uit de ingewanden te drijven, of hetzelfde te verbeteren aanwijze, — dat ik de behandeling der *Kinderziekte*, *Mazelen*, *Roodvonk*, of andere *Huidgebreken* beschrijve, — dat ik de wijze, om de *Uitbotting der Tanden*

gemakkelijker te maken, voordrage, — dat ik het Geneeskundig bestuur der Lijderijes, onder de Koortfen van verschillenden aart, aanduide. — Neen! dit kan even min van ons verwacht worden, als de opzettelijke aanwijzing der geneezinge van de Sprouw, — Van de verschillende Hoesten, den Kinderen zoo gemeen, — van de Uitteering, het zij die oorspronkelijk zij, of een gevolg van andere Ziekten: — even min als dat ik wijders verflag zoude doen van alle overige mogelijke Ziekten der Kinderen, en hare geneeswijze.

Wie echter, hier omtrent eenige inlichting begeert, kan zich vervoegen bij eenen HARRIS, ROSEN, BICKER en TISSOT, OPTERDINGER, BUCHAN, bij de Prijsverhandeling van den Rotterdamschen Arts VEIRAC, in het zesde deel der Handelingen van dit zelfde Genootschap, of, en dit zagen wij het liefst, hij vrage den raad van een' ervaren Geneesheer.

Men beoeffene zich om te te weten, het geene ter behandelinge dier Ziekten noodzakelijk is. —

Het zal, in 't gemeen, bij de behandeling der opgemelde Ziekten, volstaan, op de afwendung, of herstelling, van de Zwakheid en Kwaadfappigheid, gewone Gevolgen dier gebreken, acht te geven, ten einde, even daar door, de bijzonde

Varbaarheid voor de Engelsche Ziekte te voorkomen.

Vooral moet de aandacht gevestigd zijn op de juiste behandeling van zoodanige Ziekten, welken de Kenmerken dragen eener Zuure Scherpste in de eerste Wegen en in het Bloed, gelijk de Brakingen, Afgangen, Buikpijnen, Sprouw, vele Huidgebreken, enz.

Ik vind mij inzonderheid verpligt, om de oplettendheid der zulken optewekken, welker vorige Kind, of Kinderen, door de Engelsche Ziekte aangetast zijn. — Voorzigtigheid en tijdige zorg kunnen, in dit opzicht, bij hun verder Kroost, gevolgen voorkomen, welker verzuim in eene steedsduurende ellende zou kunnen uitloopen.

§ X C I V.

Indien de omstandigheden van dien aart zijn, dat men aan het bestaan der allereerste beginsels van de Engelsche Ziekte twijfelt, dan komt de zesde en laatste voorzorg (§ LXXXVIII. n. 6.) te pas. — Maar dit stuk grenst alteenabij de streek, werwaards onze gang moet gericht worden om 'er nu iets van te gewaagen.

§ X C V.

§ X C V.

Wij moeten intusfchen herinneren , dat niet alle onze Voorbehoedingmiddelen , in alle gevallen , noodzakelijk zijn : — dat men veiligst handelt met zulken , die gepaard kunnen gaan , tevens te bezigen.

Indien het aan de lust niet hapert , zal het tijdelijk onvermogen geene reden van verzuim verschaffen. — De Voorzorgen ten aanzien van den Dampkring , kosten niets ; — de Leefwijze der Zoogsters kan even gemakkelijk naar de geaartheid van den Zuigeling geschikt worden ; — dit zelfde kan ook , opzigtelijk de Beweging en Rust , zoo wel , als van de regelmatigheid der Doorwaasfeming , gezegd worden. — De kennis en geneeswijs der Ziekten , welken de meerdere Zaden van de Engelsche Ziekten nalaten , zijn ook niet verre te zoeken. — En , men heeft , meer dan ooit , aanspraak op de verpligting der Leeraren van het afgelegen platte Land , om het gebrek van ijver en kunde hunner Dorpelingen , ten besten der Kinderen , te vergoeden.

NEGENSE HOOFDSTUK

Van de Geneezing der Engelsche Ziekte.

§ X C V I.

MEN vraagt naar de *Beste* Middelen, om de Engelsche Ziekte te genezen. — Met rede, want alles oprehalen, het geen, onder den naam van eene beredeneerde Geneeswijze, is opgegeven, of het welke als Geheimen uitgevent wordt, zou den Lezer en mij verveelen. — Wij houden (om dit, in het voorbijgaan, eens vooral, aantemerkten) alle de Geheimen, in deze en andere Ziekten, voor kunstgrepen, of om, in weêrwil van de eere der Praktijk, menschen te bedriegen, zijn beurs te vullen, of om, langs dien ongeoorloofden weg, de Praktijk zijne Medebroederen naar zich te trekken.

De *Beste* Middelen zijn die, welken, op de eenvoudigste wijze, zamengesteld, de aangenaamste zijn, en op de spoedigste manier werken: zulken

ken, die, niet op gisfingen, maar op Reden en Ondervinding steunen.

§ X C V I I.

Om het verband met de, tot hier toe, gelegde gronden te behouden, oordeel ik deze de geschikste orde, namelijk:

Voor eerst; dat wij de beste Middelen, om de *aanvanglijke* Engelsche Ziekte te genezen, aanwijzen;

Ten tweeden; dat vervolgens die geenen, welken in de *meergevorderde* Ziekte dienstig zijn, beschreven en aangedrongen worden;

Ten derden; dat voorts zulke Middelen, die eigenlijk dienen tot *herstel van Toevallen*, welken eenen bijzonderen aandacht vereischen, ter voorkominge van gevreesde Gevolgen, opgegeven worden;

Ten vierden; dat, eindelijk, op de best mogelijke wijs, voor *het herstel der Gevolgen*, of Overblijffels der Engelsche Ziekte, gezorgd worde.

§ X C V I I I.

Met opzicht tot *het eerste*. — Uit den waren aart der Ziekte, vergeleken met derzelver Toevallen,
in

in haar eerste begin, is gebleken, dat in verre de meeste gevallen eener aanvangelijke Engelsche Ziekte, de Vochten weinige teekenen eener Zuure Scherpte vertoonen, hoewel wij wederom niet ontkennen, dat, in andere gevallen, vrij spoedig, de blijkbaarste Toevallen, zelfs van het tweede tijdvak vernomen worden.

Wij zullen ons echter bepalen tot de gewone verschijnsels, schoon men het gaarne daar voor wilde gehouden hebben, als of, in het laatste geval, de Middelen der gevorderde Ziekte ook hier waren ingelascht.

Zoo dra de Ziekte blijkbaar is, vordert de Geneeskunde twee oogmerken:

Voor eerst. — De eerste Wegen moeten van het Stremfel ontheft worden.

Ten tweeden; de Leef- en Geneeswijzen moeten alzoo ingericht worden, dat zij den voortgang der Ziekte stuiten.

§ X C I X.

Ter volbrenging der *eerste Aanwijzing* let men op de poogingen der Natuur, welke veeltijds, in dit geval, het Lijdertje door Brakingen of Stoelgangen, tracht te redden. — Deze wijze Leidsvrouw moet gevolgd of aangemoedigd worden. — Dit geschiedt:

- I. door *Braakmiddelen* ;
- II. door *zulken, die de Afgangen bevorderen* ;
- III. door de *Verwisseling van beiden*.

§ C.

Omtrent de *Braakmiddelen* beschouwt men
Voor eerst, de Noodzakelijkheid en Veiligheid
derzelven ;

Ten tweeden, hun Soort.

Het eerste geschiedt ter geruststellinge ; het tweede ter onderrichtinge van den gemeenen Man.

§ C I.

De Natuur bewijst , gelijk zoo even gezegd is ,
het Nut der ontlastingen , in dit geval . — Nopens
hare *Veiligheid* is geen twijfel altoos . — Deze
bovenwaardsche ontheffing van hindernissen , die ,
door vertoef , zouden belemmeren , geschiedt , bij
Kinderen , schier even gemakkelijk als het Zuigen .
— Zij hebben daar van geen gevolgen , althans
niet in de gewone omstandigheden . — De poo-
gingen der Natuur , ook hier in , te volgen , was
de raad van den Vorst der Geneeskunde HIPPO-
CRATES ; een raad , zoo gegrond , als of Hij
onze Ziekte gekend had .

Braak-

Braakmiddelen schudden de Maag en Darmen; — verdeelen het Stremfel op eene gemakkelijke wijs, en ontheffen aldus het Kind van een schadelijk Ligchaam; Ja, dit middel is *Noodzakelijk*, zeg ik, en *Veilig* — zou het niet? — het behoort de Natuur in hare werking. — En ik kan mij geen geval herinneren, waar in een Braakmiddel, naar eisch gebezigd, aan een Kind eenig nadeel deed. — Het ontijdig, of te lang aangewend gebruik van het beste Middel kan benadeelen; dan dit is geen bewijs tegen deszelfs deugdelijkheid en veiligheid.

§ C I I.

Het *tweede gedeelte* van ons tegenwoordig onderwerp moet handelen over de *soortelijke hoedanigheid dezer Braakmiddelen*, waarna wij de *wijze van gebruik* zullen opgeven.

In het algemeen behoort alles tot de Klasse der Braakmiddelen, het welk de Maag zoodanig prikkelt, dat het geen in dat ingewand, en (volgens de jongste Proeven) in den twaalfvingeringen Darm bevat is, geheel of gedeeltelijk bovenwaards ontlast wordt.

Dit kan geschieden door zoogenaamde *Huismiddelen*, en door *Artzenijen*. — Het een en ander

der zal ik, zoo beknopt als mij doenlijk is, ont-
wouwen.

§ C I I I.

Tot deze *Huisniddelen* behooren, laauw Water, zonder of met Zout, of Suiker; — laauw Water, met een weinig Boter, Brandewijn, of iets dergelijks; — de prikkeling in de Keel, door middel van een Veértje, of ander genoeg bekende Hulpmiddelen.

§ C I V.

In andere gevallen, wanneer de Natuur geene genoegzame poogingen doet, of geheel en al moet worden opgewekt, nemen wij de toevlucht tot de *Artzenijwinkel*.

Aldaar vinden wij, onder de beste Middelen, den *Braakwortel*, de *Zeeäjuin*, de *Kamilsbloemen*, den *Braakwijnsteen*; en onder zekere bepalingen, de *Kermes Minerale* en den *Gulden Zwavel van Spiesglas*, ten derdenmale nedergeplost. (*Sulph. aurat. Antim. tert. præcip.*).

§ C V.

Welke zijn in het tegenwoordige geval, *de verkieslijkste* van deze Middelen? — hoe moet men zich van dezelve bedienen?

Hier is eene behoorlijke onderscheiding, uit de ondervinding afgeleid, volstrekt noodzakelijk; want

Voor eerst. — Indien de Natuur, bij den hongrigen Zuigeling, de braking verwekt, en het gekoppelde tevens stukswijze ontlast wordt, dan zal het gebruik van laauw Water met Zuiker volstaan.

Dan in dezen toestand weigert het Kind veeltijds eene genoegzame hoeveelheid, bij herhaling, te drinken. — Veeltijds ook, is de Natuur te zwak en heeft hulp nodig. — Dan zullen twee eijerlepels Honigazijn van Zecäjuin, driemaal daags, aan het oogmerk voldoen, en de verkeerde honger tevens een weinig gestuit worden.

Onder deze behandeling moet het Kind dikwijls, maar korten tijd, gezoogd, en zijne Maag en Buik, met eene lugtige hand, dikwijls gewreeven worden.

Men herinnere zich nu en vervolgens, dat de Leefwijs der Zoogster altijd moet geschikt zijn naar de bijzondere omstandigheden van het Lijdertje, waar van te voren genoeg gezegd is.

Ten tweeden. — Wanneer het Kind, gespeend of niet, vele vergeeffsche neigingen tot braken heeft,
de

de Maag opgezet en de eerlust gebrekkis is; dan komt een meer vermogend Middel te pas: — Zulk een, het welk het kazige ontbint en ontlast.

Het een en ander dezer vereischten vinden wij in den Braakwortel en Braakwijnsteen.

Hoe lastig ook de voorschriften voor Geneeskundigen zijn mogen, kan ik echter dezelve, nu en elders, om de wille van den onbedreven Huisvader, niet ontgaan.

Aftrekzel van den Braakwortel. — Neem twaalf of agtien grijnen, grof gestoten, van dezen Wortel, en drie lepels Water. — Laat dit Mengsel één uur lang heet trekken; — giet het door, en voeg er een weinig Suiker bij. — geef het Kind daar van, elk half uur, een eijerlepel, of iets meer, naar mate de meerdere of mindere levensmaanden, of traagheid van gestel, het welk overal in 't oog moet gehouden worden.

Poeder des Braakwortels. — Twee of drie Grijnen van den fijn gestoten en doorgeziften Wortel, met tweemaal zoo veel Suiker gemengd, en in vier Poedertjes verdeeld, wordt, om de twee uren, één derzelve, met een weinig water of witte Wijn ingegeven.

Dezen zijn, in dit geval, ook mijne gewone voorschriften.

Veeltijds bediene ik mij, met vrucht, van de *Tinctuur*, wanneer de trage Maagvezelen een sterker prikkel vorderen. — Van dezelve geeft men, alle twee uren, zes of agt droppels, met een eijerlepel Spaanschen Wijn, of Water en Suiker.

Dat intusfchen Klijsteeren van Water, Honing en Zout, medewerken, zal naderhand blijken.

Veeltijds is de Walging verzeld van eenen zeer benaauwden, fcherpen Hoest, wanneer de Braakmiddelen des te noodzakelijker zijn; Doch hier is eene opmerkzame voorzigtigheid noodzakelijk.

Wat men ook, tot bezwaar van de Zeeäjuin, vooral van de bereidingen van Spiesglas, bijbrengende, wij houden die, in deze omftandigheid, voor de beste Middelen, om dat zij genoeg beproefd en veilig zijn. — Men geve dan Honigazijn van Zeeäjuin, om de twee uren, telkens tot de hoeveelheid van twee eijerlepels; of liever, alle drie uren, een halve grijn Gulden Swavel van Spiesglas, en een weinig Suiker met Water.

Drie vingeren Kamilsbloemen, of een lepel beste Thee, op vier of vijf lepels Water getrokken, waar van, bij korte poozen, een Papepel vol wordt toegediend, bereikt het zelve oogmerk.

Gedurende het herhaalde gebruik dezer Braakmiddelen, zal men veel nuts toebrengeu met het
wrij-

wrijven van den Buik en de Lenden, door middel van Doeken, doordrongen met Geest van Anijs, Karwei, of dergelijken.

Indien in den aanvang der Engelsche Ziekte aldus gehandeld wordt, zal men dezelve, het geen ik meen mij dikwijls gelukt te zijn, in haren voortgang stuiten.

Ik behandelde zeer onlangs, het vierde Kind van Ouderen, welker drie eerste de Engelsche Ziekte hadden doorgeworfeld, terwijl dit, even hevig, door dezelve gedreigd werdt: — Ik had alle reden, om het stuiten van de Ziekte alleen toeteschrijven aan het herhaald gebruik der Braakmiddelen.

§ C V L

Het *tweede* foort van Middelen, welke de tegenwoordige omstandigheid des Lijders vereisfchen, zijn die, welken de Buik *benedenwaards* ontlasten. (§ XCIX. n. 2.)

Hier omtrent zal zelden, in de keuze der Middelen gezondigd worden, des wij, ten dezen aanzien, de korthed kunnen betrachten.

Poeder van beste Rhabarber en Suiker, van elk tien of twaalf Grijnen, met zes Grijnen Poeder van Karrewijzaad, tot zes giften gemengd, en eene derzelve, om de anderhalf uur, gegeven, zijn meestal voldoende.

De witte Magnesia, van het beste soort, en Rhabarber, van elks twaalf of veertien Grijnen, met een droppe! Anijsolie, op gelijke wijze, als de evengemelde bereiding, toegediend, hebben mij dikwerf voldaan.

Men kan zich anders, indien men dit dienstig oordeelt, van verscheiden, den gemeenen Man genoeg bekende, Purgeermiddelen bedienen.

Wij vinden echter het afzonderlijk gebruik van Buikzuiverende Artzenijen, in dit geval, zelden verkieslijk, en daarom zullen wij er niets meer van zeggen.

§ C V I I.

Indien ik eenig vertrouwen op mijne bevinding stellen mag, dan moet ik besluiten, dat in deze, gelijk in verscheiden andere soortelijke Geneeskundige behandelingen, de verwisfeling der beneden- en bovenwaardsche Ontlastmiddelen, boven het afzonderlijk gebruik van elk derzelyen, en boven de zamenvoeging derzelveu, de voorkeur verdient. — Dit moeten wij aandringen (§ XCIX. n. 3.) behoudens het geene van de volstrekte nuttigheid, vooral der afzonderlijke Braakmiddelen, tegen veler gevoelen, gezegd is. — Men moet ook eenig onderscheid maken tusschen het geen den gemeenen
Man,

Man, en het geen den bekwamen Arts wordt toevertrouwd.

Wij zullen, om de kortheid te betrachten, en de verschillen aftefnijden, dit onderwerp tot de volgende regels bepalen.

Eerstelijk dan, — zoo dra de Ziekte gekend is, geeft men een der opgeteekende Braakmiddelen, gekozen naar bevind van zaken. — Men herhaalt het zelve, om den anderen dag, tot dat de opzetting van de Maag, tevens met de hoeveelheid van 't gekoppelde Zog, verminderd is.

Ondertuschen wordt de Ontlasting naar beneden, door een zachtkens prikkelend Klijskeer, van tijd tot tijd bevorderd.

Daar na, *ten tweeden*, tracht men, door een der zoo evengenoemde Purgeermiddelen, om den anderen of derden dag, den Buik te zuiveren.

Aldus gaat men, *ten derden*, zonder zich te laten affchrikken door den weinigen omslag dezer handelwijze, voort, tot dat de Ingewanden behoorlijk gezuiverd zijn, de bedreiging van den gevreesden voortgang der Engelsche Ziekte verdweenen is, en het overschot van het begin derzelve, met versterkende Middelen en eenen goeden Leefregel, kan overwonnen worden.

Dat deeze behandeling, in vele gevallen, beter is, dan de afzonderlijke aanwending van Braak- en

Purgeermiddelen , blijkt uit hare , door de onder-
vinding bekrachtigde , genoegzaamheid ; — uit hare
zachtheid , in vergelijking van de kwellingen der
andere wijze van behandeling. — En wat men
daar tegen inbrengt , die zachtere behandeling maakt
dezelve verkieslijker en beter. — Hier van toch
heeft men geene Breuken , Persloop , bijna onbe-
dwingbare Walgingen , Stuipen , of nog erger Ge-
volgen , te wachten : Gevolgen ! welken de ge-
lijktijdige Ontlastingen vaak te weeg bragten.

Vereischen de omstandigheden , dat wij iets wa-
gen : — het zij zoo ; — maar zonder dien
nood , moet het menschelijk ligchaam nimmer een
speelbal zijn.

§ C V I I I.

De tweede aanwijzing , ter geneezing der be-
ginnende Engelsche Ziekte (§ XC VIII. n. 2.) be-
staat in een zoodanig bestuur der Leef- en Genees-
wijze , dat men wijders van den voortgang der
Ziekte niets te vreezen hebbe.

Bij velen dezer , toch meestal zwakke , Kinde-
ren zal de eerste Aanwijzing zelden zoo lang kunnen
doorgezet worden , als , ter bereiking van het
oogmerk , noodig is , zonder tevens de Middelen
te bezigen , waar van wij nu zullen handelen.

De

De Zwakheid van het Kind moet dus hier de regel van het gedrag zijn.

Ons tegenwoordig oogmerk zal, bij de meeste Kinderen, onder eene gepaste leefwijze van de Voedster en van het Kind; onder het gebruik van de open en drooge lucht; het maken van eene dreunende beweging; onder eene koele ligging en kleeding; het aanwenden van koude baden, met opvolgende wrijvingen der Lenden en groote Geledingen; met behulp van doordringende Geesten volbragt worden, terwijl het overige aan de Natuur worde aanbevolen.

Anderen echter, welken, zelfs met den aanvang der Ziekte, hevig aangetast worden, zullen de hulp der Geneeskunde noodig hebben.

Hunne Vochten waren reeds meer of min onzuiver, daarom moeten zij *verbeterd* worden; — hunne kragten waren aanmerkelijk geknakt, daarom moeten zij *versterkt* worden.

Doch het een en ander heeft zoo veel overeenkomst met het geene, ter herstellinge der Ziekte, in haar tweede tijdperk, moet aangewezen worden, dat wij, thans voortgaande, in herhalingen zouden vervallen. — Houd het dan nu daar voor, als of die behandeling ook hier ingelascht ware.

§ C I X.

Wij komen dus, van zelf, aan de overweging van een der gewigtigste onderwerpen dezer Verhandeling, namelijk aan de *opgave der beste Middelen*, om de Engelsche Ziekte, in haar tweede *Tijdperk*, of *verderen voortgang*, te herftellen (§ XCVII. n. 2.)

Werd de Ziekte, in haar begin, altijd spoedig gekend; — was zij niet fomtijds schielijk geklommen tot de hoogte, van welke nu moet gesproken worden; — werd zij niet, bij velen, in den beginne, voor beuzelarij gehouden, of, inzonderheid onder het gemeen, veronächtzaamd; — slaagde men, in den aanvang der Ziekte, altijd even gelukkig, dan was het deel van ons werk, nu te behandelen, overtollig.

Om ons te bekorten, zullen de twee volgende *Aanmerkingen* dienstig zijn.

Voor eerst. — Men begrijpt, dat ik nu alleen van de Naaste Oorzaak, en van geene derzelver Toevallen, voo zoo verre de herftelling betreft, handelen zal.

Ten tweeden. — Men kan zeer dikwijls gevallen ontmoeten, waarin tevens de eerste Aanwijzing van het begin der Ziekte moet volbragt worden.

— De noodzakelijkheid daar van blijkt uit het
geene

geene boven gezegd is ; — maar ook aldaar leest men , wat men te verrichten hebbe. — Dus zou de herhaling van de als dan geschiktste Middelen thans overtollig zijn.

§ C X.

Om den Lijder, op de best mogelijke wijze, in dit tweede Tijdvak der Ziekte, te behandelen, zullen *twee hoofdöogmerken* moeten volbragt worden: — *de eerste* bestaat in de *Verbeteringe der Zuure Scherp- te*, waarin wij de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte bewezen hebben te bestaan: — *de tweede* is de gelijktijdige, of opvolgende *Versterking*.

§ C X I.

Ten aanzien van het *Zuur Bederf der Vochten* spreekt de eerlijke Praktijk van *Verbetering* ; maar een veel beloovend Zwetzer roemt, dezelve te kunnen Utdrijven.

Welken zijn de beste Middelen, om deze *Verbetering* werktellig te maken? — Zij moeten gezogt worden, *en* in de *Leefwijze*, *en* in gepaste *Geneesmiddelen*.

§ CXII.

§ C X I I.

De *Leefwijze*. — Deze moet, en bij den Zutgeling, de Voedster en het gespeende Kind, na genoeg overeenkomen met het geene, daar omtrent, onder de Geneeswijze, in het eerste tijdperk der Engelsche Ziekte, gezegd is. — Men zal zich te minder behoeven te bekreunen wegens het geene, in dit geval, bij de Zuigelingen en Zoogters, te doen is, om dat toch het tweede tijdsbeloop der Ziekte zelden voor het eerste Jaar, dat is, meestal na de Speening, vernomen wordt.

Eene Zetregel zal, in dit geval, vrij algemeen doorgaan, te weten: dat de Spijzen en Dranken zoo veel minder van eene Zuure, of tot Zuur hellende, eigenschap moeten bezitten, als zij meer met een Dierlijke hoedanigheid moeten voorzien zijn; onder die bepaling echter, dat men derzelver gebruik niet overdrijve, en den Vochten eene, tegen het Zuur overstaande, Kwaadsappigheid verschaffe.

Tot de bedoelde Voedzels brengen wij Pap van Kalfslit, Brood of Biscuit en Water-Gelei van Hartshoorn — het Dooir van een versch Hoender-ei, gedeeltelijk onder die Pap vermengd, of afzonderlijk, zonder Zout gegeven.

Intuschen moeten ook alle Zoetigheden, gezuikerde Meelkoekjes, en dergelijke Lekkernijen, vermij-

mijd worden; terwijl de Melkpappen en Dranken hoogst nadeelig bevonden worden.

Het overige, betrekkelijk tot de Leefwijze, is, in het Hoofdstuk van de Voorbehoeding, te vinden.

§ C X I I I.

Wij zijn, behoudens den eerbied voor de Artzenijkunde, verplicht te erkennen, dat de Engelsche Ziekte, in vele gevallen, onder eene gepaste Leefwijze, zonder eenig gebruik van Geneesmiddelen, langzaam verdwijnt.

Men zou zich echter zeer bedriegen, met zijn vertrouwen, bij alle Kinderen, eeniglijk op de hulp der Natuur te vestigen, want, indien de Naaste Oorzaak den bijstand der Geneeskunde al niet behoeven mogte, zullen de Toevallen echter haren bijstand dikwerf noodig hebben.

Wij zijn nu gekomen tot de opgave der beste *Geneesmiddelen*, om de zuure Kwaadsappigheid in den voortgang der Engelsche Ziekte te verbeteren.

§ C X I V.

Dewijl mijne stelling, omtrent de Naaste Oorzaak der Ziekte, en de, daar op gegronde, beste *Artzenijmiddelen*, schoon van de Reden en de Onderder.

dervinding ontleend, de voornamen grond is, waar op mijn geheele gebouw steund, zal het niet ondienstig zijn, dat, daar ik den waren aart der Naaste Oorzaak te voren genoeg bewezen heb, ik thans de gronden van Praktijk, daar op gevestigd, zoo ten aanzien van hunne eenvoudigheid, als genoegzaamheid, kortelijk bevestige.

Het denkbeeld van het verbeteren der Engelsche Ziektestoffe hangt af van het onderscheiden begrip, het welk men zich van de genaartheid derzelve gevormd heeft.

Daar aan is het verbazende getal Geneesmiddelen, en de verschillende wijze van behandelen, haren oorsprong verschuldigd; — Daar van zoo vele verbijsterende tegenstrijdigheden. — Velen schijnen te onderstellen, dat men hier op enee raadzeglätige manier, als een blinden, naar den wand moet tasten. — Anderen vormen Aanwijzingen ter Geneezing', die tegen de Natuur der zaak lijnregt aanloopen.

§ C X V.

De *algemeene eigenschappen*, welken de Middelen, om de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte te overwinnen, moeten bezitten, moeten, naar mijne gedachten, in een omgekeerd vermogen van het Zuur
be-

bestaan: — zij moeten zoo eenvoudig en klein van bestek zijn, als mogelijk is: — Zij moeten ook niet strijden tegen de Versterkende Middelen, welker gelijktijdig gebruik met die ter Verbetering strekken, doorgaans onvermijdelijk is: — eindelijk zullen zij, of door eigen kragt, of door bijvoegfels, niet zelden moeten in staat zijn, om een taaij Slijm, het welk vele Kinderen in dit tijdperk der Ziekte, kwelt en de Klieren verhardt, te ontbinden.

Zij, die rijker vermogens in dit soort van Middelen zochten, zijn doorgaans bedrogen.

§ C X V I.

Het verdient aandacht, dat, ondanks de verschillende begrippen omtrent de Naaste Oorzaak, echter bijna alle Schrijvers, met ons, daarin overeenkomen, dat zij *de Verbetering der Engelsche Ziektestoffe* in dat soort van Middelen, welke tegen het Zuur, in vermogen, overstaan, het zelve omwinden, of opslorpen, gezocht hebben.

Vergelijk, ten bewijze van deze Aanmerking, de voorschriften van BOERHAVE, VAN SWIETEN, VOGEL, DE HAAN, ROSEN VAN ROSENSTEIN, BUCHAN, ABILDGAARD, OTTERINCK en vele anderen.

Men is het dus, ten opzichte van de Klasse
de-

dezer beste Middelen, tamelijk eens. — Het zijn de *Loogzouten*, en mogelijk die alleen, welken eene billijke, en door de ondervinding gestaafde, aanspraak op dezen eernaam maken. — Eene eenvoudig toegefelde en kleine Winkel zal den noodigen voorraad opleveren: — *Potasch*, - *Zout van Soda*, - *Spaansche Zeep*, - *Geest van Ammoniak Zout*, zijn, ter *Verbetering* van de *Kwaadsapigheid* in de *Engelsche Ziekte* voldoende.

§ C X V I I.

De *hoeveelheid der Giften* en de *de wijze van Gebruik* dezer Middelen moeten nader bepaald worden.

Ik zal mij nu, hier omtrent, bekorten, om dat het een en ander, na het onderzoek ter tweede *Aanwijzing*, proefondervindelijk blijken zal.

§ C X V I I I.

De *Loogzoute* eigenschap van de *Potasch* is overbekend. — Men weet, dat dezelve, vooral, indien zij van alle *Viriooldelen* gezuiverd is, met het *Zuur* vermengd, zoo lang opbruischt, tot zij beiden hun overheerschend vermogen verloren hebben.

Om

Om dit Middel met het oogmerk, waar van wij nu spreken, op hoop van eenen goeden uitslag, aantewenden, kan men, op deze wijze te werk gaan: — Eene Dragma, of een half Lood van die Asfche wordt gesmolten in zes of agt Oncen zuiver Water. — Geef het Kind, alle twee Uuren 30 of 40. droppels van dit mengfel met twee eijerlepels gemeen Water, en des noeds een weinig Suiker. — Na aldus vier of vijf dagen voortgegaan te hebben, zal dit voor een versterkend Middel, gedurende een paar dagen, moeten verwisfeld worden. — Daar na de Potasch, enz.

§ C X I X.

Het Zout van *Soda*, *Souda* of der Asfche van den plant *Kali*, (bekend onder den naam van *Krabbenkwaad*,) welke ook *Rusfische Asfche* door sommigen geheeten word, is een der beste Loogzouten, in ons geval dienstig, en des te deugdelijker, naar mate hetzelfde van allen Zuure in mengfels beter gezuiverd zij. — Het beste kenmerk, meest in het Alexandrynsche *Soda - Zout* te vinden, bestaat daarin, dat hetzelfde, niet, gelijk het Hartshoorn- Brem- of andere Loogzouten, der opene Lucht blootgesteld, spoedig smelte, en

dat het, zonder zulks, tot een fijn poeder kan gewreeven worden.

Ik gaf dit Zout, in de neteligste omstandigheden, boven anderen, hoe geroemd, de Voorkeur, om dat hetzelfde eene uitmuntende, hoewel langzaam werkende, eigenschap bezit, om de Zuure Kwaadfappigheid te overwinnen, en tevens, om de taaie Slijm en Klierverhardingen, te ontbinden: Vermogens! aan onze Praktikale Aanwijzing juist voldoende.

Smelt anderhalf Lood dezes Zouts in twee Oncen overgehaald zuiver Water. — Men geeve het Lijderdje daarvan drie- of viermalen daags, twintig droppels met een paplepel Vlier- en etlijke droppels Kaneelwater. — Deze gift kan tot Veertig, Zestig, zelfs tot Honderd droppels, des noods, zonder hinder, vermeerderd worden. — Staak dit, na vijf of zes dagen, om, gedurende even zoo veel tijds, den Lijder te versterken; — hervat het Zout, — staak het op dezelfde wijze en om dezelfde reden. — Men gaa dus voort, onder eene geduldige afwagting van den uitflag en zonder zich door eene min spoedige verbetering te laten affchrikken. — Ter verbetering van den fmaak kieze men liever Kaneel- of Orangebloesem-Water, dan Zoetigheid.

De

De ondervinding levert ons eene noodige waarfchouwing. — Het gebeurt namelijk dikwerf, onder het aanhoudend gebruik van dit en dergelijke walgzoute Artzenijen, dat de Zuure Adem en de goore Reuk van het Zweet spoedig verminderen. — Bespeurt met dit, flap dan eenigen tijd af van derzelver gebruik, op dat geene tegenovergestelde, dat is, een Scheurbuikige fcherpte veroorzaakt worde. — Ik zag, uit het verzuim dezer Waarneming, meer malen lastige gevolgen ontstaan.

Men zorge ondertuschen, dat het Kind open lijf houde, het geen veiligst met gefmolten Manna, of afgetrokken Rhabarber, kan geschieden.

§ C X X.

De *Spaansche Zeep* is, in aart, gelijk aan de twee voorgaanden, en bezit geen minder vermogen.

Men geve daar van aan een Kind van één Jaar, driemaal daags, vier Pillerjes, elk van één Grijn, met een weinig verlengd Kalfslil: — aan een van van twee tot vier Jaren, Vier of Vijfmaal dezelfde hoeveelheid.

Niemand gaa hier met schroom te werk: — Het Middel is zoo lang veilig als de Adem, of andere kenneekens de aanwezigheid van het Zuur vertoonen. — Ik ben niet zelden genoodzaakt geweest.

om de Gift tot 40 en meer Griijnen daags te bepalen.

Misfchien stel ik te veel prijs op dit Middel, wanneer ik beweer, dat het zelve het allerbeste onder het besten is, ter verbetering der Zuure Kwaadfippigheid. — Maar meenigvuldige Proeven nopen mij tot de verzekering, dat ik van geen ander Geneesmiddel gunstiger werking bespeurd heb, dan van even dit; — Dat daar door de Zuure scherpte spoediger verbeterd werd, dan in andere gevallen, door de Natuur of Kunst, verricht werd.

De eenvoudigheid, de onkostbaarheid, de aart van het Middel, deszelfs gemaklijk gebruik, en de ervaring; alles, met één woord, prijst het zelve ten sterksten aan. — Men zorge flegts, dat deszelfs hoeveelheid gericht worde naar de hevigheid der Ziekte, en dat die in 't algemeen grooter genomen worde, dan gewoonlijk geschiedt.

§ C X X L

De Geest van Ammoniak-Zout, en dergelijken, als het Zout van Soda (§ CXIX) het Olieächte Vlugzout van SYLVIVS, en duizenden van dien aart, zijn al mede geschikt en behooren tot de beste Middelen, om ons tegenwoordig oogmerk te bereiken. — Wij bepalen ons tot het eerste, om dat
de

de overigen niets meer doen, en de breedte van de Artzenijlijst, gesierd met Middelen van het zelfde vermogen, in mijn oog, eene onnutte wanstalte bevat.

Eeniglijk bedingen wij, dat deze Geest, zoo versch, deugdzzaam en vlug zij, als mogelijk is: — dat de hoeveelheid der Giften langzaam en bij graden moet vermeerderd worden; — en men, in den beginne, aan den uitlag niet wanhoope.

Men geve daags vier of vijfmaal telkens zes of agt droppels, met eenige droppels Kaneel- en een weinig gemeen Water: — en verhoog de gift, tot dat die, binnen drie of vier weken, telken reize, twaalf of veertien droppels bedraagt.

Voor al is mij, onder het gebruik van dit Mittel, de noodzakelijkheid, om van tijd tot tijd door Purgeermiddelen of Klijsteeren, den Buik te zuiveren, dikwijler voorgekomen, dan onder het aanwenden der drie eerst aangeprezen Middelen.

§ C X X I I.

Deze zijn de beste Middelen, om de Naaste Oorzaak eener onvermengde Engelsche Ziekte te verbeteren, en het Bloed eene, aan dezelve tegengestelde, eigenschap te verschaffen.

Hoe eenvoudig is de Natuur! — Zoo word

de Geneeskundige Praktijk, voor den minstgeöfenden, min omflagtig. — Zie daar, indien ik mij niet bedriege, de ware Boerhaviaansche, de Hippocratifche Geneeskunde; dat is, die der Reden en der Bevinding.

Maar moest hier geene lofspraak van de, zoo geliefde, opslurpende, het Zuur inzuigende, of verftompde Aardmiddelen volgen? — Wij betwisten, ditmaal, die deugden aan die Middelen niet; — Maar wij ontkennen hun vermogen verder, dan de eerste Wegen. — Elk, die ons weefsel kent, en met den aart dier Middelen vergelijkt, staat mijne onkenning toe; — of wil men tegenftrijdheden, in goeden ernst, verdedigen? — kunnen Geneesmiddelen, die zich zelve den toegang naar het Bloed ftuiten, op het Bloed werken? — Ik stel op die Middelen, in dit geval, geen de minfte prijs. — Deed ik anders, de Reden en de Ondervinding zouden mijne stelling wraken.

Is echter iets dergelijks noodzakelijk, dan zal de beste *Magnefie* alleen voldoen. — Doch dit loopt buiten mijn bestek.

§ C X X I I I.

De Tweede Aanwijzing ter Geneezing van de
En-

Engelsche Ziekte in haar tweede tijdperk, bestaat in de *Versterking der Lijderen* (§ CX.).

De Middelen, daar toe dienstig, zijn, uit hoofde van haar gebruik, tweeledig: *Inwendige* namelijk, en *Uitwendige*.

§ C X X I V.

Tot de *Inwendige Middelen* behooren

- I. Het *Staal*.
- II. De *Koortsbast*.
- III. De *Meekrap*.
- IV. Eenige *Minerale Wateren*.

Ik zal deze Middelen, zoo veel hier noodig schijnt, *Beschrijven*; daar na aanwijzen, hoe men *zich van dezelve moet bedienen*.

§ C X X V.

Voor eerst, het Staal. — Dit fijn, zeer door-
dringend en versterkend Geneesmiddel bezit, boven
alle anderen, het vermogen om Vochten en Vaten
alzo te verbeteren én te ondersteunen, dat het zel-
ve daar door van oudsher in achtling was, en zij-
nen roem tot dus verre ongeschonden bewaard heeft.

Men ondeckte reeds met de verschijning der Engelfche Ziekte, dat het Staal, uit aanmerking der gemelde eigenschappen, ter versterking van den lijder, noodzakelijk was. — Anderen, hier mede niet te vreden, wisten, op eene meer of min kunstige wijze, het Staal onder verschillende gedaantens te bedekken, en als onfeilbaar regens de Engelfche Ziekte aanteprijzen. — Dit werd daar na, niet alleen door Kwakzalvers en Pisbekijkers, maar zelfs door geordende Geneesheeren, uit enkele baatzucht, verricht.

Het Staal levert *op zich zelve*, dat is, tot een fijn Poeder gebragt, eene nuttige bereiding.

Sommigen van deszelfs *Bereidingen* zijn even dienstig, en bij Kinderen verkieslijker: — Hier toe behooren voornaamelijk: het *Aftreksel*, bij wijze van een popje: — de zamentrekkende *Staal-tinctuur* van LUDOVICUS: — de openende *Staal-tinctuur* van PARACELSUS: — de Tinctuur van Staal, getrokken met Azijn, welks Waterdeelen bevrozen waren: eene bereiding, door den grooten BOERHAVEN ten sterksten geroemd: — ook de gulden Tinctuur van Staal-Vitriool, door den Baron VAN SWIETEN te regt geprezen: — en eindelijk het Vitriool van Staal, zoo lang gebrand, tot het zelve een witte kleur heeft.

Deze zijn de gereedste en geschikste Middelen,
wel-

welken het Yzer, in dit geval, verschaft. — Ik zal naderhand toonen, welken derzelven de Ervaring mij geleerd heeft, de deugdzaamsten te zijn.

§ C X X V I.

Ten tweeden; de Koortsbast, 'en van denzelven

- a.* Het fijn gestoote Poeder, vooral van de roode *Kina*;
- b.* Het afkookfel in Water of Wijn;
- c.* Deszelfs Extract, en Harst;
- d.* De Tinctuur, en
- e.* Het ware (*essentieel*) Zout van dezelve.

§ C X X V I I.

Ten derden; — Van de Meekrap, wiens lof, in de tegenwoordige Aanwijzing, door velen hoog geroemd wordt, en welke in de daad, onder zekere bepalingen, wezenlijke verdiensten bezit, komt ons het Afkookfel het beste voor.

§ C X X V I I I.

Ten vierden; — Van de Mineraal Wateren heeft mij het Spa-en Lampscheiderwater doorgaans

meest voldaan. — De behoefte kan een gloeiend Yzer in gewoon Water zoo dikwils blusſchen, tot het water een Yferſmaak heeft, wanneer de kragt van dat Water weinig zal verſchillen van die der beſte Staalwateren.

§ C X X I X.

De *Uitwendige Middelen* (§ CXXIII.) bepalen zich tot het *koude Bad* van enkel Water, of van Water met Brandewijn, Rum, of dergelijken; — tot *Wrijvingen* met de bloote hand met een Vleeschborſtel, of met doordringende Specerijächte Balfems en Geesten; — eindelijk tot een *Harde Ligging* op een matras, gevuld met gekapt Stroo, Eiken-Varen, Paardehair, of dergelijken.

Wij verwerpen alle uitwendige verwarmende, of weekmakende Stoovingen en Trekpleisters.

§ C X X X.

Worden deze Middelen behoorlijk gebruikt, het ſchadelijke onthouden, en de Leefregel naar eisch beſtuurd, dan zal men, met geduld en vlijt, gewisfelijk ſlagen.

§ CXXXI.

§ C X X X I .

Het is niet genoeg, de Middelen te hebben aangewezen, men begeert, te regt, het onderricht van de Manier, *om er zich van te bedienen* (§ CXXIV).

Dit onderwerp vordert onzen aandacht, eene juiste onderscheiding, en kan uit de Ondervinding alleen, naar eisch, behandeld worden.

Mij dunkt, dat ik den Lezeren op eene meer gemakkelijke en verstaanbare wijze mijne gewone manier van handelen, door eenige weinige *Waarnemingen* zal doen bevatten, dan door ingewikkelde en veeltijds moeilijke Praktikale onderstellingen en bepalingen.

Deze Waarnemingen zal ik uit eenen aanmerkelyken voorraad kiezen, als, mijns begrips, best geschikt, om tot een staal te strekken van duizend dergelijke gevallen.

Het *eerste soort* dezer Waarnemingen zal dienen, om te bewijzen, dat de Versterking somtijds eerst te pas komt, na dat de Kwaadfappigheid verbeterd is.

Het *tweede soort* zal toonen, dat het een en ander dikwerf, ter volkomen genezing van de Engelsche Ziekte, moet zamengaan.

§ CXXXII.

§ C X X X I I.

Tot het *eerste* soort behooren de twee volgende gevallen.

I. Een Zoontje, het eerste Kind van gezonde Ouderen, vertoonde, omtrent zijne negende Levensmaand, de eerste beginsels der Engelsche Ziekte.

De Brakingen van Zuure stoffen, had men nu en dan, met een Aftrekfel van den Braakwortel bevordert, en den buik met witte Magnesia en Rhabarber, met Zetpilletjes van Honing en Zout, en Aarspuitingen, benedewaards gezuiverd. — Dit was noodig, om dat niets van het geene de Moeder had gebruikt, om het Zog eene Purgeerende kragt te geven, aan dat oogmerk had voldaan.

Ondanks dit bestuur, nam de Ziekte toe, en werd, naa de Speening, hoe langs zoo heviger; — Het Hoofd was merkelyk uitgezet, de Arm- en Deibeentjes waren Scheef; — de benedenste Hoofden der Arm- Kuit- en Scheenbeenderen uitgezet; — de Buik was gezwollen en hard; — het Vel der benedenste Ledenmaten los en al te ruim; — Ook waren die deelen blykbaar vermagerd; — De Drek en Pis hadden eenen zuuren, gooren Reuk; de eerste eene donkere bruine kleur,

Voorts was het Kind zeer hongerig en gezond,

Aldus was de Gesteldheid van het Lijderijje, toen
het

het zelve, zeventien Maanden bereikt hebbende, onder mijn opzigt kwam.

Het Voorschrift bestond in Dierlijke Voedsels, meestal bestaande in gesmolten en verlengd Kalfstiel met Brood; — s' Morgens een versch Eijerdooir; — voorts eene gestadige Beweging: — een Bedje gevuld met Eikenvaren. — Het Geneesmiddel wordt bereid uit vijftig Pilletjes Jerusalemsche Zeep, elk van één Grijn; van welken dagelijksch, op verdeelde tijden, Viermalen Vier gegeven werden.

Op deze wijs ging men vier weken voort, gedurende welken de Afgang niet behoefde bevorderd te worden; — Doch de toenmalige Hardlijvigheid, en de bijblijvende zwelling des Buiks vorderden het gebruik van zestien grijnen Rhabarber met een weinig Suiker, welk poedertje, des morgens, in drie reizen, toegediend, en s'avonds met een Klijsteer, bestaande uit één Once Manna, één Dragma keuken Zout, en derdehalf Oncen Waters, geholpen werd.

Schoon de omstandigheden niet ongunstig, en de kragten niet verminderd waren, meende ik echter, dat de vochten, door het gebruik van een Vlug Zout, spoediger zoude verbeterd worden; — Men gaf het Zout van *Soda* viermalen daags, Vier Grijnen, met eene halve lepel Lindenbloesem-water.

Om dat nu en dan eene Buikzuivering noodig

was,

jes, bereid uit tien grijnen Braakwortel, Rhabarber en Suiker, van welken het Kind, alle twee uren, één, met water, gegeven werd. — Hier op volgde den zelfden dag verscheiden Brakingen van zuurachtig Slijm, waarna eenige ontlastingen van bruinen slijmigen Drek vernomen werden.

Wijders beval ik het verblijf op een droog Landgoed; de beweging in de open Lucht; de vermindering van Melk en andere, tot Zuur neigende en verflappende Voedsels.

Het Kind gebruikte tevens, s'Morgens, een versch Eidooir — nu en dan, s'Middags magere Soupe, en, voor Geneesmiddel, viermaalen daags, telkens agt Droppels van den Geest van Ammoniak-Zout met Kaneelwater, het geen op den vijfden Dag gestaakt, en voor een Poeder van tien grijnen Khabarber verwisfeld werd. — Dit laafte was vermengd met het Poeder van den Pitzoreiboon, en Water, zoo dat dit mengfel, s'morgens, in drie verdeelde giften toegediend werd.

Op dezen voet ging men drie Maanden voort.

Ik gaf, daarna, om spoediger te slagen, en om dat het Kind den Geest van Hartshoorn weigerde, alle drie uren, drie grijnen Vlugzout van Hartshoorn en twee grijnen Kaneel Poeder met een weinig Suiker, terwijl op den Leefregel behoorlijk gelet werd.

Toen

Toen de Lijderes drie en een half jaren oud was, scheen het Zuur Bederf des Bloeds bedwongen te zijn, maar de zwakheid en slapheid ter gang, verderde de Versterking.

Ten dien einde, en om de genezing te voltooijen, schreef ik een Afkookfel voor van twee Dragmen roode Kina, zoo, dat een overschot van drie Oncen overbleef, waar bij eene halve Dragma of dertig Droppels Tinctuur van Staal, met bevrozen Azijn getrokken, en een halve Once Oranjesijroop gevoegd werden; het geen, om de twee dagen, hervat werd.

Het koude Bad en opvolgende Wrijvingen der Lenden en der Geledingen met Cajaputolie en den Geest van Ammoniakzout werden hier bij gevoegd.

Na verloop van zes weken, stond het gebruik van dit Afkookzel tegen, waarom ik eene halve Dragma van het Extract van Kina, ombonden in zes Dragmen Kaneelwater, voorschreef, en de gift bepaalde tot een eijerlepel ieder uur, terwijl toen ook de buik met olie van Cajaput en Olijven gewreeven werd.

Aldus bereikte ik het oogmerk, zoo dat het Kind, nu tien jaren oud, geen ander overschot der Engelsche Ziekte behouden heeft, dan twee kromme Knieën, welken, door den tijd, waarschijnlijk zullen herstellen.

§ C X X X I I L

Het andere soort van *Waarnemingen* (§ CXXXI). zal toonen, dat de omstandigheden niet zelden het Verbeteren der vochten, en het Versterken des lichaams, dat is, de volbrenging der twee hoofdoogmerken ter genezing (§ CX). gelijkelijk vereischen.

I. Een Zuigeling van tien maanden zoog zijne zwakke, anders gezonde Moeder. — Het zelve was, de vier eerste maanden, frisch, maar werd daarna, van maand tot maand, zwakker, zoo dat men mij, op de tiende maand raadpleegde. —

Het Hoofd was zeer groot; — deszelfs Naden ongemeen breed; — Uit den mond kwam een zuure stinkende Adem; — de Long was eenigzins met slijm bezet, en het Kind had veeltijds Brakingen; — de Buik was hard en gespannen; — de Navel diep ingetrokken; — de minste aanraking van den Buik bragt pijn te weeg; — de El-Speek- Kuit- en Scheenbeenderen waren vrij krom; — de Knokken van Handen en Voeten ongemeen breed; — van de Heupen tot de Teenen was alles zoo vermagerd, en de Huid zoo los en ruim, als of er niets dan Vel en Been was. —

De Pols was altijd rad, koortzig en slap, voornamen den nacht, wanneer het bovenlijf doorgaans

een

een Zweet ontlaste, het welk, even als de Pis, een' Zuuren reuk van zich gaf. — De Afgangen waren meenigvuldig, dun, zeer stinkende en zwartachtig, ook veeltijds met een taaijen, kaasachtige stoffe bezet.

Deze haghelijke omstandigheid vorderde een drieledig, elk even dringend, toeverzicht: — Het Zuur moest uit de Maag en Darmen ontlast worden: — de naaste oorzaak, namelijk de Zuure Kwadafsappigheid van het bloed moest verbeterd en tevens voor de Kragten gezorgd worden.

Om niets te verzuimen, werd de Moeder eene Versterkende leefwijze aangeraden, welke meestal uit Dierlijke voedfels bestond.

De behandeling van het Kind werd begonnen met een Braakdrankje, bestaande uit den bast van Braakwortel en Suiker, van elk vier Grijnen en een weinig Water. — Hier door werd veel Slijm en Zuur ontlast. — Den volgenden dag gebruikte de Moeder een Afreksel van Rhabarber en Potasch, waar door het Zog eene purgeerende kragt kreeg, welke bij het Kind eenige Stoelgangen veroorzaakte, waar door de Buik aanmerkelijk slonk.

Van den beginne af werd het Kind, van tijd tot tijd, een gedeelte van een versch raauw Eijdoor toegeediend, en om de twee uren een eijerlepelje

van een mengfel, uit eene Dragma Extract van roode Kina en zes halve Dragmen Kaneelwater bestaande.

Het Braakmiddel werd, na verloop van veertien dagen, herhaald, en daarna, andermaal, het Zog met de kracht des Rhabarbers voorzien. — Het een en ander had den voorgemelden uitflag.

Na verloop van zes weken, scheenen de Zuivering van het Bloed en de Versterking, onzen aandacht inzonderheid te vereischen, dewijl de teekenen van een stremfel in de darmen blijkbaar verminderd waren.

Ten dien einde schreef ik iets voor, het geen, mijnes ervarens, in dit geval, niet genoeg kan aangeprezen worden: — Eene Dragma Extract van Roode Kina, zestig droppels Geest van Hartshoom en twee oncen Vlier-Water. — Men gaf hier van, om de twee uren, zoo veel, dat het Mengfel alle twee dagen gebruikt werd. — Elken derden dag gaf ik, naar mate der hardlijvigheid, of eenige kleine poeders uit de Magnesie en Rhabarber, van elk veertien Grijnen; of indien de Stoelgang behoorlijk was, om de twee uren, vier Grijnen wit gebrande Staalvitriool, en even zoo veel gestoten Karweizaad en Suiker.

Aldus ging men vier maanden, gestadig voort, toen het Kind, in vermindering der Engelsche *Ziëkte* en hare toevallen, en in vermeerdering der krag-

kragten, zoodanig was toegenomen, dat ik de verdere geneezing met het Staal alleen volbragt. — Het Lijdertje, namelijk, gaf men viermaalen daags, vijf droppels Tinctuur van Staal, met bevrozen Azijn getrokken, in een paar eijerlepels Madera-Wijn, en een eijerlepel Kaneelwater.

Gedurende dit alles werd eene doordringende Wrijving van de Rug en Geledingen niet verzuimd, en, toen de kragten dit veroorloofden, het koude Bad gebruikt.

Na verloop van een jaar kwamen de Tanden, schoon zeer langzaam en ongeregeld, ten voorschijn; — de kragten namen van dag tot dag toe, en het Kind, nu agt jaren oud, belooft eenen voorspoedigen Wasdom en schranderen Geest.

II. Eene Moeder van drie, altijd voorspoedige, Kinderen leefde gezond en gelukkig, tot zij, van het vierde verlost zijnde, stierf, en de Man verplicht was eene Minne te zoeken.

Uit een aantal Vrouwen, welker Mans op Zee waren, en uit eene meenigte bedrogen Vrijsters, koos men de beste, hoewel zij een Kind van veertien maanden zoogde.

Ons Kind bleef, de eerste zes weken, zeer wel, maar werd, in de zevende week, door gedurige Brakingen overvallen, en was zeer gulzig. — De teekens van Zuur in de Maag en Darmen werden hoe

längs zoo duidelijker. — Het Kind werd tevens zeer zwak.

Het stevige zog met de zwakke verteeringkrachten van het Kind vergeleken hebbende, gaf ik, den raad, (want men wilde van deze Minne niet afzien,) om het zog, door eene verslappende leefwijze te verdunnen, van tijd tot tijd open lijf te maken en dikwijls eenne dunne Kalfs *Bouillon* te laten drinken.

Men gaf het Kind, op den raad eener oude Matrone, zekere geheime Poeders, welken uit Kreeftsoogen en andere Opstijpende Middelen scheenen zamengesteld te zijn. — Bij dit geheim had men geduld, en geen gebruik van andere Geneesmiddelen, voorbedongen. — Het Kind scheen, in de daad, van week tot week, sterker te worden, zelfs scheenen de Tanden, op de vierde maand, te zullen uitbotten.

Echter was de Buik langzaam gezwollen. — Dit nam toe, terwijl de Beenen scheenen te vermageren. — Men verkoos den eigen gang te gaan, tot de dringende nood van het Kind, toen tien Maanden bereikt hebbende, hulp vereischte.

Ik ontwaarde toen alle Teekenen en Toevallen eener ernstige, doch met geene andere vermengde, Engelsche Ziekte. — Het Lijderdje was zwak, koortig en vermagerd.

De

De gronden van Voorzegging waren niet zeer gunstig. — Het vertoeven was gevaarlijk. — De Verbetering der Vochten was zoo dringend noodzakelijk, als het Herstel der kragten.

Bij de Minne was geen andere zorg noodig, dan de Buikzuivering met Rhabarber, waar door ook de Zuigeling genoegzaam open lijf kreeg.

Men gaf het Kind, s'morgens, drie Poedertjes, elk bestaande uit vijf Grijnen zuiver ongeroest Vijlsel van Staal, twee grijnen Kaneelpoeder en vijf Grijnen Kanariezuiker; — s'Middags, om de anderhalf uur, een Eijerlepel van een Mengsel, gemaakt van een halve Digma Extract, zes Grijnen wezenlijk Zout van de rode Kina, en zes Dragmen Oranjesijroop. — Tweemaal daags werden de Buik, de Rug en Geledingen met Olie van Cajaput gewreeven, na dat het Kind, een oogenblik te voeren, tot den Hals, in koud Water gestookt was.

Deze behandeling werd, nu en dan, voor eenen enkelen dag gestaakt, en eene halve Scrupel beste Rhabarber, in verdeelde giften, toegediend.

Dus hield men, terwijl de Verbetering zachtens voortging, zes Maanden aan.

Het Lijderje was intusschen gespeend, waar na men zich van Hartshoorngelci en Kalfssoepe had bediend.

De slaauwtens, met welken het Kind veeltijds

gefreigd werd, werden meestal, met eenige weinige droppels Vocht van gebarnsteend Hartshoorn en wat witte Wijn, voorgekomen, of spoedig gestuit.

Alles ging wijders zoo gunstig, dat de volkomen genezing volbragt werd door de Tinctuur van Kina, en de meergemelde Tinctuur van Staal, alzoo bereid, dat de eerste $\frac{2}{3}$ het laatste $\frac{1}{3}$ uitmaakten, en waar van, viermalen daags, tien Droppels met een weinig witte Wijn gegeven werden.

Het eenigste overschot bestond in een zwakheid der Lenden en Geledingen; doch deze werd, door het koude Bad, overwonnen, zoo dat dit Kind thans eene goede maat van gezondheid geniet.

Het zij mij gegund hier, ter loops, aantemerkén, dat ik, in verscheiden zachteartige Engelsche Ziekten, de genezing eeniglijk met het meergemelde Staaltinctuur heb kunnen volbrengen, zonder eenig bijvoegzel, dan eene geschikte leefwijze, noodig te hebben.

De aanleiding tot derzelver gebruik ben ik schuldig aan den grooten GAUBIUS, waarna mijn Boezemvriend, de schrandere HAHN, Leijdens School te vroeg onttoogen, de voortzetting der proeven, met dit Middel, niet weinig heeft begunstigd. — De meenigvuldige bevinding eischt van mij de erkentenis aan de waardij dier nooit volprezen Geneeskundigen! —

III. De Gencesheer leert in zijne Praktijk onder den gemeenen man, eindelijk, indien hij oplettend is, de ware eenvoudigheid.

Indien de Engelsche Ziekte, zuiver en onvermengd, tot het tweede tijdperk geklommen, en het Lijdertje zeer zwak is, sla ik doorgaans dezen algemeenen weg in.

Voor eerst. — Ik geef een Drank met Potasch, van zijn Vitrioolzuur gezuiverd, waar van de gift naar de jaren bepaald wordt.

Ten tweeden. — De Kina, in een Afkookfel, of derzelver Extract, in een Mengfel.

De eerste wordt s'morgens, de tweede na den middag gebruikt.

Ten derden. — Indien de Buik moet gezuiverd worden, geschiedt zulks met Rhabarber.

Ten vierden. — Veeltijds bestaat de Drank in verlengd Vleeschnat; — de Spijzen in Aardappelen, geele Wortelen, Scorzoneeren, enz.

Na verloop van drie of vier maanden, somtijds eerder, indien de Vochten verbeterd, en de kragten vermeerderd zijn, bezig ik

Ten vijfden, het Staal, bepaaldelijk, indien de smaak niet hindert, de Tinctuur, met bevrozen Azijn bereid.

Ten zesden. — Het koude Bad, Wrijvingen met specerijachtige Balfems, een drooge Lucht,

dunne Kleeding, de beweging in een wagentje op hobbelige wegen en straaten, en eene harde ligging.

Ten zevende. — Het afkookzel van de Meekrap komt ook dikwijls te stade, wanneer de weekheid der Beenderen het vermogen 'der Kina en van het Staal wederstaat. — Onder deze bepaling, en onder beding, dat die weekheid uit geene andere oorzaak geboren wordt, kan het Afkookfel van twee Dragmen des Wortels, op vier Oncen Water, veel nuts te weeg brengen.

Deze algemeene regels in een aantal bijzonderheden uittebreiden, zou thans onnodig en overtollig zijn.

§ C X X X I V.

Wij zijn gekomen tot het *derde deel* van het tegenwoordige Hoofdstuk, de *Herstelling* namelijk, *van zulke Toevallen*, welken eene bijzondere aandacht vereisfchen. (XCVII. n. 3.)

Wij moeten deze Toevallen, gelijk wij te voren gedaan hebben, uit *twee verschillende oogpunten* beschouwen, want zij zijn — *of* uitwerfels van de Naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte, in her afgetrokkene beschouwd, en van derzelver Toevallen — *of* die Toevallen zijn gewrochten van andere
bij-

bijkomende Oorzaken, waar door die der Engelsche Ziekte in hevigheid toenemen.

Men kend dit onderscheid uit het Hoofdstuk, handelende van de Toevallen, en men weet hun verschil en aart in de hevigheid der Ziekte.

§ C X X X V.

Tot het *eerste soort* behooren voornamelijk

1. Eene slijmige Borstbenaauwdheid;
2. Bloedhoest;
3. Moeijelijke Pislozing;
4. Opzetting en Verharding der Klieren;
5. Eene hardnekkige Verharding van den Buik;
6. Stuipen.

§ C X X X V I.

Voor eerst. — Eene slijmige benaauwdheid der Borst, of liever eene inpakking van Slijm in de Long.

Beroemde Ziektekenners zijn onze Waarborgers, wanneer wij stellen, dat eene slijmige ontaarting van het bloed in de Engelsche Ziekte dikwerf voorkomt, en dat de ophooping van Slijm in de Long daar door veroorzaakt wordt.

Dit Toeval loopt buiten den kring der algemeene
Ge-

Geneeswijze. — Wij raden, ten minsten, zulken, die de zorg, ter voorkominge of herstellinge van het zelve, om eene gedreigde verstikking aftewenden, op zich nemen, de uiterste voorzigtigheid.

Ik bedien mij met de meeste vrucht

1. Van de *Kermes Minerale*. — Dit middel heeft, zedert vele jaren, aanspraak op de voorkeur, boven de Zeeäjuin en hare bereidingen. — Dit heeft vooral plaats bij Kinderen, uit aanmerking van de geringe gift en meerdere kragt der *Kermes*.

Twée Grijnen van dit Poeder, met agt Grijnen Poeder van Florentijnschen Lischwortel en even zoo veel Suiker, verdeeld in zes Poeders, volstaan voor éénen dag. — Deze Poeders, elk uur gegeven, kunnen eene genoegzame beweging in en omstreeks de Maag te weeg brengen, eene heilzame Braking en Slijmloozing veroorzaaken. — Geeft men om de twee uren een Poeder, dan zullen Afgangen volgen; — Om de drie uren, dan is elk Poeder een nuttig Slijmöntbindend en Borstöntlastend Middel. — Dus handelt men bij een Kind van één jaar. — In meer gevorderden leeftijd, wordt de *Kermes* één Grijn daags vermeerderd.

2. De *gouden Spiesglas-zwavel*. — Indien de taaije Slijmige gesteldheid van het Bloed dit toeval hebbelijk maakt, en geene overhaasting noodig is, dan zal dit middel verkieslijker zijn, dan het voorgemelde.

Eén Grijn van dit Poeder en tien Grijnen Suiker, in vier giften verdeeld, en om de drie uren ingegeven, volstaat voor een Kind beneden het jaar.

Onder het gebruik van dit en het voorgaande Middel, moeten alle Zuuren en Staalbereidingen vermijd worden.

3. Soms is eene werkeloosheid der Long meer te beschuldigen, dan de Slijmige geaartheid der Vochten.

In dat geval is een plaatselijke prikkel noodig; — Het beste hulpmiddel erlangt men dan, wanneer de Dampkring van her vertrek met den waasem van Azijn of Brandewijn voorzien wordt.

Ik meen te hebben opgemerkt, dat, wanneer, tevens met dien waasem, viermalen daags, een Poedertje van een derde Grijn Kamfer met vier grijnen Suiker gegeven wordt, het eene Middel het andere versterkt.

Slaagt men niet met deze, dan zullen ook de overige Middelen vergeefsch beproefd worden. —

Men

Men lette, in hoe verre de Buikzuiveringen in de oorzaak van dit toeval deelen, en men bediense zich des noods, liefst van eene weekmakende Klijsteer.

§ C X X X V I I.

Ten tweeden: — De Bloedhoest. — Ik heb dit toeval niet dikwijls, als een gewrocht der Engelsche Ziekte, waargenomen, doch het zelve begrepen te ontstaan uit eene plaatselijke prikkeling, door de Zuure scherpte, en uit eene verwijdering der uitwaasfemende mondjes in de uiteindens of blinde blaasjes der luchtaderlijke Vaten.

Een dier Lijderijes, omtrent twee jaren oud, gaf ik een drank, bestaande uit zestien Grienen raauwe Aluijn, ééne Dragma Conferf van roode Roozen en twee Oncen Waters. — Hier van werd, elk uur, een Paplepel gegeven. — De bloedige Ontlasting was, na drie dagen, gestuit.

Eenmaal bespeurde ik, bij een Jongetje van bijna drie jaren, eene bloedige Fluimlozing, welke reeds anderhalf jaren geduurd, en alle Middelen wederstreefd had.

Om den prikkel aftewenden, liet ik den Bast van *Garou* op de Borst plaatzen. — Dit gelukte, en het toeval verdween even langzaam, als het gekomen was.

§ C X X X V I I I.

§ C X X X V I I L

Ten derden; — De moeilijke Pislozing. —
Dit toeval is min zeldzaam, en gemakkelijker te be-
wringen, dan het evengemelde. — Althans ik kan
verzekeren, dat deze Amandelmelk mij nimmer te
leur gesteld heeft: Neem zes zoete Amandelen,
melk dezelve langzaam uit met drie Oncen kookend
Water, voeg bij het doorzigtel twee Grijnen Kam-
fer, zes Grijnen poeder van Arabische Gom, en
drie Dragmen Sijroop van Witte Maankoppen. —
Geef aan een Kind van één jaar, om de twee
uren; aan een van twee of drie jaren, elk uur
een Papepel.

§ C X X X I X

*Ten vierden; — De swelling en verharding
er Klieren. — Inwendige Middelen* kunnen in dit
geval, weinig baten, dan in zoo verre dezelve me-
ewerken, om de taaije gesteldheid der Vochten,
evens met de Zuure Kwaadsappigheid te verbeteren.

Uitwendig bezigt men *Wrijvingen* op, of nabij
de verharde Klieren aan den Hals, omstreeks den
buik, of elders, met de bloote hand, of met de
Zenuwzalf (*Ung. Nerv.*), de Olie van *Cajaput*, of
Sulilawan, en den Geest van *Ammoniaksout*.

Sto-

Stovingen komen ook te stade. — Warm aangelegde, dikwijls ververschte, Wollen Lappen, welken met den rook van Mastik, Wierook en dergelijken, doortrokken waren, vond ik meermalen beter geschikt, en meer voldoende, dan natte Stovingen; echter heeft men tegen Klierverhardingen van den Buik zich van Stovingen, met dubbelden Anijs bereid, dikwijls met vrucht bediend.

Tegen zeer wederspannige Verhardingen der Halsklieren, kan somtijds de Kwik, het zij als een Zalf, of Pleister, bereid, niet ontbeerd worden. — De Kikvorschenpleister, met meer of minder Kwik versterkt, is de gemakkelijkste. — Men zij evenwel bedacht, om, door te veel Kwiks, geene onnoodige kwijling te veroorzaken. — De ervaring leerde mij, dat de gemelde Pleister, gemengd met even zoo veel van die, welke uit den Dollen Kervel gemaakt wordt, ook in dit geval, spoediger smelting maakt, dan elk afzonderlijk.

§ C X L.

Ten vijften: — Indien de *hardnekkige Zwelling van den Buik*, door eene ziekelijke opzetting des Levers, of der Milt, te weeg gebragt worden, dan zal de Kunst weinig hulp verschaffen, ter voorkominge eener gevreesde Uitteerende kwijning. —

om.

Sommigen hebben de Zwelling waargenomen; doch ik zag dezelve nooit als een eigenlijk gewrocht van de naaste Oorzaak der Engelsche Ziekte.

Wanneer dit toeval, (het geen als een bijkomende hindernis mag worden beschouwd,) door opgespannen Darmen veroorzaakt wordt, en eene afzonderlijke behandeling vereischt, dan bedien ik mij van dikwijls herhaalde weekmakende Klijsteeren, Wrijvingen van den Buik met doordringende Geesten, of Balsems, en ik laat dezelven, ten zij de pijn dit verbiede, in eene, zoo genaamde, Gezondheid fluiten.

§ C X L I.

Ten zesden: — De Stuipen. — Deze zijn evenredig aan de zwakheid en aandoenlijkheid der Lijdertjes, in verband met de prikkelende kragt der Zuure scherpte. — De herstelling derzelven moet dus meest gezocht worden in de volvoering der algemeene Aanwijzingen. — Indien hare meenigvuldigheid en geweld echter eene bijzondere oplettendheid vereischen, dan zal men doorgaans met twee Grijnen Bevergijs-poeder, twee of drie Grijnen Bloem van Spiauter en zes Grijnen Suiker, meer en bestendiger voordeel hebben, dan van het Heulsap. — Vijf of zes droppels Gebarnsteend Hartshoornvocht met

met een weinig Witte Wijn; — twee Grijnen Moschus, een half Grijn Kamfer en zes Grijnen Suiker zijn ook verkieslijker, dan de afschuwelijke Duivelsdrek. — Men begrijpt, dat een dezer Stuipebedarende Middelen, om de twee of drie uren, moet hervat worden, tot men zijn oogmerk trefte.

Ik heb die bewegingen, nog onlangs, met dergelijke Middelen, hoe vermogend die anders zijn, niet kunnen stuiten, maar slaagde met Klijsteeren, onder welken twee Dragmen Duivelsdrek ontbonden waren.

In dit en de verdere Verschijnsels zal de voornaamste waarschouwing zijn, dat men naauw acht geve, uit welke oorzaak dezelve ontstaan.

§ CXLII.

Deze zijn de Toevallen en derzelver behandeling, waar van wij spreken moesten. — Anderen zijn te voren beschreven; — anderen van te luttel belang; — eenigen heb ik stilzwijgende voorbijgegaan, omdat zij eigenlijk tot de Gevolgen behooren.

§ CXLIII.

Wij moeten in de *tweede plaats* (CXXXIV n. 2.)
de

de Toevallen van eenen anderen kant overwegen. — Bijkomende omstandigheden kunnen dezelve kwaad-aartiger maken, of anderen er bijvoegen. — Hier toe behoord alles, wat het Bloed verdunt en de Vezelen verzwakt of aandoenlijk maakt: met één woord, hier toe behooren alle Ziekten, waar voor de Kinderen vatbaar zijn. — Dan moet ik de beste genezing dier Ziekten aanwijzen? — Waar zou dit heen? — Men weet mijn denkbeeld hier omtrent. — Ik kan, noch mag mij echter niet van alles onttrekken.

De Scheurbuikige, vooral de Venerieke scherpte der Vochten verzellen de Engelsche Ziekte zoo dikwerf, dat ik, met anderen, meer dan eens, in gevaar ben geweest, om, ten aanzien van den waren aart der Engelsche Ziekte, grovelijk te dwaalen.

Maar, dewijl ik, op het geleide der bevindinge, het bestaan van den Scheurbuik, uit eene Zuure scherpte geboren, als een woordenspel, en geene wezenlijke zaak, beschouw; en indien zij al bestaat, derzelver genezing niets verschilt van die der Engelsche Ziekte, zoo zie ik geene reden, om hier over uit te weiden.

Dewijl voorts de beste Geneeswijze der Engelsche Ziekte, juist gelegen is in de betrachtinge van dat geen, het welk het bloed eene Vlugzoute, dat is, Scheurbuikige, en der Naaste Oorzaak van de Engelsche Ziekte regt tegenoverstaande hoedanigheid

verschafft, zoo zie ik wederom geene reden, om ons geduld met dit onderwerp te kwellen.

Men toetze deze zaak aan de ondervinding, en het veelbeduidend gezag van oordeelkundige Artsen.

Deze redenkaveling toont, waar ik heen wil: — Naar de beste Middelen, om de Toevallen der Engelsche Ziekte, gepaard met de knagende *Venusfmet*, te genezen.

Die, welken tot ons tegenwoordig bestek behoren, spruiten uit eene meer kwaadaartige scherpte des Bloeds, welke blijken geeft van de *Venusfmet*.

1. De uitzetting der Beenderen is grooter, sponsachtiger en pijnlijker. — De Huid is daaromstreeks ongemeen rood, glinsterend ontstoken, heet en zeer gevoelig.

2. Die Ontsteking verwandelt dikwijls in eene spekachtige kwaadaartige Verzweering, zeer hardnekkige Winddoorns, of Beeneters.

3. De verzweeringen in de Keel en de Sprouw zijn veel boosaartiger, leveren een stinkenden dunnen Etter, welke soms uit de Neus, zoo wel als uit den Mond ontlast wordt.

4. Bij zulken gaan de verharde Klieren van den Hals en elders, niet zelden tot verzweering over.

5. De Huidgebreken zijn veel taaijer en moeilijker te genezen, dan in de eenvoudige Engelsche Ziekte.

Ik

Ik zwijg van andere, meer zeldzame Gebreken, welken de Geneesheer, onder het Gemeen, (ach! ware het alleen onder hen,) ten kosten der Kinderen, vaak verneemt.

Hoe de ware aart dezer Toevallen, in onderscheiding van die der onvermengde *Engelsche Ziekte*, moet gekend worden, is in het vijfde Hoofdstuk aangeroond.

§ C X L I V.

Wanneer hij, die zulken Lijder behandelt, van den gemengden zieken staat der Vochten overreed is, moet hij de Middelen, welken de Zuure scherpte in de *Engelsche Ziekte* verbeteren, paren met die geenen, welken de *Venusmet* temperen, of, dringt de nood, hij moet de laatste afzonderlijk gebruiken, waar van wij nu ook eeniglijk zullen handelen.

Het beste Middel daar toe is de *Kwik*, welke of *in-* of *uitwendig* toegediend wordt.

§ C X L V.

Voor eerst: Inwendig. — Ten dien einde zijn de zekerste en veiligste bereidinge van het *Kwik-zilver*

- a. De levende Kwik. — Men wrijft één Dagma van dezelve met één Once Arabifche Gom, volgens het voorschrift van PLENCCK. — Hier bij worden vier Oncen Vlierwater en een weinig Suiker gevoegd. — De Gift wordt bepaald op twee of drie Eijerlepeltjes daags. — Het Lijdertje moet, een half uur na elke Gift, veel Melk en Water, of een Afkookfel van *Sassafras* en *Sarsaparilla* drinken.
- b. De zoete Kwik, behoorlijk bereid, is, in vele gevallen, niet minder nuttig, dan de Levende. — verdeel één Grijn met twaalf Grijnen Suiker in vier Poeders, en laat het Kind dezelve dagelijks, op verdeelde tijden, gebruiken.
- c. De opgeheven bijtende Kwik kan, in zeer hardnekkige of verouderde gevallen, onontbeerlijk zijn. — Dezelve met Suiker gewreven en met Water vermengd, is verkiesselijker voor Kinderen, dan wanneer het Poeder met Koornbrandewijn ontbonden is. — Twee Grijnen op agt Oncen Water voldoen voor vier of vijf dagen.

Ook na het gebruik dezer twee laatste Midelen moet het Lijdertje veel drinken.

Met deze Bereidingen kan men alles doen, wat de

de Kunst vordert. — De overigen zijn of onnut, of overtoellig.

§ C X L V I.

Ten tweeden: — Uitwendig. — Hier omtrent zal voornamelijk nodig zijn, dat de zachte, bolle, en als veêrkrachtige zwellingen van de Huid, zoo wel als de schijnbaar rijpgeworden Klieren, gesloten blijven, terwijl men, door middel van Suiker-rafinadeurs Kalkwater, de ontfeking afweere.

Men begrijpt dus, dat alle weekmakende Stovingen, Pappen en Plijsters hoogstnadeelig zijn. — De deugdelijkheid van dezen raad toonen de meenigvuldige Lijdertjes, welken onder onkundige handen geraakt zijn, en de hardnekkigheid van hunne ontijdige geöpende Venerieke gezwellen. — Het inwendig gebruik van Kwik is best in staat, om de knagende smet te temperen.

De oplettendste Handärts zal echter niet altijd in staat zijn, om dit soort van Verzweringen voortekomen, — dezelve te zuiveren en te sluiten. — Bij een zeer voorzichtig inwendig gebruik van den Kwik voegt men de volgende behandeling: —

1. De Verzwering moet dagelijksch met *Aqua Phagadenica* gewasfchen worden.

2. Op dezelve moet een *Compres* gelegd worden, doorweekt met het zelfde — of met Kalkwater, of, vooral indien 'er Beenbederf plaats heeft, een Wlek, bevochtigd met Kwik in Therebintijn gedood.
3. Het weelig Vleesch zal door den Rooden Neêrgeploften Kwik langzaam weggeknaagd worden.
4. Indien de Beenächtige zelfstandigheid aangedaan is, zal, het geen boven (n. 2.) gezegd is, te pas komen. — Men beschermte dan ook het gebrek tegen de Lucht, en weere de rotting met Tinctuur van Mijrrhe, of het *Elix. prop.* van PARACELsus. — Dit laatste is fomrijds verkieslijker, want men heeft opgemerkt, dat de plaatselijke Kwikmiddelen, in enkele gevallen, het bederf vermeerderen.
5. De verstorven Beenderen moeten, met behulp der Natuur, spoedig weggenomen worden, om zo veel fchielijker gelegenheid te verschaffen aan den nieuwen Beengroei. — Dit geschiedt best door den fijnen Beenboor, welke tot het midden van 't Been doorgedrongen, den weg baant voor nieuwe Beenvezelen en Beenvlies.
6. Indien de Venusmet de Engelsche Ziekte zoo kwaadaartig gemaakt heeft, dat het gansche Beengestel daar mede als doortrokken is,

wat dan? — Vervoeg u bij een kundigen Heelmeester; — Maar, hier verder gaande, zou ik geraken boven de verbaarheid van het Gemeen, of ten minsten, mij in zaken wikkelen, welken eigenlijk tot de gevolgen van deze vermengde Ziekten behooren.

§ CXLVII.

Ondanks de Uitvoerigheid dezer Verhandeling, kan ik, om het gewigt der zake, niet afzijn, de, slechts schetswijze aangeprezen Behandeling tweezins te versterken.

Het eerste zal het gedrag van hem, die deze Middelen moet aanwenden, nader regelen, om overtuigd te zijn van de natuur des gebreks.

Het tweede zal dienen, om het nut der zelve, en de behandeling proefondervindelijk, te versterken.

§ CXLVIII.

Wat *het eerste* betreft. — De aanleidende Middelen ter onderscheidinge der Engelsche Ziekte, van die, welke met de Venusmet vermengd is, zijn in onze eerste en vijfde Hoofdstuk opgegeven. — Wij moeten echter toestaan, dat de zaak niet altijd

die blijkbaarheid heeft, om een zeker besluit te trekken, en dat zelfs de kundigste Arts aarzelen zoude. — Wat is 'er dan te doen? — Men onderzoek naauwkeurig het voormalig gedrag der Ouderen, vooral van de Moeder of Minne, en hare Ligchäämsgesteldheid, gedurende de Dragt of Zooging. — Had de eene of andere eenen boosaartigen Witten Vloed? — Was de Man voormaals met de een of andere Ziekte, welke de Vrouw had aangeftoken, besmet? — Zoo ja: dit zal eenig licht in duisternis verschaffen. — Waren zij beiden blijkbaar vergiftigd, dan zal het besluit eenige meerder zekerheid bekomen.

De twijfeling wordt minder, wanneer Kinderen van vroeger Dragt fukkelende, en aan Venerieke gebreken kwijnende waren.

Het vermoeden wordt bijna zeker, indien de gewone behandeling der Engelsche Ziekte, in die gevallen kragteloos bevonden wordt.

De zekerheid zal volkomen zijn, zoo dra de gebreken, onder het aanwenden der Kwikmiddelen, zuiverder worden.

§ C X L I X.

Wat de beloofde *Waarnemingen* (§ CXLVII.) betreft. — Waren die niet ter bevestiging van ons onderwerp noodzakelijk? — Strekten zij niet, om
ons

ons bestuur te regelen , gaarne zag ik mij van dezelve ontlagen. —

Eerste Waarneming.

Een Jongetje , van zestien maanden , had de Engelsche Ziekte , zonder eenige blijkbare oorzaak eener andere Ziekte. — De gewone , op eene gevoeglijke wijze , aangewende , Geneeswijs was vruchteloos. — De toevallen werden heviger ; — de zwakheid en vermagting van het Onderlijf , de zwelling des Buiks , alles nam toe. — Het Hoofd en de Naden waren zeer sterk uitgezet ; — de gezwollen Kropslagaders sloegen geweldig ; — de Hoofden der Beenderen van Handen en Voeten waren niet alleen gezwollen , maar ook ongelijk en sponsachtig ; — ook waren de Rugwervelen links en buitenwaards geweken. — De regter Ribben waren binnen , — en de linker buitenwaards geperst ; — de Dei- en Armbeenen zeer krom gegroeid. — In de regter Heup was eene pijnlijke , harde , glimmende Zwelling , waarin eene schommeling bespeurd werd ; — Op de Scheen- en Armbeenderen werd men eenige ruwe knobbels gewaar , een van welken op de Regterhand , van zelfs doorgebroken , bloedig water ontlast , en een vlak spekkig Zweertje , met harde randen , ter grootte van een Stui-ver , nagelaten had. — Het water , uit dit Zweertje ge-

gestadig lekkende, gaf eene reuk als van een Beenbederf. — De Tandén kwamen niet zoo dra uit de Kassen of werden bruin, zwart, en vielen stukswijze uit.

De Adem was doorgaans heet en stinkend; — de Keel bezet met Sprouwachtige bruine Puisten. — Het Aangezicht geel; en de Pols was ongemeen zwak en koortsig, met verheffingen tegen den nacht.

In dezen Toestand vond ik den Lijder, in den ouderdom van twee en twintig Maanden.

Deze beschouwing, en de ongenoegzaamheid der gewone handelwijze tegen de Engelsche Ziekte, deden mij, terwijl ik geene gunstige voorspelling doen konde, op andere Middelen bedacht zijn.

Na herhaalde ernstige gesprekken, beleed mij de Vader, dat hij, in de derde Maand der Zwangerheid zijner Vrouwe, toen hij door den Drank verhit was, zich elders, in het Venuspel was te buiten gegaan, en daar na door eenen kwaadaartigen Druiper gekweld werd. — Hij gaf zich, ter genezing over aan eenen Landlooper, en onthield zich intusschen niet van zijne Huisvrouw. — Dit mensch van een uitmuntend Karácter, kreeg, op de vierde Maand der Zwangerheid, eenen kwaadaartigen groenachtigen Vloed, waaraan zij nu nog zikkelde.

Deze nasporing sterkte mijn vermoeden van eene Venerieke ontaarting der Vochten, en deed mij beflui-

sluiten, om dezelve opzettelijk te keer te gaan. — Een der beroemste Heelkundigen van ons Land was van mijn gevoelen, des wij bepaalden, op gelijken voet te handelen.

Ik schreef twee Middelen voor: — het eene bestond uit twee Grijnen zoete Kwik en twee Scrupels Suiker, waar van tien Poedertjes gemaakt werden. — Het andere werd bereid uit twee Dragmen roode *Kina*, welken één etmaal in heet water getrokken werd: — Bij het doorzigtel van vier Oncen, werden zes Grijnen Saffraan en een half once Kaneelwater en Oranjesijroop gevoegd. — Het gebruik was driemalen daags een Poeder met een Lepel van het Drankje.

De Klieren van den Hals werden gedekt met eene dunne Kwikzalf, de overige Knobbels en Diktens met Kalkwater, het geen dikwijls ververscht werd. — Op de verzweering van de Hand werd een Wiekje met *aqua Phagad*: gelegd; de Buik van tijd tot tijd zachtens gewreeven, en elken avond een Klijsteer van Water en Hoonig ingespoten. Het Voedzel bestond uit zachte, met een stipt verbod van Dierlijke, Spijzen.

Na dat wij, op deze wijs, tien dagen aangehouden hadden, besloten wij, uit vreeze voor Kwijling, twee dagen te verpoozen, en dagelijksch een Once *Manna* te geven.

Het

Het Kind weigerde het Afkookfel, des het zelve voor één Dragma dunne Extract van *Kina* en één Once Kancelwaters verwisfeld werd. — Hier van werd, elke twee uren, een Eijerlepel mer een lepel zoete Wei gegeven.

Na verloop van twee maanden, nam alles eene gunstige keer, zoo dat de verbeterde vochtgesteldheid en Teekenen ons deden besluiten, dat de kwaadaardigheid van de Venusfmet bedaard was.

Dit moedigde ons aan, om een, meer doordringend, Kwikmiddel te beproeven.

Ik liet twee Grijnen opgeheven bijtende Kwik met Suiker wrijven, en met zes Oncen Waters vermengen. — Hier van gaf men in den beginne, twee-, naderhand driemalen daags, omtrent één Lepel vol, waarna het Lijdertje telkens eene goede hoeveelheid Water en een weinig Melk dronk. — Om de drie of vier dagen werd één Once gesmolten *Manna* gegeven.

Na verloop van een paar Maanden, gaf het Zweertje op de hand, zuiveren gebonden Etter, zonder Ontlasting van Beenstofte. — De verschijfels, welken het vermoeden van Veneriek fmet verschaft hadden, verdweenen, waarom de hoeveelheid Kwik bij trappen verminderd werd. — Het Wondje floot zich met een Lidteeken, het welk onmiddelijk aan het Been vastgerocid was. — De
Ge.

Genezing van de bijkomende Kwaadsappigheid was binnen zes-en-twintig weken, voltooid, waarna ik den Lijder behandelde gelijk zulken, die aan eene onvermengde Engelsche Ziekte kwijnen, en ik slaagde gelukkig.

Deze, nu agtienjarige, Jongeling heeft van dit bedenkelijk gebrek niets overbehouden, dan een krom Been, en eene geringe stijfte*in de regter, heup.

De uitslag is zeker niet altijd zoo voordeelig, maar mag ik, zonder vermetelheid, vragen, of men altijd den noodigen aandacht en onderscheiding in 't werk stelt?

Tweede Waarneming.

Vijf Kinderen, van dezelfde Ouderen, waren onderhevig aan de Engelsche Ziekte, gepaard met Verhardingen, Verzweeringen en Winddoorns, op verschillende plaarzen des Ligchaams. — Onder deze ellende waren drie derzelven bezweken: de twee anderen dragen nog de gevolgen dezer Ziekte.

Men had de behandeling toevertrouwd aan iemand, die geene andere verdiensten, dan die van bloedverwandschap, bezat.

Het zesde Kind, bij het welk mijne hulp gezogt werd, was een Zoonje van anderhalf Jaar, het
geen

geen, behalven de teekenen der Engelsche Ziekte, in eenen gevorderden staat, ook in de volgende omstandigheid zich bevond: — Op het Achterhoofd was eene pijnelijke harde dikte, ter grootte van eene stuiver. — De Onderkaak was gezwollen; — op de Armen, de Deijen, en aan de linker Knie, op het regter Scheenbeen en de Hand bespeurde men ontfloken Zwellingen, van welken sommigen glinsterend rood en zeer gevoelig, met een veêrkrachtige stoffe gevuld scheenen. — Op de linkershand waren twee, en op de regter ééne open Verzweering. — Men had die gezwollen, door weekmakende Pappen, op Neefs raad, vermurwd, die, wel te vreden over den uitslag, na de insnijding, de ontlasting van bloedig Water vernam.

De kragten waren zeer gering, de Klieren van den Hals, der Oxelen en Liezen vrij hard.

De Pis vertoonde een wit, stinkend, etterig Zetfel. — De Oogen waren hoog rood ontflooken, de Adem heet, en de Keel raauw.

Wie had hier geen Angel in het Gras vermoed? — De Ouders, uit de heffe de Volks, gaven uiterlijk veel gronds voor mijne gisfing. — Geen angstvallig onderzoek was noodig, om te ontdekken, dat de Vader Vuil, en de Moeder jaar en dag, Veneriek geweest waren.

Het vorige geval spoorde mij, en den, aldaar
naar

naar verdiensten geprezen Handarts, aan, om het zelfde spoor te volgen.

Ik gaf dagelijks een Grijn zoete Kwik met Suiker, in verdeelde giften, waar op telkens veel Water en Melk gedronken werd.

De Gezwellen werden met Rafinadeurs Kalkwater gebet, en de open Zweeren met witten Wijn verbonden; terwijl, elken avond, een Klijsteer met Honing en Water gezet werd.

Op dergelijke wijze gingen wij, een half jaar, voort, toen het Kind, het gedreigde slagtoffer van der Ouderen vuil gedrag, en van de drieste onkunde, vrij was van Venus-erfgoed; naderhand, door eene gepaste behandeling, gezond werd, en zich thans, met ijver, bevlijgt in het leggen der gronden, om, binnen kort, zijne geloofs-genooten te leeren en te slichten.

Derde Waarneming.

Een onêcht Meisje, van elf Maanden, werd door eene Minne gezoogd, welke gezond scheen. — De omstandigheden van het Kind gaven mij gelegenheid, om die Minne nabij te onderzoeken. — Ik ontdekte eene kleine, vlakke, verouderde Verzwering tegen het bovenste Gehemelte en eene knaging aan de Lel. — Door deze ontdekking en ver-

dere nasporing, moest ik dat Vrouwsperfoon Venetiek aanmerken.

Het Kind had de Engelsche Ziekte, in eenen gevorderden staat, doch met eenige ongewone toevallen. — Het Hoofd had de gewone grootte; — Verder had men alles, wat vereischt werd, om van de Ziekte zeker te zijn; — doch daar en boven lekte gestadig, uit de Neus, een dun en zeer scherp vocht. — Op de linker Schouder was een harde, wankleurige Dikte, ook aan de regter Bil, die geheel gezwollen, hard en pijnlijk was. — Aldaar ver- toonde zich een zachte punt, welke scheen te zullen doorbreken. — Op de linkervoet was eene kleine Zwelling van gelijken aart.

De Zwelling van de Bil had, den volgenden dag door eene kleine opening den weg gebaad voor een dun, scherp en stinkend Vocht. — Bij onderzoek bleek, dat aldaar eene groote Holligheid en het Zitbeen, door bederf, aangestoken was.

Men deed eene inspuiting van Kalkwater, terwijl de overige Zwellingen, met dat Water, of, bij verwiseling, om de ontsteking te stuiten, met het *Eau Veget. Miner.* van GOULARD bedekt werden.

Het inwendige Middel werd zamengesteld uit eene Dragma levende Kwik, met slijm van Arabische Gom mengbaar gemaakt, waar bij vier Oncen Lindenbloesem Water en een weinig Suiker gevoegd
wer-

werden. — Men gaf viermalen daags twee Eijerlepels.

Men had zich ook van eene betere Minne voorzien.

Het is zonderling, dat de beginsels van Kwijling, welke niet bedoeld werd, zich reeds den vijfden dag openbaarden. — Des werd dit Middel drie dagen verwisfeld voor eene Once *Manna* daags.

Ik schreef daar na eene zachtere bereiding uit den Kwik voor, namelijk de *Calomel* tot twee, daar na tot drie Grijnen daags, met een weinig Suiker, en om den anderen dag, eene Klijsteer van Kamilbloemen met *Manna*.

Na eenige weken scheidde een stukje van het Zitbeen. — De toevallen werden geweldig: — Eene gedurige Koorts, verzeld van Stuipe, Pijn, enz. verwekte eene gegronde vrees voor het leven van het Kind.

Niet afgeschrikt door deze bedreiging, ging men rustig voort, tevens eene Dragma van het Extract des rooden Koortsbast, met eene Once Kaneelwaters, dagelijks toedienende, terwijl de Verzwearing toen, tweemaal daags, met rooden Wijn en Tinctuur van Mijrrhe gezuiverd werd.

De Toevallen verminderden; — de Kragten namen toe; — de Verzwearing werd zuiver, en kreeg eenen vlakken grond. — De Ontstekingen van de, nu meer verzachte, Gezwellen verdweenen.

Na dat deze behandeling vier Maanden geduurd had, was de beterschap zoo aanmerkelijk, dat ik begreep, het gebruik van den Kwik te moeten matigen. — Dit geschiedde, en, na nog vijf weken, was het Meisje in dien toestand, als Kinderen, welken de zuivere Engelsche Ziekte hebben, waar van zij ook gelukkig gered werd.

Vierde Waarneming.

Ik heb twee gevallen van dit soort gezien, waarin de Smet eene rol speelde van dien nadruk, dat de Kwik, op de straks gezegde manier, niets afdeed, maar alwaar de ganschelijke verandering en vernieuwing der Vochten met behulp der Kwijling, volstrekt noodzakelijk was.

Een dezer Kinderen was het slachtoffer dezer Venerieke Engelsche Ziekte. — Het andere werd gered, met verlies der Neusbeentjes en een klein gedeelte der Verhemeltebeenderen.

§ C L.

Uit deze Waarnemingen trekken wij deze gevolgen:

Voor eerst; — Zij bevestigen ten overvloede, het geen ik met dezelve bedoelde.

Ten

Ten tweeden; — Zij toonen, dat, hoe gewigtig en gevaarlijk de Toevallen van de Venusfmet, bij de Engelsche Ziekte, zijn mogen, deze Smet echter niet, als de Naaste Oorzaak dier Ziekte, kan worden aangemerkt. — De Kwik is onbestand ter Genezing van de zuivere Engelsche Ziekte. — De Venerieke natuur der Vochten, kan zonder Kwik, niet genezen worden.

Ten derden; — De afzonderlijke behandeling van die Smetstofte heeft mij altijd beter voldaan, dan derzelver vermenging met de Middelen tegen de Engelsche Ziekte.

Ten vierden; — Schoon ik, ten gemakke van onkundigen, de gevallen slechts duidelijk geschetst heb, vertrouw ik echter, den meer kundigen met dezelve geenen ondiensnt te hebben gedaan.

Ten vijfden; — Mislukte proeven heb ik verzwegen. — Men leert al doende, en dan verzwijgt men liefst zijne voormalige onkunde.

Ten zesden; — Mag ik, andermaal, uit de Waarnemingen, eenen algemeenen regel ontleenen? — Het Mes, en bijtende Middelen, zijn altijd schadelijk bij de Gezwellen, zoo wel van de zuivere als vermengde Engelsche Ziekte. — De opening te doen is geen kunst, maar dezelve te sluiten, ongemeen moeilijk.

§ C L I.

Het *vierde* en laatste onderwerp van dit Hoofdstuk en van deze Verhandeling moet de *beste Geneeswijze van de Gevolgen* der Engelsche Ziekte bevatten. (XCVII. n. 4.)

Velen der Gevolgen, welken in het zesde Hoofdstuk beschreven zijn, behooren nu niet verhandelt te worden. — De Geneeswijze van sommigen is bevat onder die der Toevallen, zoo dat, wanneer die Toevallen overblijven, als dan hunne Geneeswijze bekend zij.

De natuur der zaak vereischt ook, dat ik van *geene* andere gevolgen spreek, dan van zulken, welke de *eigenlijke* overblijfsels zijn van eene onvermengde Engelsche Ziekte. — Onder deze behoort eene algemeene zwakheid des Ligchaams, als mede eene bijzondere zwakheid van de Ingewanden des Hoofds, der Borst, en van den Buik; — Doch ook hier van is reeds genoeg gezegd.

Indien ik mij niet bedrieg, geloof ik, thans alleen het oog te moeten slaan op de aanwijzing der Geneezing van de *Misvorming der Beenderen* en *zoodanige Gevolgen*, welken daar uit ontstaan.

In zoo verre wij thans daar over handelen moeten, zullen deze *vier onderscheidingen* noodzakelijk zijn.

Vier

Voor eerst: — Wij zullen den aandacht bepalen op de zijdelingsche en voor- of achterwaardsche scheefte van de Borst.

Ten tweeden: — Op de afwijking der Lendenwervelen buiten de natuurlijke richting.

Ten derden: — Op de ziekelijken staat van de Geleding der Knie.

Ten vierden: — Op den schuinschen groei van de Dije- Scheen- Kuit- en andere Beenderen, als een gevolg van gebrek eener behoorlijke voeding.

Ik zwijg, met opzet, van niets beduidende Beenachtige Uitwasfchen; als ook van onherstelbare onvoltooiingen van sommige Beenderen, die men zich moet getroosten, tot de Natuur haar werk verbeterd.

Begrip echter niet, dat ik de mogelijkheid, om de Gevolgen, waar van ik spreken zal, altijd te genezen, beweeën wil. — De dagelijksche ervaring leert het tegendeel, gelijk aanstonds blijken zal.

S C L I I.

Betreffende de *Uitzetting van de Borst.* — Welke richting het Borstbeen, de Ribben en Wervelen na de Engelsche Ziekte behouden hebben, zal 'er zelden iets aan te doen zijn. — De meestgeroemde Werktuigen stelden ons te leur.

Is evenwel het Lijderje zeer jong, maar zwak,

en de Uitzetting der Wervelen, of Schouderbladen, niet al te sterk, dan zullen de *Kina* en Staal-middelen nuttig kunnen zijn, terwijl behoorlijk zaamgestelde Werktuigen, den verderen misgroei zullen stuiten, en den reeds aanwezigen herstellen.

Ik zal dit bevestigen: — Een Meisje van vijf jaren, had, na de Engelsche Ziekte, eene geringe Uitzetting der twee bovenste Wervelen en van eenige der Rugwervelen overgehouden. — Men had met veel kosten, verscheiden Werktuigen, van allerwegen aangebragt, nutteloos bevonden.

Een kundig *Mechanist* vervaardigde, volgens mijn voorschrift, met noodige verandering, het werktuig van den Heer VACHER (*Mem. de l'Academ. de Chirurgie* Tom IV. tegen over bladzijde 605.)

Wij hadden veel moeite, om ons oogmerk te bereiken, doch de uitslag beloonde dezelve, doordien de gedreigde wanstalte volkomen belet werd, en deze jonge schoonheid regt van gestalte en wel gedaan is.

Ik heb even dit Werktuig, geschikt naar de omstandigheden, in verscheiden gevallen van dezen aart, heilzaam bevonden.

Het zal meest aankomen op de handigheid en het beleid van den Maker. — Een gewoon Werkman bedroefde ons vaak, door eeuwige mislukkingen. —

gen. — Men vervoegde zich daarom bij eenen bedreven Kunstenaar. — Maar kan dit de gemeene Man bekostigen? — Dergelijke Kunstenaars zijn duur. — Ik herinner mij thans, met eene genoeglijke aandoening, de liefdadigheid eener brave, welke, ten nutte van een behoefstig Kind, zich, op het eerste aanzoek, gereed toonde, om dit Werktuig, voor eigen rekening, te doen vervaardigen. — De goede uitslag beloonde die liefde.

Men moet vooral zorgen, dat het Ligchaam zelfs nergens ten steunpunt strekke, maar dat het Werktuig de drukking over al in zich zelve hebbe, of de hinder zal voor het Kind onverdraaglijk zijn.

§ C L I I I.

De *Afwijking en Zamengroeiing der Lendenwervelen*, welken somtijds op de Engelsche Ziekte volgen, zijn doorgaans ongeneeslijk. — Ik heb onlangs een ellendig Kind gezien, het welk, door eene binnenwaardsche Uitzetting van drie dezer Wervelen, lendenlam werd, en, in weerwil van alle poging, aan de gevolgen van een geprangd Ruggenmerg stierf.

Men moet derhalven, om nuttig te zijn, zich spoedig van goeden raad bedienen. — Zoo dra de eerste beginsels van dergelijke Afwijkingen bespeurd

worden, wanneer het Kind meestal zwak is, heeft men van de Kina, het Staal en de koude Baden iets goeds te wagten, terwijl alle bewegingen, als tillen, trekken, schudden, waar door het gebrek zou verergeren, vermijd worden.

Versterkende Wrijvingen kunnen al mede nuttig zijn.

Onder dergelijke voorzorgen, zou een wel ingericht Keurslijf de verdere misvorming kunnen beletten. — Ik zou, had ik geen reden, om mij te verbergen, eenen Man kunnen aanprijzen, die, schoon hij weinig gezocht wordt, onder dit soort van Kunstwerkers den eersten rang verdient. — Ik zie dagelijks twee jonge Juffrouwen tierig groeijen, en hoe langer hoe gewisfer, van dit soort van gebrek ontheft worden, hoewel het zelve vrij zichtbaar was. — Dit zijn zij beiden aan den zoo even bedoelden Man verplicht. — Hij zorgt altijd, dat de steunpunten van het Werktuig eene zoodanige tegenstandige drukking maken, dat het ligchaam, ten allen tijde, eene onbelemmerde beweging kan doen, als mede, dat het Werktuig, zonder kosten van belang, in eene gelijke reden met den groei, kan worden verruimd en verlengd.

§ C L I V.

Het derde, waar voor men te zorgen heeft, is de geleiding der Knie.

De gedachten, hier omtrent, verschillen vrij sterk. — Dees kiest te wachten, wat de Natuur zal verrichten; — die neemt Wrijvingen en Windsels te baat; — een ander brengt die deelen, op de eene of andere wijze, in bedwang.

Eene algemeene regel kan hier ook niet gelden. — De bijzondere omstandigheden moeten de keus bepalen.

Is de Engelsche Ziekte hersteld, de Afwijking van weinig belang, en het Kind niet zwaar of wild, dan zullen koude Baden en verwarmende en versterkende Wrijvingen nuttig zijn. — Is integendeel de Afwijking zoo aanmerkelijk, dat de Knieschijven, gelijk veeltijds gebeurt, dreigen uit hunne plaats te wijken, dan moet de Natuur geholpen worden. — Dit geschiedt best door behulp van wel toegerichte Laarsjes, die door middel van een Keurslijf, het gansche ligchaam ondersteunen, en, zonder de Knieën te drukken, de verdere Afwijking voorkomen.

Deze toefstel is te moeilijk tot de juiste volkomenheid te brengen, om den Maker zijne mislukkingen kwalijk te duiden. — Men verbeter zoolang, tot men slaagt. — Ik zag de noodzakelijkheid

deid van dit geduld nog zeer onlangs, bij een Dochtertje in een voornaam huis; doch wij bereikten eindelijk zoo gelukkig ons oogmerk, dat het Kind nu onbelemmerd gaat, doet wat het wil, van maand tot maand verbeterd, en volkomen herstellen zal.

Soortgelijke gevallen zijn al te bekend, om dezelven te vermenigvuldigen. — Ook zijn de Verscheidenheden te meenigvuldig, om over dezelven uitte wijden. — Alles ondersteeld oordeel en handigheid aan de zijde des Kunstenaars, en geduld aan den kant van den Lijder.

§ C L V.

Ten vierden: — De langzame en ongeregelde Groei, of bijblijvende Weeke staat van sommige Beenderen, welke zich dikwijls, na de Engelsche Ziekte vertoont, moet vooral onzen aandacht niet ontglippen.

Welke de wezenlijke oorzaak van dit gebrek zij, is in de Hoofdstukken der Oorzaken en Toevallen aangewezen.

De Middelen en Geneeswijze, welken dit treurig gevolg kunnen herstellen, moeten het vermogen bezitten, om het gemis, of de ongenoegzaamheid van de Aardächtige, of Tartarische deelen des Bloeds, welken der beenstoffe stevigheid en wasdom geven,

te

te herstellen of te vermeerderen: — Ook moeten zij medewerken, om deze voedingstofte naar de Zieke deelen te bepalen.

Ten aanzien der wijze van gebruik, verdeelen wij deze Middelen, in *Inwendige* en *Uitwendige*.

§ C L V I.

De *Inwendige* zijn de Koortsbast of *Kina*, het *Staal* en de *Meekrap*.

Van de twee eerste is genoeg gezegd, zoo dat wij, nopens dezelve, alleen herinneren, dat de gift, naar mate des ouderdoms en de meerdere lichaamsbeweging, moet vergroot worden.

De *Meekrap* behoort eigenlijk en voornamelijk hier ter plaatse nader aangeprezen te worden. —

Door verscheiden Waarnemingen gesterkt, meen ik in staat en bevoegd te zijn, om te kunnen en te mogen verzekeren, dat het Afkooksel en het Poeder van dezen Wortel een eigenaartig vermogen bezit, om tot in de Zelfstandigheid van het Gebeente te dringen, en deszelfs Vezelen te versterken.

De meergemelde OETINGER heeft deze eigenschap getracht te verklaren, doch, naar mijn inzien, is die Man guller met zijne onderstellingen, dan bondig in zijne bewijsgronden geweest. — Doch, waar toe dienen redenkundige verklaringen, wanneer
de

de ondervinding spreekt? — Indien wij verzekerd zijn, dat wij, door den Kwik, eene Kwijling, en daar door de Genezing van de Venusfmet zullen te weeg brengen, dan zal het onderzoek, hoe dit geschiedt, weinig voordeel doen.

Eene kleine geschiedkundige uitwijding over den Meekrap, in dit geval houde men mij ten goede.

De kundige LEVRET viel, op eene zonderlinge wijze, in het denkbeeld, om de Engelsche Ziekte, door den Meekrap volkomen te genezen, ten minsten dit te beproeven. — De beroemde BOHMER had op het voetspoor van anderen, in den jare 1751, proefondervindelijk bewezen, dat de kleur van het Afkookfel dezes Wortels dringt tot in de zelfstandigheid der Beenderen van zulke Dieren, wien het zelve gegeven was: een gevoelen, het welk Hij, het volgende jaar, met nadruk tegen DU HAMEL staande hield. — Dit verwekte een verschil tuschen de Heeren FOUGEROUS, den *Baron von HALLER*, en BORDENAVE, het welk den tweestrijd van BÖHMER en DU HAMEL meer licht bijzette en nader bepaalde, gelijk uit de *Memoir. de L'Academie Roij. des Sciences* van 1760 overvloedig blijkt.

Hier van namen sommigen de gelegenheid, om eene nieuwe verklaring van de wijze der Beenwording te ontleenen, het geen klaar te vinden is in
de

de strijdverhandelingen van RUDIGER, in 1750, en van BOSSIER, in 1755, beiden te *Leipzig* verdedigd.

Dit gaf aanleiding om den Meekrap, naauwkeuriger dan ooit, te beschrijven. — Wij houden echter de teekening en verklaring van den Heer SCHAEFER voor de beste. — Zie zijne *Erleichterte Krauterwissenschaft*, te *Regensburg* in 1759, gedrukt.

De proeven van LEVRET en van den toenmaligen Amsterdamschen Geneesheer SCHLOSSER werden (immers volgens mijne aantekeningen) hier te lande, door J. E. ROSNER, in zijne Inwijdingrede *de Latte* enz., in het jaar 1756, te *Leiden* allereerst met bondige Praktikale bewijzen bekrachtigd.

De Heer L. J. B. COSNIER, gaf, daar na, te *Parijs*, in 1758, eene Redenvoering in het licht, opzettelijk dienende ter bevestiging van het nut des Meekraps in de Engelsche Ziekte, welke Naaste Oorzaak hij aan eene Zuure scherpte toeschrijft. — ROSEN, STEINMEIJER, en meenigvuldige anderen na Hem, bedienden zich van de Fransche proefnemingen, om het nut dezes Wortels, in dit geval, te verheffen.

Men verschilt echter tot nog toe (gelijk ik reeds gezegd heb) over de innerlijke bestanddeelen van den Meekrap, door welken zij de vermurwde Beend-
deren

deren verhard. — Sommigen zochten dezelve in een fijn Zuur van eenen bijzonderen aart, en schreven daar aan de roodheid der Beenderen toe. — Anderen, gelijk OETINGER in zijn geschrift te *Tubingen*, den 22 December 1769 verdedigd, schreven dit toe aan het *Phlogiston*. — Wij, voor ons, verwerpen alle gisfingen in de beoeffening der Geneeskundige Praktijk; — echter meenen wij, best te kunnen verdedigen, dat de Meekrap de weeke Beenderen, door den Aard- of Wijnsteenachtige stoffe verhardt. — Wat hier van zij, aan de zekerheid der zaake is geen twijfel, want, uit verscheiden Proefnemingen, heeft men besloten, dat niet alleen de beginnende, maar zelfs verre gevorderde Weekheid van het Gebeente, door de Engelsche Ziekte nagelaten, door den Meekrap is gestuit en hersteld.

Men vergenoeg zich met deze *Aanmerkingen*.

1. De Meekrap komt, in deze Ziekte, alleen te pas, wanneer men verneemt, dat het Gebeente, na de Engelsche Ziekte, de behoorlijke vastheid niet verkrijgt. — Zoo lang de Zuure kwaadsappigheid bestond, zag ik van dit Middel geen voordeel, ten zij het zelve met anderen, welken op zich zelve genoegzaam waren, vereenigd werd.

2. Men moet met dit Middel lang aanhouden, en slaagt men niet spoedig genoeg, niet wanhoopen. —

Bij

Bij eenigen heeft men vele maanden noodig, tot het geen bij anderen, in weinige weken, verricht werd.

3. De beste wijze van toebereiding is het Afkookfel van eene Once Meekrapwortel op twaalf Oncen Waters, zoo dat agt Oncen overblijven. — Dit volstaat voor twee dagen bij een Lijdertje van drie of vier jaren.

Veeltijds verveelt het gebruik van het zelfde Middeldoor den tijd. — Men verwisfele dan dit voor eene halve Dragma of twee Scrupels van het Poeder, het welk dagelijksch, in kleine giften, toegedient wordt.

4. Zachtken's Zamentrekkende bijvoegfels schijnen het Beenversterkende vermogen des Meekraps te vermeerderen. — Hunne hoeveelheid moet echter, uit vreeze van eene hinderlijke hardlijvigheid te zullen veroorzaken, niet te groot zijn: — Eene Dragma *Cort. Tamarisci*, met den Wortel gekookt, of eene Dragma *Conferf* van roode Roozen, of drie Dragmen *Syrup. Myrtinus* bij het doorzigsfel, zijn voldoende.

Een Grijn Poeder van *Cachou* bij elke gift des Meekraps-poeders, of vier Grijnen Aluin daags, schikken best.

5. Indien de Stoelgang traag wordt, bedient men zich van eene Klijsteer, uit gesmolten Manna met een weinig Zout.

6. Wanneer uit de vermeerderde stevigheid van het Gebeente blijkt, dat het Middel aan het oogmerk voldoet, dan gaat men op dezelfde wijze, eenige weken voort, waar na men, bij langzame treden, de hoeveelheid van deszelfs giften vermindert, tot de volkomen Geneezing.

§ C L V I I.

De *Uitwendige Middelen*, welken de herstelling verhaasten, zijn:

1. Koude Baden. — Ten minsten tweemaal daags moet de Lijder tot den hals toe, in een Kuip met Koud Water gedompeld, en terstond weder uitgehaald worden.

2. Telkens, na dat dit (n. 1.) geschied is, moeten de Rug, de Armen en Dijen, als mede de Buik met doordringende Geesten, Specerijachtige, Oliën of Balfems (waar toe echter de Kamfer en Kamferbrandewijn niet behooren) gewreeven worden.

3. De Windels, Harnasfen of andere Werktuigen van dien aart, zijn somtijds onöntbeerlijk; — doch, om dat zij niet meer kwaads dan goeds zouden doen, moet men vooral zorgen, dat eene kundige en bedreven hand in de zamenstelling en toediening derzelve, gebezigd worde.

Het

Het geene verder te doen is, zij aan het vermogen der Natuur verbleven.

§ C L V I I I.

De uitvoerigheid van dit Antwoord zal verschoning bij zulke Lezers vinden, welke niet kunnen ontkennen, dat het Voorstel uit veele gewichtige Vragen bestaat, en dat het werk eigenlijk dienen moest tot onderrichting van menschen, die in de Geneeskunde onbedreeven zijn.

Heb ik hierin het doel getroffen, dan zal het denkbeeld van mijnen plicht naar vermogen te hebben betragt, de begeerde bezolding van mijnen arbeid zijn. Want

*Ware Roem is roem bij God ,
Maar niet bij Menschen Kinderen.*

G E L L E R T.

E I N D E.



VERHANDELINGEN
VAN HET
PROVINCIAAL
UTRECHTSCH
GENOOTSCHAP

VAN
KUNSTEN
EN
WETENSCHAPPEN.
ZEVENDE DEELS

TWEEDE STUK.



Te UTRECHT,
Bij S. DE WAAL, Sz.
Drukker van het Provinciaal Genootschap.
MDCCLXXXIV.



WAARDE LANDGENOTEN!

TOEN wij zo kort naa elkander het V^{de} en VI^{de} Deel der Verhandelingen van ons Genootschap uitgaven, dagten wij weinig, dat het zoo lang zoude aanlopen, eer dezen van een VII^{de} Deel zouden gevolgd worden; en het heeft ons moeite gedaan, dat de Uitgave daar van zo lange gedraald heeft.

Wat daar de reden van zij, zal U ten vol-
len blijken, als wij U van den Inhoud van
dit Deel verslag gedaan, en de omstandig-
heden, die tot de vertraging der Uitgave
gelegenheid gaven, kortelijk opgegeven zul-
len hebben.

Ziet daar het geen wij meenen, U daar van
te moeten mededeelen.

Na dat de Prijs-Vragen over den *Kinkhoest* en over het *Phlogiston* bij de Algemeene Vergadering des Genootschaps van het Jaar 1788. bekroond, en de daartoe behorende Verhandelingen door ons in de volgende Jaren waren uitgegeven, verliepen er drie Jaren, zonder dat de opgegevene Vragen den uitgelooften Prijs wegdroegen, en de eerste Vraag, waar op ons Genootschap voldoende Antwoorden kreeg, was die, welke in het Jaar 1790. opgegeven, en in het Jaar 1792. bekroond werd: deeze Vraag, die over de Engelische Ziekte ging, luidt dus.

„ Welke is de aart van de Rachitis of zo
„ genaamde Engelsche Ziekte? Welke zijn
„ de Redenen, dat men de eerste beginselen
„ zelden na het derde Levensjaar der Kin-
„ deren bespeurt? Welke zijn hare Kenmer-
„ ken? Welke is hare Voorzegging? Kan
„ men ze door eenige Middelen voorkomen!

Zo



„ Zo Ja , door welken ? Welke zijn de beste
„ Middelen tot hare Genezing ? ”

Op deze Vraag kwamen er ten bepaalden
tijd , verscheide Antwoorden in , en daar
onder waren er twee , die vooral in aanmer-
king kwamen ; de eene , in het Nederduitsch
geschreven , had ten Zinspreuk :

„ *Ware Roem is roem bij God , maar niet*
„ *bij Menschen Kinderen ;*

G E L L E R T .

de andere , in het Latijn geschreven , had
ten Bijscript :

„ *Naturam Sensus , Ratione fulti , revelant*

Deze beide Verhandelingen hadden elk hare
bijzondere verdiensten : de eerste , die alle
de Deelen der Vraag volledig beantwoorde ,
gaf vooral eene zeer naauwkeurige en om-

standige Geneeswijze der Ziekte op , die , (en dit gaf haar eene bijzondere waardij,) door eene menigte van eigene Waarneemingen van den Schrijver opgehelderd en bevestigd was.

De Latijnsche was min voldoende, daar ze de punten der Vraag, gaande over de Kenmerken en over de Voorzegging der Ziekte, onaangeroerd liet, en den Lezer verzond tot het geen daar over reeds door anderen; in het bijzonder door den Baron van ZWIETEN in zijne *Commentarius* over de *Aphorismi* van BOERHAVE, geschreven was, maar behalven datze in een beknopt Voorstel alles, wat tot eene gepaste Geneezing der Ziekte behoort, en het geen door andere beproefd is, zeer naauwkeurig opgeeft, munte deeze bijzonder uit, door een aantal van zeer keurige Waarneemingen, door den Schrijver in de Lijken der Kinderen, die aan de Engelsche Ziekte gestorven waren, gedaan, die de gewrochten dier Ziekte, vooral in de Beenderen,



ren, die in dezelve vooral zijn aangedaan, en die tot dus verre nog nooit behoorlijk nagegaan en genoegzaam onbekend waren, in een helder daglicht stelden.

Dit gaf gelegenheid, dat de Leden, die in het bijzonder tot de beoordeeling dezer Verhandelingen verzocht waren geweest, in hun oordeel verschilden, en maakte de Uitspraak over Dezelven zeer moeielijk; wij begrepen datze elk hare bijzondere waarde hadden, en datze beiden verdienden bekroond te worden, doch aan welke dezer twee den voorrang te geven, was niet zo ligt te bepalen. Na dit meermalen overwogen te hebben, hielden de meesten onzer er toe over, om de Uitspraak aan het Lot overtegeven en wij besloten, behalven den gewonen Eereprijs van 30 Ducaten, of van eene Gouden Medaille ter zelve waarde, voor die, aan welke het Lot den Prijs toekende; eene

Zilvere Medaille als een Accesfit te geven
aan de andere.

Overeenkomstig dit besluit, werd in de
Algemeene Vergadering des Jaars 1792. over
deze twee Verhandelingen het Lot getrok-
ken, en dit besliste het ten voordeele der
Nederduitsche, wier Bijfschrift was:

„ *Ware Roem is roem bij God, maar niet*
„ *bij Menschen Kinderen;*

G E L L E R T.

Deze kreeg dus de gewone Eere-prijs,
terwijl de Latijnsche, wier Bijfschrift was

Naturam Sensus, Ratione fulti, revelant.

het Accesfit bekwam; en Bij het openen der
bijgevoegde Billetten bleek het, dat de eerste
ten Schrijver had

Den



Den H^r. JOHANNES VEIRAC, Med. Doct. te
Rotterdam, Oud Schepen van Schieland.

die in het Jaar 1788. nogmaals een Prijs bij ons
Genootschap voor zijne fraaije Verhandeling
over den *Kinkhoest*, behaald had: — en dat
de Latijnsche geschreven was door den Heer

‡ J. F. ACKERMANN, Med. Doct. Medede-
lid der Medicijnsche Faculteit te Mentz.

Naar gewoonte, werd de Verhandeling van
den Heer VEIRAC, zo haast, mogelijk, ter
Drukpers gegeven, en deze hebben wij, om
aan Uw verlangen te voldoen, reeds voor
eenigen tijd afzonderlijk als een 1^{ste} Stuk van
het VII^{de} Deel onzer Verhandelingen uitge-
ven, gezind, om dezelfde spoed ter Uitgave
der Verhandeling van den Heer ACKERMANN
aantewenden; maar hier in werden wij door
meer dan één hinderpaal belet: — De hache-
lijke omstandigheden, waarin ons Vaderland in

Het begin van het naastafgelopen Jaar ver-
keerde, maakte, dat de Drukpers een gerui-
men tijd stil stond, en met reden draalde
onze Drukker, om een Werk van dezen aart
voorttezetten, liefst verkiezende, de gevol-
gen en den uitkomst daar van eenigen tijd
uittezien: — Maar vooral werd de Uitgave
dezer Verhandeling vervolgens vertraagd
door de bijzondere omstandigheden van den
Heer ACKERMANN zelfs, die, (na dat wij
Hem op zijn verzoek hadden toegestaan, om
bij wijze van Aantekeningen eenige Bijvoeg-
felen bij zijne Verhandeling te mogen bij-
doen, en Hem ten dien einde een Affchrift
daar van hadden toegezonden,) inmiddels
door de treurige gevolgen der belegering van
Mentz, in welke Stad Hij de Geneeskunst
oeffende, en waar in Hij gedurende het be-
leg was agtergebleven, zig buiten staat vond
zijn voorneemen te volvoeren, en bij de
overgang der Stad, daar uitgeweken, onze
navorschingen ter ontdekking van zijn Ver-
blij-

blijfplaats te loor stelde, en ons zeer langen tijd daar omtrent onzeker liet. — Om U niet langer op te houden, namen wij eindelijk het besluit, om de Verhandeling, zo als wij ze ontfangen hadden, ter Drukpers te geven en uittegeven, en zo bieden wij U dezelve tegenswoordig aan, in vertrouwen, dat de gewigtige inhoud van dit Deel het lang Uitsfel der Uitgave rijkelijk vergoeden zal, en verzekerd, dat ge uit dit Berigt genoegzaam zien zult, dat het ten eenemaal buiten onze schuld is, dat dit Deel nu eerst uitkomt.

Wij voegen hier nu nog maar met weinigen bij het voornaamste, dat 'er zedert het Jaar 1788. tot het Jaar 1792. bij ons Genootschap is voorgevallen, en voor U van eenig belang is.

De gewone Prijsvraag voor het Jaar 1789. was die over de Regtspleging in het Sticht van Utrecht in vroegere tijden; ze luidde dus:

„ Hoe-

„ Hoe en met welke plegtigheden wierdt
„ het Hooge Landgerigt des Bisfchops ge-
„ houden in het *Over* en *Neder-Sticht* van
„ *Utrecht*? Was het houden van het zelve aan
„ zekere tijden of plaatsfen verbonden, of
„ stond zulks willekeurig aan den Bisfchop?
„ Wie moesten daar toe verſchreven wor-
„ den? Welke zaken en gedingen behoor-
„ den, ter eerſter instantie, voor dit hoogſte
„ Gerigt gebragt te worden, en kon men
„ van de Vonnisfen van alle andere Regt-
„ banken beroep doen? Zo niet; dan bepaal-
„ delijk, van welke Regtbanken, en van
„ welke Gedingen, beroep viel op deze Hoo-
„ ge Bank! eindelijk, of dit Landgerigt des
„ Bisfchops in 't *Neder-Sticht* het zelfde is
„ geweest, als de Hooge Klaringe des Bis-
„ fchops in het *Over-Sticht*, of *Over-Tſfel*?
„ en hebben die Steden in het *Sticht*, zo
„ *Over* als *Neder-Sticht*, of zommigen der-
„ zelve, onder de Bisfchoppen, eenige
„ Regtelijke Judicature gehad, onderſchei-
„ den



„ den van de Judicature , welke de Stedelijke
„ Regtbanken van Schout en Schepenen uit
„ naam der Land - Vorsten uitoeffenen? Zo
„ ja ; van waar is die Judicature den Steden
„ aangekomen ; en hoe verre heeft zij zig
„ uitgestrekt?”

Deze werd niet beantwoord, en besloten,
omze nogmaals met eene dubbele Prijs voor-
testellen om beantwoord te worden in het
Jaar 1792.

Insgelijks bleef de Vraag over het *Vuur*
en *Licht*, die reeds voor de tweedemaal was
opgegeven, onbeantwoord, en men besloot
hierom, deze Vraag te laten varen.

Ook kwanen er geen Verhandelingen in
over het een of ander onderwerp der *Land-
meetkunde*, waar voor eene Gouden Medaille
van 20 Ducaten was uitgelooft.

In



In het volgende Jaar 1790. bleef de gewone Prijs-Vraag over den *Aart en de Uitwerkselen van het Dollehonds Gif*, en over de *geschikste Middelen omze voor te komen en weg te nemen*, onbeantwoord, en werd, ten tweedemaal met eene Dubbele Prijs, opgegeven tegens het Jaar 1793.

Ook werd de Prijs-Vraag over de *Vorderingen der latere Wijsgeeren in de Zielkunde boven de Ouden*, niet bekroond, en men liet deze, als reeds tot tweemaal en opgegeven, nu varen.

Men kreeg ook geene Verhandelingen over de *Staatkundige Historie van ons Vaderland*, waar aan dat Jaar eene Medaille van 20 Ducaten was aangeboden.

In het Jaar 1791. bleef de opgegevene Prijs-Vraag „ *Over de Nieuwe ontdekkingen* „ *omtrent de Vasa Lymphatica*, en over het voor- „ *deel, dat wij daar uit trekken*, zo omtrent „ *de*



„ de beschouwing der *Huishouding van 's Menschen Lighaam, als omtrent de Kennis en de Genezing der Ziekten*” onbeantwoord, en werd daarom nog eens, met eene Dubbele Prijs voorgesteld, tegens het Jaar 1793.

Ook kwamen er geen Verhandelingen in over *Natuurkundige Onderwerpen*, waar aan eene Medaille van 20 Ducaten was uitgelooft.

In het Jaar 1792. werd de gewoone Prijs-Vraag „ over den *Aart en Eigenschappen der Engelsche Ziekte; over haare Kenmerken, Toevallen en Gevolgen, Voorzegging, en gepaste Middelen tot voorkoming en genezing,*” op de bovengemelde wijze bekroond, en de twee Verhandelingen, die den Prijs wégdroegen, maken den inhoud van dit Deel uit.

. Mogelijk zult ge verwagten, agter deze Voorreden een vervolg te vinden van de Naamlijst der Leden des Genootschaps, maar
daar

daar dezelve bij verloop van tijd zo door het overlijden van een aantal van Leden, als anderzints, aanmerkelijke veranderingen ondergaan heeft; willen wij liever bij het uitgeven van het VIII^{te} Deel, dat waarschijnlijk binnen kort staat te volgen, een geheele Nieuwe Lijst daar van geven.

Intusfchen wenschen wij U in allen opzichte Zegen en Voorfpoed, met bede, dat het U en ons gegund worde, om t' zamen ter bevordering van het geluk onzer medemenschen in rust te blijven medewerken.

De Directeuren van het Provinciaal Utrechts Genootschaps van Kunsten en Wetenschappen.

En uit derzelver Naam.

P. LUCHTMANS,
Secretaris.

UTRECHT
den 8 October
1794.

COMMENTATIO MEDICA
D E
RACHITIDE,

QUA RESPONDETUR AD QUÆSTIONEM,
A SOCIETATE ARTIUM ET SCIENTIARUM,
QUÆ TRAJECTI AD RHENUM EST,

PROPOSITAM.

*Quenam est Natura et Indoles Rachitidis? Quenam
sunt Causæ, quæ faciunt, ut prima illius Initia ra-
ro post tertium ætatis annum conspiciantur? Quenam
sunt hujus morbi Signa? Quenam est Illius Pro-
gnosis? An dantur Remedia, quibus potest præcaveri?
et si quæ dantur, Quenam? Quenam præ cæteris,
ad curandum hunc morbum conveniunt Remedia?*

CONSCRIPTA

A

VIRO DOCTISSIMO

J. F. ACKERMANN,

M. D. FACULTATIS MEDICÆ MOGUNTINÆ

ADSESSORE,

*Cui Ao. MDCCXCII, a Societate assignatum
fuit Præmium Nummi Argentei.*

S Y M B O L U M
NATURAM SENSUS, FULTI RATIONE,
REVELANT.

EPISTOLA

AD SCIENTIARUM ATQUE ARTIUM
SOCIETATEM, QUÆ TRAJECTI
AD RHENUM EST.

QUÆSTIO, quam Orbi Literato resolvendam proponitis, Viri Illustrissimi! tanti profectò momenti est, ut dubitem, an in vastissimo Scientiæ Medicæ ambitu materies inveniatur, quæ tantum ad stabiliendam generis humani felicitatem conferat.

Vultis, ut Rachitidis Natura rite determinetur; ut Causæ indagentur, quæ Rachitidem producant; ut Signa indicentur, quæ huic morbo propria sint; ut, qui a morbo relinquitur, corporis Habitus describitur; ut, cur infantes, superato tertio ætatis anno, vix hoc morbo afficiantur, reddatur ratio; ut, aut, et qua ratione Rachitis præcaveri possit, demonstretur; ut denique recta Medendi Methodus statuatur.

His quæsitis ut pro viribus satisfacerem, ita circa gravissimum hocce negotium versatus sum, ut primo, quæ sensibus detegi apud Rachiticos possunt, accurate retulerim; deïñ subjunxerim ea, quæ ex Observatis, Ratione et Judicio, assequi poteram.

Scriptum in tres Sectiones dispescui: *primâ* Rachitidis Indoles explicatur; *alterâ* morbi Causæ traduntur; *tertiâ* Medendi Ratio exponitur.

Ad exponendam Rachitidis Naturam (præmissis iis, quæ in ægrotis infantibus, et in dissectis ex hoc morbo demortuorum cadaveribus observantur, phænomenis,) Physiologica quoque Nutritionis principia, quæ ultimo sæculi lustro Anatomicorum industriâ detecta sunt, explicare necessarium duxi, ut inde, certâ demonstrandi methodo, morbi Indoles erui possit.

Alterâ Sectione, evolutis morbi Causis, illum, qui à Rachitide superest, corporis Habitum descripsi, et, cur Rachitis, vix unquam triennem infantem infestet, rationem subjunxi.

Tertiâ denique Sectio Therapeutica modum, quo Rachitis præcaveri possit, et simplicissimam simul, atque tutissimam Medendi Methodum complectitur.

Vestrum est, Viri Illustrissimi! judicare, an his meis lucubrationibus æquæ petitioni Vestræ satisfiat. Valete.

S E C T I O I.

RACHITIDIS INDOLES.

QUEMADMODUM in omnibus Corporis Humani affectibus ipsam morbi indolem cognoscere, et perspicere penitus, difficile est, aut plane *αδύνατον*, nisi earum, quæ in Corpore præter naturam contingunt, mutationum cognitionem assequamur; ita præprimis in explicandâ Rachitidis Naturâ eò dirigenda inquisitio est, cum hic morbus, propterea quod inductis tot tantisque mutationibus se prodât, spem faciat, fore, ut circa ejus Indolem et Causas certa principia statui possint. — Si enim occulta hucusque Medicis fuit plurium morborum Natura; duplicem præsertim ob causam id contigit, et, quod mutationes corporis physicæ vix ullæ sensibus patuerint, et, quod Symptomata generalia a particularibus et characteristicis morbi signis distinguere, difficilior erat negotium; et non raro anceps circa hanc rem judicium versabatur.

C A P U T I.

Infantis Rachitici Habitus.

Morbus, quem describendum sumimus, inter infantiles pertinet, neque enim unquam adultos adori-
tur, licet Authorum complures morbum quemdam
rarissimum, pariter etiam juvenili, et virili ætati
infestum, ob Symptomatum quorundam similitudi-
nem hoc nomine compellarint.

Nunquam congenita Rachitis est, et, ut plurimum
saltem duo, tresve a nativitate menses elabuntur,
antequam certa morbi indicia indaganti Medico inno-
tescant. (1.)

Naturæ congrua mihi videtur morbi divisio in duo
stadia, quorum posterius, observato osium tumore,
et distorsione inchoatur.

Cum causæ occasionales non raro maximam morbi
partem contineant; ex corporis Habitu sani infantis
quam-

(1) Connatam Rachitidem observavit *Sichi*, et *Star-
chius* nonnullos infantes ex utero hunc morbum afferre
asserit. Vid. Trnka de Krzowitz, historia Rachitidis,
pag. 155. Verum hæ, et similes observationes vix fidem
mereantur, cum vel circa morbi indelem hallucinati sint,
vel Rachitis mox post partum accesserit.

quamdam ad suscipiendum morbum capacitatem huiusmodi Medicis raro licet.

Sæpissime infantes sanissimi hoc morbo corripiuntur. Ubi morbus inchoatur, insueti dolore vexatus plangit infans, et vix ejulatus finem imponit. Color Faciei primis mox diebus immutatur, et vel pallet insigniter, vel fordide flavescit; mox Abdomen intumescit et intra exigui temporis spatium mirum in modum expanditur; præcipue autem Hypochondrium dextrum inflatur, et insolitam duritiem ostendit; corpus emaciatur, ita sæpe, ut, si infans antea pinguedinem contraxerat, nunc rugis defœdetur, et seniculi figuram referat; præcipue Extremitates attenuantur, et ita emarcescunt, ut vix ossibus hæere videantur. Noctu fere nunquam somnum capiunt, et dormientes subito magnis clamoribus excitantur; ut plurimum famelici sunt, et licet cibus potusque continuo ingurgitentur, nunquam tamen satiantur; Ructus acidi facili lactis coagulati vomitui junguntur; Alvus fere semper liquida est; fæces ex flavo viridescunt, et partibus heterogeneis componuntur, quarum altera fluida est, altera frustulis minimis, fluido innarantibus, constat; Excrementa acidum odorem spirant; Urina jumentosa excernitur.

Hoc primum morbi stadium certo tempore definiri nequit, cum pro Symptomatum concursu et Causarum vehementiâ citius aut serius terminetur. Au-

getur sæpe fat cito corporis flacciditas et marcor, et summa dein inertia, atque se movendi impotentia accedit; infantes pedibus insistere recusant, et incedentes timidi huc illuc vacillant.

Eodem tempore notatur tumor *Articulorum*, et *Epiphysium* protuberantia, quæ primum ad *Extremitatum* superiorum articulos observari solet, cum *Radii* et *Ulnæ*, qui *Carpum* excipit, articulus in tumorem elevetur; paulo post etiam pedum *Malleoli* inflantur, mox *Costarum* extremitates, quibus cartilaginibus junguntur, in nodos attolluntur, quin et in ipsis *Metatarsi* et *Metacarpi* ossiculis tumida non raro capitula adnotantur.

Ubi eo pertigit mali invalescentis natura; capitis moles augetur, et formam singularem, *Rachitidis* characteristicam, acquirit; *Frons* nimirum, ubi antrorsum in capillos terminatur, ita protruditur, ut reliqua ejus pars oblique versus oculorum orbitas inclinetur; convexa, et rotundata frontis *Forma* in planam abit, et ex utroque latere tubera frontalia parumper elevata conspiciuntur; volumine inerescit *Calvaria*, ita ut inæquales et asymetricæ in parte capitis posteriori protuberantiæ notentur. Hiant *Suturæ*, et locus in vertice, quo ossa nondum perfecta cartilagineæ naturæ membranâ junguntur, ampliatur et diducitur. Hoc incremento insignè capiti pondus accedit, adeo, ut muscoli eidem attollendo et sustinendo impares sint,

et

et vel caput antrorsum propendat, vel in humeros iners dilabatur.

Si res in deterius ruat, et morbi Symptomata invalescant, cerea nunc animadvertitur ossium mollities, quæ a musculis flaccidissimis, quibus vigor pene nullus inest, in varias formas curvantur et distorquentur. Incurvantur primo Extremitates inferiores; Femur antrorsum et extrorsum plerumque inflectitur; Crus flexuram, antrorsum et introrsum directam, ostendit; Humerus gibbum extrorsum vertit; Antibrachii ossa curvaturâ anteriora versus intorquentur.

Thorax a latere comprimitur, et antrorsum in gibbum elevatur, ita, ut pectoris carinati figuram referat, si complanatis lateribus Costæ obliquo ductu versus medium sternum accedant.

Columna Vertebralis modo in hanc, modo in illam partem inflectitur, et progressu temporis, cum corpus, ut partium æquilibrium restituat, voluntario conatu versus contrariam partem inclinetur, duplici flexurâ deformatur.

Regio Iliaca et Hypogastrica unius lateris sæpe protrusæ videntur, cum eadem lateris oppositi collapsæ et quasi vacuæ appareant.

Dentes solito tardius erumpunt, et, si emergunt, exigui sunt et curvati, mox nigrescunt, carie afficiuntur, et exiguo mandendi nisu in frustra disiliunt, excidunt, et sæpe fit, ut aliis non commutentur.

Vocem Rachiticorum raucam, et stridentem (2) et habitū ætatis ratione, multo graviores (3) observamus.

Urina ex albido flava, turbida, et illi jumentorum similis est; paucas post mictum horas odorem penetrantissimum alcali volatilis spargit. (4) Pulsus parvus, debilis, et semper naturali tardior animad vertitur.

Alvus per totum hoc morbi stadium fere semper adstricta est, ita, ut omni biduo, triduove feces liquidæ deponantur. Versus finem morbi accedit Diarrhæa, quā alimenta assumpta, vix immutata, deponuntur. Ubi ad *ἀνάνη* pertingit morbus, lenta Febricula accedit, et Sudores aciduli corpus depascuntur. Macies corporis, (si caput prægrande, et abdomen tumidissimum excipias,) ita increscit, ut cutis solis ossibus superstrata videri possit. Accedunt repetitæ narium, et gingivarum spongiosarum et putrescentium Hæmorrhagiæ. Observantur Aquæ, in cranio et cerebri ventriculis collectæ, indicia, quo pertinet ampliata, et ad lucis radios vix non sensibilis, Pupilla, Sopor comatosus, Paralyti

ex-

(2) *Wepster* System der praktischen Arzneikunst, Tom. 3. pag. 128.

(3) *Rosenstein*, von den Kinder Krankheiten, pag. 579.

(4) *Leidenfrost*, *R. Wilkinghoff*, Dissert. exhibens nonnulla de Rachitide, pag. 16.

**Extremitatum inferiorum ; accedunt corporis totius
Convulsiones, quas mors cito subsequitur.**

C A P U T I I.

Phænomena, in Cadaveribus observata.

Plura secui Rachiticorum corpora, et eas, quæ sectione indagari possunt, status naturalis anomalias studiose rimatus, pro certo affirmare non dubito, morbum corporis humani non esse, qui tot tantasque, ac tam perspicuas mutationes inducat, et quibus rite collatis tanta de morbi naturâ et causis certitudo elucescat, quam hic corporis affectus, quem inquirendum mihi proposui.

Quamquam autem hæc pathologica phænomena enarrans, facile potuisssem eorundem rationem reddere, malui tamen hic solas observationes afferre, et quæ sensus circa organorum vitiatorum structuram detegunt, seorsim describere, ne, cum morbi ipsius indoles hactenus non innotescat, Observationes, iudicio confusas, retulisse videar; et, ut Pathologica, quam ex cadaverum sectionibus refero, historia rationum, quas ad eruendas morbi causas proferam, firma basis esse possit.

At-

Atque, ut ordine procedam, primo, quæ in diversis corporis cavitatibus præter naturam immutata deprehendi, Organa describam.

Referato Abdomine, statim oculo se offerunt Ventriculus, et Intestina, aëre contento ita distenta, ut facili cultello puncturâ cum sibilo erumpat; tenuissimæ apparent Intestinatorum membranæ et albidissimæ, adeo ut vix hinc illinc ampliores vasorum sanguiferorum rami pelluceant, reliquis minoribus vasculis sanguine vacuis. Intestina tenuia; cibus ingestis fere vacua, non raro magnâ Ascaridum lumbricoidum catervâ obsidentur. Intestina crassa alimentis indigestis scatent, et in sacco Coli Cæco non raro vermes plurimi inveniuntur, quorum duos, tresve, in ipsum Vermicularem Processum ingresses, reperi. Valvula Coli arctissime clausa est, neque etiam, Intestinis vi compressis, aër in Rectum intestinum penetrat. Intestinum Rectum collapsum sæpius et flaccidum deprehenditur; et si mucus, et ingesta cruda, hoc Intestino contenta, accuratius examinentur, et aquâ diluantur, non raro vermiculos plurimos, et Ascarides vermiculares et trichocephalos illic nidulari deprehenduntur.

Omentum, omni pingui destitutum, tenuissimum est, et quasi araneam telam refert.

Mesenterium aliquando, præterquam quod adipe plane destituatur, nihil præter naturam immutatum ostendit; sæpe tamen glandulis dilatatis et turgentibus

bus scater, quas semel in tantam molem increvisse con-
spexi, ut pugnorum duorum volumen æquarent.

Lien quandoque compressus et durus, quando-
que ampliatus et spongiosus,prehenditur.

Idem de Pancreate observatur: — hoc viscus
vix præternaturalem structuram monstrat, et in om-
nibus, quæ secui, Cadaveribus, bis tantum justo ma-
jus idem, neque tamen induratum observavi.

Hepar in omnibus Rachiticorum corporibus in stu-
pendam molem excrescit adeo, ut illud sæpius ad
regionem Hypogastricam usque pertigisse viderim;
neque tamen vel exterius lustratum, vel cultro dissec-
rum quidquam, quod structuræ præternaturalis sus-
picionem movisset, ostendit. — Vesiculam Felleam,
interdum omnino vacuam, fere semper fluido mucoso,
albo, vix flavescente, quod neque gustu amaroris
cujusdam indicium prodidit, repletam deprehendi,
nunquam autem, (quod et alii Authores testantur,
(5) Bile naturali plenam Cystidem inveni, sed vel
mucosâ parvâ, vel copiosâ dilutissimâ.

Renes nullo structuræ vitio laborasse inveni, ne-
que Vesicam urinariam; licet eandem semper urinâ
valdè distentam invenerim.

Ca-

(5) Haller Diss. de Rachitide in Collect. Diss. Vindob,
Tom I. pag. 167.

Vogel Prælect. pag. 551.

Cavum Pectoris, rescisis Costarum cartilaginibus, et Sterno remoto, humore seroso, parco tamen, fere semper repletum vidi; Pulmones exigui, vix rubelli, hinc inde collapsi, constricti et indurati deprehenduntur; sæpe vero nullo vitio laborant. Quæ ad Trachæ in Bronchia divisionem occurrunt, Glandulæ lymphaticæ, fere semper turgidæ, et quasi in unum inæquabile corpus conflatæ cernuntur. Quem Mediastinum antèrîus complectitur, Thymus cum in ætate infantili majus volumen habeat, et vitæ decursu magis magisque decreseat, in Rachiticis in molem solito majorem extenditur.

Cum nonnunquam in Rachiticorum cadaveribus Pulmones cum Pleurâ concretos viderim, hoc quidem non morbi effectum, sed vel congenitum, vel aliâ causâ productum vitium esse, hic meminisse juvabit.

Cranio ferrâ diviso, Dura Membrana pertinacius adhæsit; postquam autem non nisi vi quâdam avulsa fuerat, rupta vascula, quæ alias instar punctulorum rubentium hanc membranam obsident, Lymphæ serosæ strîis sanguineis intermixtæ, notabilem copiam effuderunt. — Semotâ Durâ membranâ, Arachnoideæ et Vasculosæ membranæ cellulis serum copiosum pellucidum contentum vidi, quod præsertim gyris cerebri immisum, bullas, et vesiculas, aquâ plenas, referebat. Membrana Vasculosa facillime de cerebri substantiâ detrahitur; ipsa autem cerebri massa, pulvèrè referens, cultro dissecanti cedit. Quod

Quod autem adnotatione dignissimum mihi videtur, quodque a nemine adhuc relatum scio, est, quod in duobus infantibus Rachiticis, in ipsâ molliissimâ Encephali substantiâ, nodos durissimos, qui Scirrhos quasi mentiebantur, repperim; in puellâ trium annorum Rachiticâ Scirrhus talis cerebri in medullâ lobi cerebri anterioris pone nervum Olfactorium delituit; alter in ejusdem cerebri lobo posteriore sinistro pone Ventriculi tricornis cornu posterius notabatur.

In puero vix non bienni, eandem cerebri in nodum durissimum concretionem vidi, qui cerebri fere medium tenebat, et Corpori Striato adiacebat. Hi, quos in binis cadaveribus observavi, cerebrales Scirrhî, si cultro dissecantur, colorem intus cinereum nigricantem ostendunt, et strictâ stipulatâque cellulâ velâ componi videntur.

Cerebri Ventriculi fere semper aquam continent, et Pia Membrana in Plexum Choroïdem collecta, Hydatidibus repleta cernitur.

C A P U T I I I.

Ossium Rachiticorum structura.

Cum Ossa in hoc morbo præcipue afficiantur, complures Medici primariam morbi causam in Ossibus

bus delitescere, sibi persuaferunt; operæ itaque prædium existimavi, si, quâ ratione Osta præter naturam immutentur, et quânam structuram ex Rachitide contrahant, paucis seorsim exponam.

Prima, ac præcipua Osum Rachiticorum anomalia est, quod emolliantur, ut sine diffractione inflecti et incurvari atque cultro, lardi instar, discindi possint. Hæc præternaturalis mollities, et cerea flexibilitas in omnibus corporis humani ossibus adnotatur. Primo cylindrica Extremitatum Osa, et Costarum extrema; Vertebrae deinde spinæ dorsæ, Tarsi idemum et Carpi ossicula emolliri, morbi Symptomata evincunt. Osa Capitis hæc mollitie morbosâ minime exempta sunt. — Est mihi ad manus Os Frontis infantis unius anni, quod ita flexile est; ut digitis, quasi chartæ folium, tractari et sibi involvi possit, eadem ratione Maxilla superior digitis comprimi potest, licet cessante compressione, in formam pristinam elastice resiliat. Maxilla inferior duritiem quidem aliquanto majorem ostendit, sed comprimi tamen potest; præcipue autem Proccus Condylodeus, et Coronoideus emolliti inveniuntur. Ipsum os Capitis durissimum, quod Auditus Organum includit, soliditatem pristinam amisit et cultro facillime scinditur.

Si vero Osum emollitorum indolem, et eorundem a naturali abnormem structuram accuratius indagemus,

mus, plura, notatu profecto dignissima, licet Medicis hucusque ignota, deprehendemus; nimirum

Primo, magna intercedit differentia inter Ossa Rachitica, et illa, quæ, acidis macerata, emolliuntur; hæc sine ullâ aliâ mutatione solutis acido-terreis particulis, et glutine duntaxat remanente, mollia et tractabilia evadunt; illa vero etiam volumine extenduntur, et in spongiosam massam intumescunt.

Secundo, hic Ossium præternaturalis tumor maxime in iis Ossibus observatur, quæ laxam cæteroquin fabricam et structuram cellularem ostendunt. E. G. in Vertebrarum spinæ dorsi Corporibus, et in spongiosis Tarfi et Carpi Ossiculis. — Corpora Vertebralia, cum in medio excavata, versus inferiorem et superiorem superficiem excurrant, in Rachiticis tumefacta, æqualis crassitie sibi imponuntur.

Tertio, Ossium cylindricorum Epiphyses, et Costarum extrema magis tument, quam Ossium istorum Diaphysis et Corpus medium. Ratio tumoris hujus inæquabilis inde petenda est, quod Epiphyses in statu naturali fabricâ laxiore instruuntur; novimus enim, Ossis substantiam compactam medium tenere, ubi cellulæ densissimæ, et minimæ sibi apponuntur; has autem cellulas, prout ad Ossium extrema, quæ articulos constituunt, pervenitur, ita grandescere et explicari, ut per totam substantiam, Osseæ Cellulæ inveniantur, cum e contrario Corpus medium tubum

solidum, Medullâ refertum, ostendat. Cognita præter hæc Anatomicis res est, Osium Diaphyses pluribus et majoribus arteriis nutritiis instructas esse, easque et numero et amplitudine increſcere, eo magis, quo spongioſior Oſium fabrica est, quæ ingrediuntur.

Quarto, cum Oſa Spongioſa, et Cylindricorum Epiphyſes cellulis amplioribus interſincta ſint; etiam Cellulæ Perioſtei, quæ in ipſas cellulas Oſſeas continuantur, laxiores ſunt; obſervamus idcirco in iis, qui malo Rachitico valdopere afflicti ſunt, etiam Perioſteum in membranâ turgidâ, mucoſâ, albâ, ſpongioſiſſimâ immutari, quâ Oſa emolliata, et eorum præſertim extrema, inveſtiuntur.

Hæc Membrana mucoſa sæpe etiam Cranii Oſa obtegit, et maxime in Oſſe Frontis et Parietalibus animadvertitur; craſſiſſima eſt ad Oſſium margines, et ſenſim ſenſimque attenuata, verſus medium decurrit, quo tamen nunquam pertingit, cum ibi ob oſſificationem perfectiorem Oſſis medium majori denſitate inſtruatur. Hæc adjectâ membranâ mucoſâ Oſa adhuc magis turgent; et Os Frontis Spiritu vini aſſervo, quod, ubi alteri, Sutura Frontali, jungitur, dimidii fere pollicis craſſitiem habet.

Cum Oſa, quæ Calvariæ fornicem conſtituunt, tranſacto primo vitæ anno, denticulis, et crenis Oſſis arcuſſime ſibi uniuntur, hæc in Rachiticis paululum

a se distant, et instar squamarum tenuium sibi imponuntur.

Totius insuper capitis irregularis figura unice ab Ossium Cranii deformitate dependet, quæ non rare ita a se invicem remota fuerant, ut ad eorundem Sutures, separatis eadem Ossiculis claudi oportuerit. Hæc Ossicula in omnibus Cranii Rachitici Sutura deprehenduntur, quæ numero et figura in diversis subjectis variant.

Accedit interdum, præsertim, si malum Rachiticum longo tempore corpus affecit, ut Cranii fundus proprio pondere imprimatur, et Processus Basilaris Ossis Occipitis sursum cedat; hoc autem nunquam fieri, quin magnum inde in animæ facultates detrimentum redundet, verosimile videtur.

C A P U T I V.

Corollaria quædam, quæ ex Phenomenis corporis Rachitici deducuntur.

Si in Physicarum scientiarum campo ulterius progredi conemur, eo labores nostri tendant, necesse est, ut primum, quæ Sensus circa objectum, quod inquisitionibus nostris subiecimus, detegunt, sola, et seorsim referamus et deinde, quid circa eadem dici

ulterius oporteat, deductis rite Ratiociniis, concludamus. Hanc semitam secutus, cum, quæ sint Rachitidis Symptomata, et quæ in cadaveribus infantum, ex Rachitide demortuorum, observare licuit, retulerim, nunc, quid inde Ratione assequi possim, exponam.

Macies infantum Rachiticorum Symptoma est, quod in omnibus, qui hoc morbo laborant, se prodit, et, si dissectionibus utamur, Cutis pinguedine destituta; Tela Cellulosa copiosa et flaccida; Musculi pallidi et emarcidi deprehenduntur. Capitis stupenda moles, et Abdominis tumidis simi volumen, Tabis universalis speciem quidem excludunt; verum si res profundiori scrutinio subjiciatur, non hic substantiæ incrementum, sed potius partium corporis insignem jacturam deprehendemus; Capitis nimirum hiantes Suture, et Ventricleorum cerebri, aquâ repletorum, præternaturalis dilatatio; Intestina Aëre distenta; Membranæ Intestinalium tenuissimæ; Musculorum abdominalium distractorum strata, chartæ vix crassitudinem superantia, Tabem per totum corpus dominari, fatis superque evincunt.

Hæc universalis infantum Rachiticorum emaciatio corpus necessariâ partium, quas continuo deperdit, redintegratione destitui, demonstrat: cum igitur infantes Rachitici asumptis alimentis non nutriantur, a duobus hoc potissimum causis proximis dependet: vel enim Chylus, ex alimentis paratus, ad nutritionem ineptus est; vel viæ obstruuntur, quibus Chylus ad om-

nes corporis partes deferretur. In Rachiticis autem nulla viarum, quas Chylus transit, obstructio observatur, quin potius manifesto apparet, Vasa absorbentia, quæ Mesenterio continentur, ultra diametrum consuetum dilatata esse; neque etiã Mesenterii Glandulæ, quas sæpenumero in cadaveribus Rachiticorum in monstruosum volumen extensas, conspiciamus, chyle transitum denegant, cum Viscera et Glandulas, quæ mole increscunt, non obstructa, sed vasa eorundem potius ampliata esse, jamdum suspicari sit R. A. VOGEL, (6) et nuper demonstraverit ILL. REZIA (7): non ergo ex Glandularum Mesentericarum obstructione et impedito Chyli transgressu, sed ex eo potius, quod Chylus ad corpus nutriendum, et ad particulas, quæ continuo deperduntur, resarciendas ineptus sit, infantum Rachiticorum Tabes et Atrophia derivari debet.

Si corpus male nutriatur, inde id potissimum contingit, quod particulæ, ad constituenda Organa necessariae, ex succis nutrientibus non fecernantur et partibus corporis adhæreant.

Si de Rachitide sermo est, eo jam devolvitur quaestio: quænam particulæ præcipue in corpore infantili, quod

(6) Prælect: de cognoscendis et curandis morbis.

(7) Specim: Observ: Anatom: et Patholog. Ticin[] 1784. disc. 1. et 2. de Viscerum, quam dicunt, obstructione cum molis incremento.

quod hoc morbo afficitur, desideretur? Atque hic facilis responsio est; huius morbi enim Symptoma primum et manifestum exhibent Ossa, quæ ita emolliuntur, ut musculis imbecillibus diversimode curvari et inflecti possint; cum vero Ossium mollicies et flexibilitas unice inde dependeat, quod eadem, particulis terreis omnino destituta, solâ Gelatinâ duntaxat componantur, particulas terreas ad nutriendum et resarciendum corpus præcipue desiderari, manifesto apparet. Licet vero Ossa propterea, quod maximam partem terreis particulis construi debeant, istis moleculis orata præ cæteris corporis humani partibus, morbi naturam prodant, et terræ nutrientis defectum incuscent; Reliquas tamen corporis partes ex hac terræ substantiæ penuriâ præter naturam immutari debere, certo consequitur; quemadmodum enim Ossa à particularum terrearum proportionem, reliquas particulas excedente, robur acquirunt, ut totius corporis basin et fundamentum constituent; ita et Reliquæ C. H. partes Organicæ à terreis moleculis, quæ compositionem ingrediuntur, eam firmitatem et Fibræ adstrictum tonum mutantur, qui ad corporis functiones rite exercendas necessario requiritur; hinc, cum Rachitici terrâ, ad nutritionem aptâ, plane careant; tanta Musculorum laxitas et Lacertorum infuetus pallor; hinc tanta Cutis, et Cellulosi textus flacciditas observatur. Sed et ob eandem rationem Membranae necessariâ ad func-

functiones rite obeundas soliditate et fibrarum elatere carent; tubus Intestinalis ideo tono vix non omni destituitur, et extricatum ex ingestis alimentis Aërem aut subigendo, aut expellendo impar, flatibus ita distenditur, ut abdomen dolii instar turgeat et percussum refonet. Vasorum Sanguiferorum ductus, licet pulsus arteriarum lentissimus cordis vires magnopere imminutas aperte demonstrat, mirum in modum dilatatos ostendit Anatome. Pari ratione Viscerum et Glandularum incrementum huc referri debet, quo praecipue spectat Hepar Rachiticorum, quod semper, et in omnibus, qui ex hoc morbo deceserunt, instantibus in stupendum volumen increvisse, observavi. Nulla alia ex causa haec, ad fecernendos liquores destinata, Organa tantopere increscunt, quam, quod vasa eorundem, et Sanguifera, et Lymphatica, mirum in modum extendantur et ampliuntur. Atqui haec vasorum dilatatio unice ideo contingit, quod laxissima, et omni tono atque elasticitate destituta, Sanguine et Lymphatæ trajectis facillime cedant, et robur se contrahendi et in pristinum statum restituendi desit.

Cum nunc in Ossibus terrearum particularum inopia notetur, atque exinde eorum mollities et flexibilitas unice dependeat; ab imminuta particularum terrearum ad Reliquas partes constituentes proportionem, laxitatem quoque et flacciditatem Reliquorum Organorum derivandam esse, prona conclusio est.

C A P U T V.

*De Nutritione et Secretione pauca, quæ huc
pertinent.*

Ut, quæ de Rachitidis indole statuenda mihi sumsi, facilius intelligi queant, necessarium duxi, circa gravissimam hanc corporis functionem ex Physiologorum recentiorum penu pauca hic interpolare.

Corpus humanum, circa quod unice quæstionis cardo versatur, particulis constituentibus, inter se non tam naturâ, quam proportionem diversis, componitur. Huc pertinent Ossa, Cartilagine, Musculi, varii contextus Membranæ, et Nervea Pulpa. Si de hac Physicâ corporis structurâ quæstio agatur, nulla inter Physiologos controversia obtinet; Verum non æque facile se offert iudicium, si de corporis fabricâ Organicâ sermo sit; cum Organorum primitiva compositio, eo quod oculi aciem subterfugiat, densis adhuc tenebris obvoluta, disquisitionibus Physiologicis metam et fines assignat; neque etiam ullo modo extricare e latebris se quis poterit, nisi observationibus autoptis experimenta adjungat, atque, quod duplici hac viâ indagare sensus non potuerunt, Iudicio et Ratione assequatur.

Tex.

Textus Cellulosus ita per totum Corpus Organicum dominatur, ut pars nulla sit, quæ non exinde confletur quæque in Membranam Cellularem resolvi nequeat. Integumenta Corporis hac Membranâ cellulosâ manifesto componuntur, quæ, ubi musculos investiunt, amplis, et laxis cellulis instruuntur; minoribus vero et densioribus, ubi externæ corporis superficiei accedunt. Musculi, Vasa Sanguifera, Membranae, Glandulae et Viscera, unice ex his cellulis composita, deprehenduntur. Cerebri cellulosa compages facile apparebit, si liquore Morgagni viscus mollissimum induretur. Quid? Quod ipsa corporis Ossa hanc Fabricam manifesto ostendunt; si enim Nitri Acido pars terrea soluta et ablata fuerit, diduci facile et ampliari Cellulae possunt.

Hæc Cellulosa Tela, quæ Organorum substantiam constituit, eadem etiam sibi jungit; adeo quidem, ut Cutis celluloso contextu continuo in musculos transeat; hi, productis cellulis, intimiore nexu Arteriis jungantur, et in ipsam Ossium cellularem compagem, formatâ prius densiori et Ossibus instratâ membranâ, quam Periosteum dicunt, transeant.

Si in quadam corporis parte Cellularis hæc, quâ partes corporis constructæ sunt, Membrana oculis non pateat; causa est, quod cellulis minimis acervatim aggestis composita sit, quæ vel ob insignem duritiem

diduci nequeunt, vel ob nimiam molliem vix eohærent et diductæ lacerantur; hinc fit, ut partes corporis firmisimæ, Ossa scilicet, et molliissima Cerebri Nervorumque Pulpa, cellulis destituta esse videantur, quas tamen experimentis institutis facillime deteguntur.

Maximi profecto momenti res est, de hac præmissivâ Organici Corporis structurâ veram notionem statuisse, cum omnes corporis humani mutationes huc referantur.

Arteriæ, quæ sanguinem vehunt, ex corde sinistro propagatæ, corpus permeant, in ramos plurimos dividuntur, et capillare lumen hactæ, varios formant Plexus Retiformes, qui deinde collecti denuo et aliis trunculis juncti, sub Venarum nomine ad cor redeunt. Qui huc præcipue spectant, Plexus arteriosi extremis vasorum divisionibus formantur et minimis arteriis componuntur, ex ultimo arteriæ ramusculo exortis, acervatim sibi appositis, reflexis et collectis denuo in trunculum, qui Venulæ officio fungitur. Hæc vasculosa corporis fabrica, inter ultimas arteriolas et venulas intermedia est, et his tantum arteriosis Plexibus Organa Secernentia immediata constituuntur; quemadmodum enim pars corporis nulla est, quæ non Cellulis confletur; ita quoque nulla Cellula invenitur, quæ arterioso ejusmodi Plexu non instruitur. Hanc subtilissimam organorum fabricam

eam in partibus Corporis Humani, cerâ coloratâ re-
pleris, Microscopio visâ, merito admiramur. (8)

In Cellulam unamquamque vasa quoque Abfor-
bentia plura hiant, quorum binos, tres quatuorve
detexerunt Anatomici (9).

Sanguis, cordis impulsu et intrinsecâ arteriarum se
contrahendum virtute, in vascula minima adigitur,
Plexus arteriosos, subtilissimis membranis formatos,
extendit; atque ita accidit, ut tenuissimus Sanguinis
liquor, Serum scilicet, et coagulabilis Lympha, per
minimorum canaliculorum parietes transfudet et Cel-
lulas impleat.

Cum Cellulæ particulis variis, diversa sibi propor-
tione commixtis, consent; necessario quoque accidet,
ut Cellulæ, Lympha et Sero repletæ, has ex liquore
particulas attrahant, easque sibi jungant, quæ maximâ
ad cellulas affinitate pollebunt: ita particulæ glutinosæ
Musculis; oleosæ Cerebro; terreae Ossibus præcipue
adhærescant.

Hac solâ ratione comprehenditur, quî Corpus Or-
ganicum nutriatur; cum enim partes corporis anima-
lis ferius, citius, in putredinem inclinent; hac interiore
partium decompositione, materia, Cellulas constituens,
in

(8) F. Mascagni Vasorum Lymphaticorum. C. H. His-
toria et Ichnographia. Senis 1787. Part I. Sect. II.

(9) Ibid. Part I. Sect. III.

in ulteriora sua elementa disolvitur, ex cohæsione deturbatur et novis, Plexu Arterioso huc delatis, particulis commutatur.

Cæteræ, in Cellulas transmissæ, particulæ, quæ ab ipsis Cellulis non attrahuntur, et illæ, quæ antea Cellulis conjunctæ, nunc in ulteriora elementa disolutæ sunt, Vasis Absorbentibus ex cellulis reducuntur, in Ductum Thoracicum refluent, et sanguini commistæ, vel denuo circulum absolvunt, vel nutritioni ineptæ, Organis excretoriis e corpore eliminantur.

Iusta et determinata partium constituentium proportio requiritur, ut Organa corporis idoneam structuram nanciscantur, quâ functionibus necessariis defungi possint; cum autem Organicæ corporis humani partes ex Sanguine, vel potius Lymphâ Sanguinis coagulabili efformentur et continuo redintegrentur, Sanguis autem ex Chylo paretur, res ultimo eo redit, ut liquores isti corporis alumni incusari debeant, si particularum nutrientium æqua proportio desideretur.

C A P U T V I.

Natura Rachitidis explicatur.

Cum infantes Rachitici alimentis iisdem sustententur, quæ sanis pueris robur et vigorem conciliant; in peculiari Chyli depravatione consistere ratio debet,
cur

cur tot cum alimentis assumptæ particulæ terreæ ad corpus nutriendum reddantur ineptæ: hanc aurem peculiarem Chyli corruptionem morbi Symptomata, et corporis disfecti Phænomena aperte produnt; quidquid enim ex corpore infantis Rachitici excernitur, Acidi indolem manifestat; huc præcipue pertinent Alvi excretiones liquidæ, ex flavo viridescentes, quæ acidum odorem spirant; Ructus et Vomitus Lactis coagulati acescentis; Transpiratio et Sudor manifesto acidus, quæ omnia evincunt, corpus Rachitici totum acore quasi imbutum esse.

Quodsi abdomeni infantis, ex Rachitide demortui, aperiatur; non putredinis alcalinus odor se manifestat, sed vapores subacidi, penetrantes, nares feriunt. Similiter et in Ventriculo, et in Intestinis contenta Acidum redolent, et chartam, tincturâ Heliotropii coloratam, ingestis immersam, rubuisse, sæpius expertus sum.

Ex his Phænomenis ratio redditur, cur terra, quæ cum alimentis in Chylum transit, corpori nutriendo inservire nequeat: ut enim corpus nutriatur, particulæ nutritivæ Chylo et Sanguini Mechanice commixtæ sint, et his liquoribus vitalibus libere innatent, oportet; ita enim, si Sanguine per corporis vasa circumacto, Lympha, his particulis sæta, per subtilissimos Plexuum Arteriosorum parietes trajiciatur, hæ particulæ subito Cellulis Chemicâ affinitate
ad-

adhærere, atque ita deperditas de compositione ultio-
 riore partes refarcire poterunt. Si vero particulæ,
 alias nutritioni aptissimæ, alienis moleculis attractione
 majori jungantur, quam quæ inter ipsas particulas
 nutritias et Cellulas, in quas trajiciuntur, intercedit;
 non jam hæ particulæ cellulis adhærebunt, sed nu-
 tritioni ineptæ, Vasis Absorbentibus in massam San-
 guineam rursus deferentur, atque excretoriis Organis
 e corpore eliminabuntur.

Acida vegetabilia debiliora terræ calcareæ facile
 conjunguntur, et Sal neutrum terreum constituunt,
 quod aquâ solvitur, et magnâ ejus copiâ delui po-
 test. His Acidis adnumerari debet Acidum Lacticum,
 quod quidem ex liquore, in corpore animali parato,
 evoluitur, sed cum Acidis vegetabilibus mitioribus
 in eo convenit, quod terram calcaream facile solvat
 atque hæc solutio aquæ non uniatur, quin terra ex
 solutione secedat. Plura Infantum Ossa, repetitis vi-
 cibus, Acido Lactis immisi, quæ, per octo dies relic-
 ta, ita emollita fuerunt, ut flecti et incurvari, ceræ
 adinstar, potuerint. (1)

Ne-

(1) *Fauchy* et *Geoffroy* cochleare eburneum acido lac-
 tis emolluisse (Histoire de l'Academie de Paris 1743.
 Obs. de Phys. Cap. 13.) et *Ruysch*, Thesaur. Anat.
 Sext. No. 13. Thesaur. Max. No. 1611. Thes. Nov. No.
 129. et *Hunold* (Histoire de l'Academie de Sciences de
 Paris;) Ossa quoque humana Acido Lactis et Aceto mac-
 rata fuisse et emollita, experimentis invenerunt.

Neque hæc Acidorum indoles cum terrâ calcareâ Sal neutrum, aquâ solubile, constituendi, Acidis tantum Vegetabilibus convenit; sed et fortissima Regni Mineralis Acida nonnulla hac proprietate gaudent, maxime, si sali medio terreo Acidi portio non saturata adjiciatur: Ita e. g. Acidum Nitri dilutum terram calcaream facillime dissolvit, neque caleem dimittit, quantacunque etiam aquæ copia solutioni affundatur.

Ex altera autem parte plura prostant Acida, ex omni Naturæ regno desumpta, quæ terræ calcareæ facillime quidem uniuntur, sed Selenitem calcareum, aquâ non solvendum, constituunt. Huc pertinent Acidum Vitrioli, Acidum Fluoris mineralis, Acidum Sacchari et Acidum Phosphoreum.

Cum Acidum Phosphoreum in hominis sani, et animalium corpore, præcipue, et fere unice, invenitur, et terræ conjunctum, Osseam materiem, alcali vero vegetabili nuptum, Sal Microcosmicum constituat, patet, hoc Acidum in corpore Animali duntaxat parari. Hoc autem in pueris, Acido laborantibus, non contingit; Acida vegetabilia, et quod ex Lacte evolvitur, Acidum, cruda remanent, cum Chylo in Sanguinem deferuntur, atque ita ad Cellulas ipsas pertingunt,

Quidquid terrearum particularum vel in Chylo vel in Sanguine continetur, crudis his, quæ ex infantium Intestinis immutata adveniunt, Acidis solvitur et Sal neutrum efformatur, quod, cum Seri magnâ copiâ solvatur, ineptum redditur Cellulis Osseis adherendi,

ant

aut reliquorum Organorum compositionem ingrediendi; quare vasis Absorbentibus, in Cellulas ubique hiantibus, fuscipitur, Sanguini denuo admiscetur, et Pulmonum, Cutis, Renum excretoriis organis ex corpore eliminatur. Nulla ergo fit particularum terrearum ad corporis infantilis, hoc morbo affecti, Cellulas appositio, et hinc structura organica præter naturam immutatur.

Cum Ossa maximam partem in sanis perfectæ fabricæ hominibus Calce Phosphoratâ componantur; hæc etiam in infantibus, in quorum corpore hoc Sal neutrum terreum, nutriendis organis aptissimum, desideratur, maxime immutari debent; tunc enim solâ fere gelatinâ nutriuntur, mollia idcirco et flexibilia evadunt, et musculis se contrahentibus, huc, illuc inflecti et incurvari possunt.

Præterea, cum et vasa Ossium nutriticia, et Cellulæ ipsæ particulis terreis priventur, hæc tono, et pristina soliditate privata, liquoribus, qui per eadem urgentur, cedunt, ampliantur, extenduntur; quo fit, ut ipsum Os intumescat et spongiosam compagem referat.

Cum reliquorum Organorum compositio major, minorve Calcis Phosphoratæ quantitas, accedat, quæ iisdem robur et firmitatem conciliat, hæc etiam, terreis moleculis orbata, solventur, atque hinc Musculorum laxitas, Cutis flacciditas, Abdominis Tympanites et Viscerum præternaturale incrementum, quæ in Rachiticis observantur, facile explicantur.

S E C.

S E C T I O II.

RACHITIDIS ÆTIOLOGIA.

C A P U T VII.

Rachitidis Causa Generalis.

CUM Terra, partes Animales nutrientis, defectus unice in Chylo consistat Acescēti; jam non difficile erit, ratiōnem reddere, cur in Infantibus Succus Nutritius, hoc Acido præcipue imprægnatus, inveniat.

Infantes, qui Rachide affecti non sunt, etiam si Acidis Vegerabilibus et Lacte animali pascantur; tamen nulla Acidi excreti signa produnt, quin potius eorundem et Chylam et Excreta, in putridam corruptionem vergere, Sensus et Experimenta commonstrant.

A rite peractâ digestionē dependet igitur ratio, alimenta, quæ Vegetabili Acido fœtent, ita commutandi, ut partibus Animalibus similia, nutriendis iisdem idonea evadant. Digestionem autem præcipue succis et liquoribus, in Intestinis et Visceribus Abdomina-

libus secretis, peragi, demonstravit *III* : SPALLANZANIUS (2).

Si igitur Acida, quibus infans nutritur, adjectis humoribus digerentibus, in Animalem naturam non immutentur, hos humores corruptos et vitiatos esse oportet.

Ubi cultro Anatomico viscera Rachiticorum inquisivimus et succos, ab iisdem secretos, examinavimus, præ cæteris Hepar prægrande et Vesiculam Felleam Bile vappidâ, inerte, quæ vix amarorem linguæ prodit, repletam, deprehendimus; neque enim Salivam, aut Pancreaticum Succum vitiatum unquam in Rachiticis invenisse me, memini.

Hæc ergo *Morbi Causam Generalem* referendam esse, demonstrandum asumo.

Præcipua Organorum digerentium functio in eo consistit, ut Vegetabilia et cruda Animalium Acida in immutent, ut nutriendis corporis Organis apta reddantur. Totius ergo functionis hujus cardo in eo versatur, ut ita hæc Acida immutentur, ut, vel cum Oleo conjuncta, Adipem Animalem constituant, vel Terræ unita, Sal Neutrum, liquore feroso insolubile, partibus animalibus nutriendis idoneum, efforment.

Hoc vero Sal Neutrum terreum ex Terrâ Calcareâ et Acido Phosphoreo componitur. Cum vero Terri

ca-

(2) Dissertationi di Fisica Animalee Vegetabile, Tom. I.

Calcareæ omnibus fere alimentis inest; Acidum Phosphori autem in plerisque desideretur; reliqua Acida in Acidum Phosphori, in animali digestionis officinâ transmutari, sine ullo præcipitis iudicii metu pronuntio, maxime cum Acida asumpta, in Excretis animalium bene valentium, non amplius inveniuntur.

Quâ autem ratione Acida asumpta Acidi Phosphorei indolem acquirant, id, etiamsi non certis ratiociniis, verosimili tamen conjecturâ, assequi licet. Acidum Phosphori non tantum cum cæteris animalium Eductis in eo convenit, quod Phlogisto oneretur; verum etiam hoc Acidum Animale Phlogisto copiosissimo saturatum esse, Chemica experimenta evincunt, cum exinde varia corpora, quæ, si libero aëris accessui exponantur, igne subtilissimo et purissimo deflagrant, Phosphori scilicet conficiantur. Quidnam igitur obstat, quinominus Acida ingesta, addito in digestionis officinâ Phlogisto, in Acidum Phosphori commutari affirmemus? Quidni dicamus, in eo præcipuam digestionis provinciam positam esse, ut Acidis crudis magna Phlogisti quantitas accedat, atque hæc, isti unita, Animalem naturam induant? Confirmatur hoc egregie Animalium Phytophagorum attentâ contemplatione, quorum Viscera digerentia magis composita atque ampliora, et Intestinorum tractum multo longiorem Anatome deregit.

Inter succos digerentes corporis Animalis nullus est,

est, qui tantâ Phlogisti copiâ instructus sit, ac Bilis, quæ ex Sanguine Venæ Portarum atro, lentescens et maxime Phlogistico paratur, quæ dein in Cystide Felleâ stagnans, majorem adhuc Phlogisti quantitatem evolvit, quod Bilis concrementa et Calculi Fellei aperte demonstrant, cum igne accendantur et dein, sparso fumo fugilinoso, deflagrent.

Ab hujus igitur succi digerentis, cum Acidis, in Intestina Animalium delatis, intimiore nexu Acidum Phosphoreum parari, evictum credo.

Primo, quod hoc Acidum extra Corpus Animale vix unquam inveniat.

Secundo, quod Acida cruda assumpta ex corpore denuo non excernantur.

Tertio, quod Acidum Phosphoreum Phlogisto onerari, experimenta sat superque evincant.

Quarto, quod Bilis inter liquores digerentes princeps et unicus sit, qui tantam Phlogisti copiam contineat et exinde quasi consletur.

Quæ cum ita sint, nullus dubito, quin Medicorum assensum assequar, si Rachitidis Causam Generalem in Bile dilutâ, vappidâ et inerte reponam, maxime, si expertem præjudiciis animum afferant et considerent, in omnibus, quotquot dissecantur, Rachiticorum cadaveribus Vesiculam Felleam, liquore mucoso albido, qui ne gustu quidem amarorem prodit, plenam inveniri.

Hic

Hic ergo iners et vapidus liquor, qui Bilis locum tenet, Acidis vegetabilibus et illi, qui ex coagulati Lactis Sero extricatur, immutandis (i. e. Phlogisto faturandis) ineptus est, hinc eâdem, Chylo non mutata commiscetur, Terræ Calcareæ uniuntur et Sal Medium efficiunt, quod reliquis humoribus Animalibus, Sero nempe, et Lymphâ facillime solvitur.

Cum autem ita solutum, neque Osibus, neque cæteris corporis Organis in eorundem cellulas delatum, ob maiorem cum Sero affinitatem adhærescat, Vasis Absorbentibus, tanquam nutritioni ineptum, in Sanguinis massam deferretur atque inde ex corpore excernitur.

Quodsi autem, Bile bene constitutâ, ex Acidis crudis Acidum Phosphori in Animali Corpore pareretur, hoc idem Terrâ Calcareâ jungitur, et cum Sal Neutrum, ex hac unione oriundum, aquosis animalium humoribus solvi nequeat, sed, eisdem Mechanico tantum commixtum, sanguinis circulum absolvat, in cellulas delatum, alienâ attractione non impediatur; quominus iisdem, uti nova particula nutriens, adhærescat.

Præter Acidum Phosphori, quod, Terrâ Calcareâ unitum, Seleniten Phosphoreum constituit et cum Sale Tartari combinatum, Sal Microcosmicum, magnâ non raro quantitate cum urina excretum, in secundis Corporis Animalis viis, Acidum Pinguedinis et

nonnulla quandoque Acidi Sacchari vestigia deprehenduntur.

Acidum Pinguedinis, fere semper Oleo unitum, Adipem constituit, qui textus cellulosi receptacula replet. Hoc ex aliis Acidis, in nutrimentum assumptis, addito Phlogisto, parari, nulli dubio subjicitur, cum instituta a *Celeb. CRELLIO* circa Pinguedinem experimenta, Acidum inde extricatum, vaporibus penetrantissimis et maxime volatilibus, destillando, attolli, demonstrent (3). Videtur ergo minori solummodo Phlogisti contenti proportionem ab Acido Phosphori differre, quod volatili hoc principio quasi saturatum novimus.

Hinc fortasse contingit, ut in iis hominibus et animalibus, quibus Hepar aliquo modo aegrotat, Adeps tantopere augeatur; cum enim Bilis, organo vitioso secreta, Acidis crudis tantam Phlogisti copiam, quam ad constituendum Acidum Phosphori requiritur, addere nequeat, Acidum Pinguedinis generatur, quod Oleo saturatum, Adipem constituit. Saltem in omnibus obesis et multo pingui onustis, Hepatis vitium Cl. Viri observarunt.

Supereff, ut Cl. *de FOURCOY* (4) circa emollitionem

(3) *Chemisches Journal*, Theil. I. pag. 60.

(4) *Mem. de la Société Royale de Médecine de Paris* 1782 — 1783. pag. 427.

nem Ossium sententiam refellam. Hic causam proximam Rachitidis in superabundanti Acidi Phosphorici excessu invenisse se, credit; cum enim Terra Calcareae, Acido Phosphoreo saturata, humoribus nostris non solvatur; eadem tamen facillime solvitur, si Acidum Phosphori saturationem excedat; sicut idem de Gypso novimus, quod, licet aqua non solubile, tamen statim dissolvitur, si Acidum Vitrioli affundatur. Verum licet concedam, posse quandoque in aliis morbis, in quibus Ossium mollietates observatur, e. g. in eo, quem describit MORAND (5) et in illo, quem adultorum Rachitidem appellat FRANCK (6) ex Acidi Phosphorici abundantia hoc Symptoma nasci; in Rachiticis infantibus tamen Acidum Phosphori non modo non abundare, sed omnino deficere, Ossium gluten, igne aperto deflagrans, et facile in cineres reducendum, aperte demonstrat.

Nihil ergo impedit, quin potius omnia Phenomena, in Rachitide observata, eo reducuntur, ut Acidum praedominans, quod Terram Calcaream ad organa nutrienda inhabilem reddit, Rachitidem constituere; Bilis vero inertiam, Generalem morbi Causam esse, demonstrant.

C A-

(5) Histoire de la Maladie Singuliere, Paris 1452.

(7) Delectus Opusc. Medic. Tom V. pag. 304. et seqq. v

C A P U T V I I I .

Rachitidis Causæ Remotæ.

Morbus nascitur, si Causarum, externe in Corpus agentium, ad præternaturalis structuræ anomalias sit inversa ratio.

Hæ Causæ Externæ inter Occasionales numerantur; immutati vero corporis habitus vitia Causarum Prædisponentium nomine veniunt.

Causâ Proximâ et Generali Rachitidis nobis cognitâ, prono tramite ad Remotas transimus, ac primo quidem Prædisponentes, habitâ tamen semper Causæ Generalis ratione, quæ Remotarum immediatus effectus est, perfringere liceat.

Ætas infantilis sola ad morbum Rachiticum suscipiendum - propriâ suâ Fabricâ disponitur; nullus enim infans est, in quo non Hepar ad cæteras Corporis partes proportionem multo majorem, ac in adultioribus ostendat, cum in illis, etiam sanissimis, fere semper ad Umbilicum usque protendatur.

Hanc insignem Hepatis aucti amplitudinem unice a Vasorum, quibus totum componitur, majori extensione et dilatatione oriri, Anatome manifesto commonstrat; scilicet, cum in corpore fœtus organa solâ fere Gelatinâ componantur et Sanguis ex
Pla.

Placentâ subito Hepar ingrediatur; fortiori ejusdem impulsu hoc viscus præ reliquis dilatatur.

Hac Vasorum Hepatis dilatatione, cum eadem Bili secernendæ destinata sint; necessario consequi debet, ut secretio, hoc viscere peracta, in infantibus diversa sit ac in adultis; quemadmodum etiam in pueris sanissimis Bilem multo dilutiorem reperi-
mus ac in ætatis provectionis hominibus.

Ex unâ parte, hac Hepatis infantilis amplitudine Natura quidem finem suum optime consequitur; cum nempe Bilis aquosior alimenta Acidula, quibus frui-
tur infans, omnia in Acidum Phosphori transmutare nequeat; Calcis Phosphoratæ minor copia in corpore infantili generatur, laxior remanet corporis habitus et staturæ incrementum non impeditur. Verum ex alterâ parte, hæc necessaria Hepatis infantilis structura ad morbum Rachiticum prædisponit, et si Causæ Occasionales accedant, morbus reapse suboritur.

Quo laxiori Fibrâ infantile Corpus instruitur, eo major evadit ejusdem ad Rachitidem suscipiendam capacitas; Viscera enim eorumque Vasa eo facilius extenduntur et ampliantur; atque tunc Bilis eo aquosior secernitur, ad digestionem alimentorum prorsus inepta.

Hinc infantes, partu præmaturo editi, Rachitide facilius corripiuntur, cum organa eorundem Gelati-

nā duntaxat fere tota componantur, et hinc vi minimā statim præter naturam dilatentur.

Infantes, a parentibus progeniti, quibus laxus est corporis habitus; qui vitam otiosam et sedentariam ducunt; qui mensā opiparā et potu calido abutuntur; qui Venere aut ætate exhausti sunt et qui iteratis Gonorrhæis obnoxii, procreandis liberis effœtam genituram impenderunt, Rachitide facile corripiuntur; atque inde fit, ut hic morbus vix robusti agricolæ progeniem, sed fere semper generosorum cunas infestet.

Sexum sequiorem majori ad Morbum hunc dispositione instructum esse, affirmare non ausim (7) cum primis vitæ annis corporis habitus sanæ puellæ ab illo pueri valentis non distinguatur, neque observationes hujus asseri veritatem commonstrent.

Ad Causas Occasionales enumerandas transeo, quæ cum Prædisponentibus Rachitidem procreare solent; ac primo quidem sermo sit de Rebus Naturalibus, in corpūs infantile inimice agentibus.

Præcipua et inter omnes frequentissima Rachitidis Causa est Aër, multis vaporibus aqueis repletus.

Increscit Causæ vehementia, si aër simul calore rareseat; si enim infantes, qui, ab ætate, laxiori corporis

(7) Asserit hoc le Vacher de la Feutrie in Richters Chirurg. Bibl. Theil II. st. II. pag. 65.

poris constitutione instruuntur, in Atmosphæra humidâ et calenti vitam degant, non modo non libera prohibetur perspiratio; verum etiam, cum corpus undique vaporibus aquosis circumdantur, magna aquæ copia Vasis Absorbentibus, quæ et in Pulmonum cellulis et in totâ externâ superficie Cutis hiant, in corpus defertur et humoribus admiscetur; quo fit, ut humores secreti, qui corpori nutriendo destinantur, ita diluantur, ut laxiorem corporis fibrâ producant; præterea autem, et, quod caput est, Viscerum Vasa ampliantur, et humorem, aqua dilutissimum, secernunt, ad functiones præstandas prorsus inutilem. Hepatis itaque Vasa Sanguifera, quorum laxior jam in infantibus structura est, adhuc magis ampliantur et, qui ab his secernitur, succus, aquâ copiosâ ita diluitur, ut Bilis nomen non mereatur; Ineptus igitur alimentis digerendis, Phlogiston Acidis addere, atque ita eadem in Animalem naturam commutare nequit.

Atmosphæra humida in causâ est, cur Rachitis in regionibus maritimis, in Angliâ, Hollandiâ cæterisque tam frequens inveniat; cur in pauperum tabernis, qui curtam suppellectilem unico secum cubiculo includunt, dirus hic morbus grasceat; cur in Civitatibus, mari aditis, ubi deterioris conditionis homines ædes humidissimas et loca subterranea incolunt, infans non inveniat, qui

Ra.

Rachide affectus non fit; cur denique in Regionibus, a mari et paludibus remotioribus; in Civitatibus, hoc malum frequentius multo fit, quam in Villis et Oppidis; nimirum, cum urbes plerumque altis mœniis cingantur et ædificia cumulata plateas angustissimas complectantur, aëris continua mutatio impeditur, et hinc stagnans Atmosphæra diversis exhalationibus quasi saturatur.

Mentio quoque injicienda hic est infelicissimæ illius humani generis progeniei, quæ profundissimos Alpium Valleis et Sabaudis vallis incolit, et quos *Cretins* patrio idiomate appellant. Summo istos Rachitidis gradu corripì, nuper demonstratum est (8), cum facta Cranii, ad Protuberantiam cerebri Annularem, impressio, hos, qui vix figuram hominis referunt, ratione privet, et vel ipsis brutis animantibus postponat.

In humidissimâ vallium Atmosphæra et in calore penetrantissimo, a radiis solaribus saxosis vallium parietibus reflexis orto, hujus mali, cui par nullum existit, ratio querenda est.

Alimenta, quibus infantes sustentantur, sæpissime morbi causam sistunt; cum enim Bilis infantum etiam sanissimorum dilutor sit; non omnia, quæ in-

ge.

(8) J. F. Ackermann über die Kretinen, eine besondere Menschenabart in den Alpen. Gotha 1790.

geruntur, nutrimenta digeri possunt; hinc Natura Lacte, maternis uberibus secreto, pasci voluit infantes. Sed invaluit jam tantopere apud nos pernicioſa conſuetudo, ut matres etiam ſaniffimæ prolem Lacte proprio nutrire recuſent, et conductæ nutricis ad ſuſtentandum infantem ope indigeant; magnum certe inde et matri et præcipue tenello infanti detrimentum oboritur; Natura enim Lactis materni indolem vi digerendi neonati ita adaptavit, ut primo aqueus quaſi liquor, Colôſtrum nempe, in matris uberibus ſecernatur, et dein, ubi infans ætate increſcit, Lac ſenſim ex tenuiori alimento paulatim ſpiſſioribus particulis componatur. Nutrix contra mammæ præbet neonato, craſſiore jamdum Lacte plenas, quod, Bile dilutiſſimâ non digeſtum, aeſcit atque ita Rachitidis principia ponit. Lac humanum multum præſtare brutorum Lactibus, plures Cl. Viri Chemicis experimentis demonſtrarunt (9) cum Acidis mitioribus, quin et fortiffimis Vitrioli, Niri et Salis communis Acidis non coaguletur. Optimum ergo præbet neonatis infantibus nutrimentum Lac, e
mater-

(9) *Spielman*, Le lacte Humano, opt. infant. recens nat. aliment. —

Voltelen, Obſ. Chemic. Med. de Lact. Hum. ejuſque cum Aſinino et Ovillo comparatione, Trajecti ad Rhenum 1775. Cap. III §. I.

Bergius, Schewd. Abhandl. B. 34. pag. 40.

maternis uberibus suctum, quod neque *Lac Vaccinum* neque *Ovillum* adæquat; lac scilicet animalium, cum, *Bilis* infantilis digestionem, in nutrimentum subigi nequeat, humano multo citius acescit.

Huc pertinent quoque *Puliculæ*, quæ cito *Acidam Fermentationem* subeunt, et *Saccharata*, quæ præterea virtute suâ saponaceâ solidas corporis partes resolvunt et relaxant.

Infantes, virium muscularium incrementum quoddam nacti, motu corporis maxime indigent; hoc enim fit, ut, *Sanguine* citius in circulum acto, nutritio celerius peragatur et tonus firmitasque fibrarum increseat. Est ergo parvulis maxime periculosum, et non rara *Rachitidis* Causa, si, iidem ab omni se movendi conatu arceantur et clausis sedilibus captivi detineantur; increscit autem sanitatis detrimentum, si fellæ perforatæ imponentur, ubi nudato inferius corpore, putres *Urinæ* et *Excrementorum* vapores denuo resorbent.

Plurimum quoque in provocandâ *Rachitide*, morbi possunt, qui infantes primis vitæ annis adoriuntur, maxime, si digestionis instrumenta lædant aut fibræ laxitatem inducant. Huc itaque referri debent *Evacuationes* nimie, *Hæmorrhagiæ* scilicet, *Diarrhææ* et *Sudores* profusi, *Dentitio* difficilis, *Tussis* convulsiva, *Vermes* et cæteri, quorum *Catalogum* enumerare, inutile credo negotium.

In-

Inter cætera autem præcipuam nostram attentionem requirit Febris intermittens, præsertim autumnalis, quam sæpissime in infantibus Rachitidem fecutam esse, testatur SYDENHAMUS (1); neque id mirum, cum post febres intermittentes abdominis Viscera inflari et molis assequi incrementum, sciamus; Obstructionem id Medici falso appellarunt, cum vasa dilatata, et ampliata potius viderit Cl. REZIA (2); quod etiam sanguine, irritamento febrili per vasa, quorum cohæsiō Physica ob nutritionis in febre defectum valdopere imminuitur, vehementius circumactō, facile explicatur. Si ergo infantes febris corripiat, citius certe Viscerum, quorum soliditas tantilla est, vasa extendentur et Hepar increcet, quo Bilis aquosa, digestionē inepta, paratur et Rachitidis causa proxima gignitur.

C A P U T I X.

*Cur Infantes, qui tertium Annum superarunt,
Rachitide non corripiantur?*

Indagatā Rachitidis Naturā et cognitis morbi
Cau-

(1) Opera Med. Geneve 1775. Tom. I. pag. 59.

(2) Libro citato.

Causis, hanc quoque *Viri Illustrissimi!* quam orbi literato proponitis, quæstionem resolvere annitar.

Embryo, primis a Conceptione mensibus, Muco constat, totus tenuis et pellucidus, neque etiam, ubi ad vitæ uterinæ medium pertigit, structura ejusdem organica præter Gelatinam paulo compactiorem, aliâ materiâ componi videtur. Naturæ igitur observationibus consentaneum est, si prima hominis lineamenta Muco, quem sanguinis Materni coagulabilis Lympha suppeditat, nutriri, asseramus. Et, primis quidem graviditatis mensibus, Placentæ vasis, non nisi hæc subtilissima sanguinis Lympha in foetum transmittitur; pro ut autem Placentæ et Umbilicaliæ Vasa increscunt, etiam cæteræ sanguinis materni partes, Oleosæ scilicet et Terreæ, in foetum transeunt; minor Tamen semper harum partium ad plasticam Lympham proportio in foetum trajicitur et in adultæ matris sanguine detinetur; demonstrat hoc, infans neonati habitus, in quo partium soliditas ea, quæ in adultioris ætatis hominibus observatur, omnino desideratur; Musculi gelatinosi tendinibus destituuntur; Ossa robore ac firmitate carent, et fibris rare sibi appositis conflata, facilius inflecti, quam diffringi possunt.

Quando autem utero exclusus infans virâ propriâ gaudet, ærem respirat et alimentis, per os ingestis, nutritur, alia subito apparet rerum facies. Si aptis

nutrimentis vescatur et in ære puro vitam degat, pederentim corpus increscit et majorem soliditatem atque intensius robur acquirit; Si vero alimenta ipsi, digestu difficilia, ingerantur, vel si aliæ causæ externæ habitum corporis, cæteroquin laxum, adhuc magis resolvant, Rachitide afficitur infans et corporis nutritio atque incrementum impeditur.

Si infans, primis vitæ annis, congruis cibis pascatur, atque inde indies crescat corporis vigor; Ossa majorem soliditatem nanciscentur; Fibræ musculares numero augebuntur, magis rubescent et tendineis extremitatibus instruentur; Viscera, quæ cavis Corporis continentur, et primis vitæ annis laxiora et ampliora erant, his nutrimentis tonum et elasticitatem majorem acquirent; hinc Vasa eorundem coarctabuntur, et totum Visceris volumen imminuetur. Jam vero istud, quod corpori accedit, majus et intensius robur Terrearum molecularum appositione fieri, in aprico est, cum Terræ majori proportionem, Musculi, Ossa, Membranzæ adultiorum ab infantilibus distinguuntur.

Quo magis autem Viscera compinguntur et consolidantur, eo magis, succo ipsis proprio, aquâ non diluto, puro, fœcurnendo idonea evadunt: ita Hepar, in substantiam compactam redacta, Bilem flavam, concentratam, amarescentem, ductibus suis effundet,

non vappidam et aquosam amplius, quam Jecinore infantili laxo et spongiolo secretam novimus.

Hæc autem Bilis concentrata alia quoque alimenta, digestu difficiliora, subigit; in Animalem naturam commutat; Phosphori Acidum, addito Phlogisto, productum, Terræ commiscet, et hæc Terra, organis Animalibus addita, illa magis magisque firmat, stabilit atque ad functiones proprias exercendas indies aptiora reddit.

Si ergo Corpus infantile paulatim alimentis, digestu facilioribus, educatur et inimicis Causarum Externarum in se actionibus eximatur, pederentim, et quasi per gradus, omne Rachitidis periculum effugiet; cum, consolidatis digestionis organis, ita jam disponatur Corporis habitus, ut Causas Externas et Occasionales facillime eludat, et licet nunc eadem tantâ vi in Corpus agant, quantâ in Junioribus Rachitidem certe procreassent, factum tamen tectumque servetur.

C A P U T X.

Quamnam Corporis conformationem Rachitis post se relinquat.

Si Corporis dispositio, faventibus circumstantiis,

aut

aut Medici ope immutetur, vel si *Causæ Occasionales* cesſent; *Rachitidis* Symptomata paulatim immi-
nuuntur et æger ſanitati reſtituitur.

Organa, digeſtioni inſervientia, ſucceſſu temporis
magis magisque conſolidantur, et hinc fit, ut ali-
menta, nunc bene ſubacta, in Corporis nutrimentum
cedant. Oſſa, quæ ob *Terrearum* molecularum de-
fectum penitus emolluerant, nunc novis accedenti-
bus *Terreſtribus* particulis, firma et robuſta evadunt;
Musculi tonum et vigorem acquirunt; *Membranæ*
et *Vaſa*, exinde compoſita, majori cohæſionis gradu
et elatiſticate donantur; increſcit eâdem ratione par-
tium Irritabilitas et *Vaſorum* ſe contrahendi potentia,
atque hinc liquida ſecundum *Oeconomice* animalis
leges denuo moventur, partium æquabilis nutritio
perſicitur et ſic ſanus corporis habitus reſtituitur.

Ubi *Rachitidis* Symptomata ceſſant et res in
melius abit, ſingulare phænomenon obſervatur. —
Oſſa cylindrica, prius incurvata et vario modo in-
torta, non raro in priſtinum ſtatum redeunt; id con-
tingit particularum *Terrearum* appoſitione, eo nutritio-
nis inchoatæ ſtadio, ubi Oſſa, prius emollita, nunc
denuo tonum aliquem ſibi acquiſiverunt et propriâ
elatiſticate priſtinam ſibi formam vindicant. Aſt ſi
Rachitis longo tempore duraverit et *Musculi*, qui
Extremitatum alterutrum laſus tenent, breviores jam
evaſerint; tunc Oſſa, ita inflexa, retinentur; neque

spes ulla superest, ut deformitati Rachiticæ, Naturæ aut Ars medeatur.

In ipso morbi Rachitici decursu non raro accidit, ut Columna Vertebralis spongiosa, Musculis ex unâ parte validius agentibus, in hoc latus paululum detorqueatur; postea vero, ubi Musculi, Rachitide superatâ, virtute majori instruuntur, major quoque evadit musculorum unius lateris, ad vires lateris alterius, ratio, atque pedetentim Vertebrarum Corporibus ex unâ parte diminutis et quasi detritis, tota Columna in hanc partem propendet. Homo, hoc vitio laborans, cum corpus lineâ directionis excideret, si rota columnæ longitudo inductam a curvatura directionem sequeretur, subito continuis ausibus Corpus versus oppositam partem inclinat; atque, hoc immutato corporis situ, æquilibrium quidem restituit, verum Rachitide etiam omnino sanatâ, alteram Spinæ Dorsi curvaturam sibi conciliat, adeo, ut jam Vertebralis Columnæ flexura literatâ S referat. *Scoliosin* hanc deformitatem appellat, unice ex Rachitide oriundam, qua Thorax antè et Dorsum retro in gibbum attollitur.

Rachitidis Causâ Proximâ sublatâ, Ossâ, quæ, per morbi decursum emollita, in spongiosam massam intumuerant, nunc, ubi Terra nutriendis iisdem impenditur, ob Vasa Ossium nutritia, valdopere dilatata, magnâ subito Terræ copiâ replentur, et intra exigu-
tem-

temporis spatium majorem soliditatem acquirunt quam acquisivissent, si morbo hoc affecta nunquam fuissent. Manifesto id videtur in Ossibus aëditorum, qui primâ ætate Rachitide correpti fuerant; talia enim Ossâ substantiâ tam densâ et compactâ instructa sunt, ut ferrâ non nisi maximo labore adhibito dividi possint, et divisa eburneam densitatem referant. Major quoque Ossium, Rachitide longo jam tempore superatâ, crassities invenitur, iisdem enim alterâ lamella densissima ossea, ex Periosteio spongioso conflata, supernumeraria imponitur.

Cum autem, ubi Rachitis defuit, parvo temporis spatio, insignis molecularum Terreorum copia, vasis nutriendibus dilatatis, ad Ossâ feratur, hæc statim ita consolidantur, ut per totum reliquæ vitæ decursum ulterius corporis incrementum impediatur, et hæc ex causâ accidit, ut homo, qui primis annis Rachitide laboravit, nunquam postmodum ad eam staturæ proceritatem pertingat, quam, si morbo expertus mansisset, assecutus certe fuisset.

Patet exinde, cur homines, qui hoc morbo non pereunt, maxime si ultra quintum vitæ annum malum duraverit, postea gibbosi, nani, curvæ aut alio modo deformes, supersint.

C A P U T X I.

Mors ex Rachitide.

Morbi plurimi, et vix non omnes, qui genus humanum infestant, si machinam destruant et dissolvant; id putrida partium corruptione contingit. Contrarium observamus in iis, qui Rachitide correpti decedunt; Illorum enim cadavera etiam post mortem, non Alcalinum putredinis odorem; sed Acidos vapores exhalant, manifesto argumento, longe alia ratione ac in cæteris morbis, mortem illis infantibus obtigisse. Confirmatur hoc quoque Symptotatum, quæ per morbi decursum observantur, differentiâ.

In morbis cæteris enim, qui in machinæ interitum tendunt, particulæ corporis computrescere incipiunt, atque, dum in sua elementa resolvuntur, evoluti ighiculi, corporis calorem summopere adaugent, et particularum putrescentium volatilium acrimonia Cor et Vasa irritat atque Febrem accendit.

In Rachiticis vero corporis partes, Acido imbutæ, ab omni putredine arcentur, atque hinc etiam calor Corporis vix ullus advertitur, sed artus frigidi et pallidi observantur.

Pulsus non acceleratur, sed infra naturalem deprimitur et retardatur et per totum morbi decursum nulla Febris, (si lentam, quæ sub morbi finem quandoque accedit, Febriculam excipias,) observatur.

Si

Si in reliquis morbis, ex variis causis, quæ organa, disolutis partibus, destruunt, mors acceleretur; Rachitici aliâ longe ex causâ decedunt, nimirum ob viciatam digestionem et Acidi crudi abundantiam, præter vappidum Mucum nihil, ad nutriendum corpus impenditur; quo fit, ut Tabes universalis accedat; Fibra relaxetur et resolvatur, et omnis pedentim destruat Irritabilitas; æum, autem ab hac solâ vita hominis dependeat; eâdem destructâ, mors inæquatur necesse est; arteriæ enim, sanguini virtute insitâ promovendo impares, Cordi obicem ponunt, quem superare musculus vitalis, fibris jam tantopere debilitatis, nequit. Cessat ergo Sanguinis circulus, cessat vita.

Lenta, quæ sub morbi finem accedit, Febricula, non a sanguinis putridi particulis irritantibus, (sicut id in cæteris morbis contingit), provenit, sed a Cordis conatibus, quibus resistentem et ab Arteriis, in quibus omnis jamjam Irritabilitas destructa est, non promotum sanguinem propellere annititur, derivari debet. Accedit, quod Sanguinis circulo tantopere retardato, particula corruptæ organis excretoriis purgantibus e corpore non eliminantur, remaneant et paulatim quoque putredinis initia contrahant, quod dejectiones alvi putridæ fœtentes, quæ sub morbi finem observantur, aperte demonstrant.

S E C T I O I I I .

RACHITIDIS THERAPIA.

C A P U T X I I .

*Enumerantur Remedia, ad sanandam Rachitidem
a Medicis commendata.*

CUM, quæ circa Rachitidis Diagnosin et Prognosin hic loci dicenda forent, satis superque a Viris Clarissimis, qui de hoc morbo scripserunt, prolata sint; cum Celeb. Summi BOERHAVII Commentator SWIETENIUS spartam hanc fere totam exhausserit (3); cum denique in proposita Quæstione hoc argumentum, utpote sat cognitum et dilucidatum, urgeri non videatur; statim nunc, Rachitidis Indole et Causis expositis, ad partem Therapeuticam transeo, ac primo quidem, quæ a variis Autoribus Rachitidi opposita fuerunt, Remedia recenséo.

Plu-

(3) Comment. in *H. Boerhaave* Aphorismos de cognosc. et curandis morbis, Tom. V. pag. 592 et seq.

Plurima, quæ ad Rachitidem curandam propolita sunt, Medicamenta, e Regno Vegetabili depromuntur.

Rhabarbarum a GLISSONIO præcipue extollitur, (4) et ab aliis quoque Autoribus quamplurimis in hoc morbo exhibetur. (5)

FORDYCE Rachiticorum complures, dato omni mane pulvere ex Rhei granis tribus ad sex, et Salis Polychrestii granis decem sanavit; maxime autem hoc Medicamento ventrem subsedis affirmat (6). ZEVIANI vero Rhei radicem nunquam, nisi cum Ente Veneris conjunctam, salutares effectus edere affirmat. (7).

Radicem Rumicis Aquatici, quam Rhabarbari quoadque vires supplet, contra Rachitidem quidquam posse, suspicatur ROSENSTEINIUS (8).

Rubiæ Tinctorum radix, cum eandem ipsa ossa subire et colore rubro imbuere, experimentis confitisset, etiam ad Rachitidis, quam pro Ossium tantum

(4) Tractat. de Rachitide.

(5) Strack, de Rachitide in Act. Phys. Med. Hasfiacis. Vol. I. Art. 24.

(6) New inquiry into the causes of putrid and inflammatory Fevers.

(7) Della cura dei *Bambini* attaccati della Rachitide: Veron. 1761. et in Comment. Lipsi. Vol. 13. pag. 419.

(8) Loco citato. pag. 596.

um morbo vendicantur Medici, curationem translata fuit. Primus hanc radicem usui interno accommodavit LEVRET, qui cum Tartari solubilis uncia dimidia, radice Rubiæ tantundem, quatuorque libris decoqui curavit et, addito Melle, infantibus propinavit (9).

Plures habuit sectatores, inter quos ille ROSENSTEIN, Decoctum hujus Radicis, aqua tepidiusse dilutum, et Foeniculo atque Aurantiorum Corde conditum, pro potu ordinario subministrari Rachiticis voluit. (1) Infusum Rubiæ Radicis Decocto præfert HALLER (2). Nutrici propinatum hunc Medicamentum, si infans tenellus amarum decoctum respuit, Elutare invenit SICH (3).

Saxifragam, à Medicis Anglistis in hoc morbo tentatam, eventu frequenter respondisse meminit HALLER (4).

Herbas Scolopendriæ et Ruræ murariæ ad drachmas sex, aquâ ad unciarum decem remanentiam decoctas, Rachiticis prebet Cl. HARTMANN (5).

Idem

(9) l'Art des Accouchemens. pag. 289.

(1) L. C. pag. 594.

(2) L. C. pag. 197.

(3) Vid. Frnka, L. C. pag. 262.

(4) L. C. pag. 197.

(5) Formulæ Remediorum Lips. 1771. No. 697.

Idem etiam Corticem Tamarisci, aquâ infusam, emolumento fuisse refert (6).

Cicutam contra Rachitidem laudat Ill. STÖRK, et puerum, qui aliis remediis curari non potuerat, hoc remedio perfecte restituisse se affirmat, cum intra octiduum ad grana sex per dietam dosâ mixisset (7), postea Extractum Cicutæ cum Sapore Veneto et Syrupo Fumarie in pilularum formam redactum, cum successu adhibuit (8).

Idem etiam Aconiti Extracto Rachitidem et Spina Ventosâ omnino sublatam asserit (9).

Asam Fœtidam magnis laudibus excolit, et hac solâ binos fratres Rachiticos omnino sanatos esse memorat HALLER (1).

Glandium tostarum lene Decoctum, cujus virtutem tot morbis profligandis opponit SCHRÖEDER, ab Eodem etiam, ut idoneum Rachitidi curandæ Medicamentum, celebratur (2).

Corticem Peruvianum plurimum in hoc infantum

mor-

(6) L. C. pag. 771.

(7) Libell. de Cicutâ. Vindob. 1761. Casu 23. et 24.

(8) Mediz. pract. Unterricht fur Feld und Landwund-ärzte, Wien. 1776. theil II. pag. 197.

(9) Libell. de Stramonio, Hyosciano, Aconito. Viennæ 1762. pag. 110.

(1) L. C. pag. 197.

(2) Von den Wirkungen der Eichen pag. 28 — 33.

morbo valere, observationibus evictum testatur de HAEN (3).

Verum ob insignem Pharmaci amarorem, infantibus: sat magnâ quantitate ingeri non posse, doluit GELLEN (4).

Sale Essentiali Chinæ, per novem menses quotidie ad grana decem porrecto, morbum se profugasse affirmat ROSENSTEIN (5).

WEPSTER Fomentis et Enematis Corticis Decoctum cum successe adhibuit. (6)

Huc quoque referri debent Cortices, Herbæ, Radices plantarum indigenarum, quæ sæpius in Corticis Peruviani locum substituta cum fructu fuerunt; Cortices scilicet Quercûs, Salicis, (7); Radix Geturbani, Tormentillæ et herbæ Trifolii Fibrini, Centaurii minoris &c.

Alteri Medicamentorum classi, quæ ex Regno Fossili desumuntur, accensetur.

Martialis: Crocus Martis, Absorbentibus additus, valdopere à CAMPERO celebratur.

Cl.

(3) Ratio mœdendi.

(4) First lines of practics of Physick, Tom. IV.

(5) L. C. pag. 589.

(6) L. C. pag. 148.

(7) Ex Corticis Salicis Capræ balnea confecit, et decoctum Salicis Vitellinæ pro potu exhibuit Guetz, in disert. de Cort. Salicis.

CL. STRAK Limaturam Ferri cum Rheifradice commiscet, atque bis de die grana decem porrigit (8).

Sunt, qui, ob Ventriculi infantum Rachiticorum debilitatem, Martem in substantiâ disuadent et ideo eundem, Acidis Vegetabilibus solutum, exhibent. — Vinum Martis, (quod præparavit BOERHAAVIUS,) idem Vir Cl. ut remedium, Virginibus puerisque incomparabile prorsus, deprædicat (9) — Varia Vina Medicata, ex Chalybe, Aromatibus, Herbis Amaris et Adstringentibus confecta, commendant BOERHAVE (1), ARMSTRONG (2) et HALLER, (3). Si Vinum Martiale ingeri infantibus nequeat, Aquas Minerales, Ferratas, naturales vel arte factas, proponit ROSENSTEIN (4) — Flores Salis Ammoniaci Martiales, seu (quod idem est,) Ens Veneris *Boylei*, tanquam specificum Rachitidis remedium, proponuntur; semper se hoc Pharmaco feliciter usum esse, testatur ZEVIANI (5) et BOERHAAVIUS, illud ad

grā-

(8) Loco Citato.

(9) Elementa Chemiæ. L. B. Tom. II. pag. 445.

(1) Mater. Medic. ad § 1489.

(2) Über die gewöhnliche Kinder Kranckheiten und deren beandlung. pag. 103.

(3) L. C. pag. 197.

(4) L. C. pag. 598.

(5) L. C. pag. 129. et seq.

grana duo præscripsit et hanc dosin omni die exhibuit (6).

Flores Salis Ammoniaci, Cupri particulis sætos, dedit BENEVOLI, neque Medicamentum successu caruit, ut refert SWIETENIUS (7).

Mercurialia, a plerisque, tanquam perniciofa, in hoc morbo rejiciuntur; celebrantur tamen a Cl. BRÖMFIELD in initio morbi, qui glandularum obstructions hoc remedio referari, sibi falso persuadet (8).

Quando colluvies verminosa Rachitidi jungitur, Mercurialibus uti suadet VOGEL (9).

Antimonialia itidem in hoc morbo tentata sunt: Sulphur Auratum Antimonii, nempe Kermes Mineralis, et Vinum Antimoniatum *Huxhami*. — ÜNZER, loco bellariorum, Morculos Antimoniales infantibus Rachiticis porrigi suadet (1).

Alumen, inter Salia media, in Rachitide debellandâ quidquam posse, virtus constringens et roborans hujus Medicamenti commonstrare videtur: adhibetur aquâ,

(6) Mat. Med. ad §. Cit.

(7) In Comment. Tom. V. pag. 638.

(8) Chirurgical observations and Cases, vid. *Richters* Chirurg. Biblioth. B. II. ft. 2. pag. 137.

(9) Prælect. Cit. pag. 552.

(1) Der Artz. Tom. 8. pag. 187.

aquâ aut fero Lactis solutum, pro potu ordinario, vel majori Aluminis quantitate balneum paratur a quibusdam Angliæ Medicis (2).

Terrea, Acidum absorbentia, cum primum morbi effectum tollunt; plurimum illis a Medicis tributum est. Huc pertinet Creta, Lapides Cancrorum, Testæ Ovorum &c. Solo Ostracodermatum pulvere multos Rachiticos a se curatos, refert de HAEN (3), licet CULLENIVS ex hoc Medicamento nullum effectum se vidisse testetur (4); affirmat interim HALLERUS, folis adhibitis Terreis Rachiticum sanitati restitutum fuisse (5).

Alcalina Absorbentibus Terreis præfert ROSENSTEIN, qui solutionem semiuncie Salis Tartari in aquæ librâ unâ infantibus ad guttas 20 — 100 propinet (6). Decocto Corticis Periviani et Rubiæ radicis Sal Tartari addidit ABILGARD, atque hoc Medicamento puerum Rachiticum, ulceribus defœdatum, prorsus restituit (7).

Pauca sunt, quæ ex Regno Animali, ad Rachitidem debellandam idonea, reppererunt Medici.

Fel-

(2) Vid. *Wepfer* l. c. pag. 149.

(3) L. C. Tom. IX. pag. 248.

(4) L. C. pag. 256.

(5) *Disf.* citat. pag. 196.

(6) L. C. pag. 596. et seq.

(7) *Societ. Med. Havniensis Collect.* Vol. I. pag. 1.

Felle Taurino, in Pilularem formam redacto, uti sunt ROSENSTEIN et KNACK (8). Millepedum succum commendat METZER (9).

Chirurgia quoque olim ad sanandam Rachitidem partes suas contulit: Venæ sectiones, aurium in concha Scarificationes, Hirudines, Cucurbitulas, Fonticulos, Vesicatoria, (quis credidisset!) à veteribus Medicis in hoc morbo tentata refert GLISSONIUS (1).

Frictiones, quæ panno laneo, fumo *Masticæ*, Olibani, Styracis, Benzoës, imprægnato, instituuntur, utiles in Rachitide et salutares invenit HALLER (2).

HARTMANN varia Linimenta externæ corporis superficiei, maxime Abdomini et Spinæ dorsii illiniri vult (3). — HALLER Unguento de Styrace, Asæ Foetida, Spiritu Salis Ammoniaci, Spiritu Cochleariæ et Oleo Cinnamomi utitur (4). — Scoti Oleo, ex Hepate Scatinæ confecto, Rachiticos inungunt, eademque methodo plures sanasse se scribit WEPSTER (5).

C.A.

(8) L. C. pag. 597.

(9) Entwurff einer Medicina Ruralis in Comment. Lips. Tom 27. pag. 98.

(1) L. C. pag. 340 et Sequ.

(2) L. C. pag. 199.

(3) L. C. No. 603.

(4) L. C. pag. 200.

(5) L. C. pag. 149 et Sequ.

C A P U T X I I I

Remediorum Antirachiticorum Epicripsis.

Si de Remediorum in morbis efficaciam statuere certi quid velimus, etiam circa morbi Indolem et Causas ac circa Remediorum in corpus agendi modum edocti sumus, oportet. Quantum vero ab hac Dogmatica Medicinam excolendi methodo absumus, non est Medicus cordatus, qui nesciat, aut confiteri erubescat; plurima certe Medicamenta incertis Empyricorum periculis debemus; multa felix, sed fortuitus eventus fancivit; pauca sunt, quæ, adjuncta Ratiociniis Observatio detexit.

Remediorum, quæ ad debellandam Rachitidem commendantur, cumulus idcirco præcipue in tantam molem increvit, quod, iis adhibitis, morbus non raro desit; verum sæpissime non Medicamentis profligatus, sed vel Causis Occasionalibus remotis, vel dispositione corporis infantilis, faventibus circumstantiis, immutata.

Parum certe, et ausim affirmare, nihil ad sanandam Rachitidem contulerunt Herbae Scolopendriæ, Ruræ Murariæ, Saxifragæ, Rumicis Aquatici; cum vis harum plantarum adstringens tantilla sit, ut organis, tantopere relaxatis, constringendis et roborandis impares merito haberi debeant.

Asam foetidam, Cicutam, Aconitum, quæ tanquam *Antirachitica* ab HALLERO et STOERKIO extolluntur, plus certe nocuisse in hoc morbo, quam profuisse, affirmare non dubito; cum enim ob partium tonum imminutum Irritabilitas in corpore infantili Rachitico jam penitus destructa sit; quid, quæso, emolumenti ex his Pharmacis expectare possumus, quorum particulis vaporosis vim nerveam tantopere infringi, experimentis et observationibus constat?

Mercurialia huic morbo minime congruunt; cum enim Muco Animali ista unice fere solvantur atque eundem dein immutatum diversis viis e corpore educant, Mucus autem unicum sit infantis Rachitici nutrimentum; hoc etiam sublato, cesare penitus nutritio et mors accelerari debet; prosunt tamen in Rachiticorum Pædarthrocace, externe applicata.

Antimonialia, cum, maxime, si Acidis solvantur, tubum Intestinalem summâ irritatione afficiant; magnam humorum copiam illuc alliciunt et, his imbecilli corpori subtrahitis, robur ejusdem adhuc magis infringunt et nutritionem, vix non penitus cesstantem, omnino destruunt. Hinc e Remediorum *Antirachiticorum* numero proscribenda sunt, nisi eâ exhibeantur quantitate, quâ scilicet alvum non movent, sed circulationem perspirationemque adaugent.

Terra Absorbentes et *Alcalina* Remedia, cum Acidi vires infringant, emolumenti plurimum in
Ra-

Rachitide asserere, Medici crediderunt; neque inficior, aliquando ad sanandam Rachitidem partes suas consulisse; verum radicitus extirpatum malum his remediis esse, non mihi quis facile persuadeat, cum primariae morbi causae tollendae idonea non sint, licet pro tempore Acidum auferant.

Quae, ad vincendum morbum, *Chirurgia* suppeditavit, Subsidia, perniciosissima Rachiticis infantibus sunt; cum enim corporis Rachitici conditio a statu inflammatorio, ob fibræ animalis cohesionem maxime immutatam, remotissima sit; Venæsectiones, Scarificationes, Fonticuli etiam non tantum nihil ad sanandum morbum conferent, sed, detractâ humorum copiâ, malum potius augebunt.

Cum corporis *Frictiones*, moderatâ irritatione, tonum solidis partibus inducant, Irritabilitatem augeant, sanguinis Circulum promoveant; in Rachitide certe non sunt negligendæ; sed Inunctiones Oleorum, Linimentorum &c., cum, poris obstructis, perspirationem imminuant, damnandæ et rejiciendæ sunt.

Cum Primaria et Proxima morbi Causa in Hepatis volumine, præter naturam aucto; vasis ejusdem dilatatis; Bile inertî et aquosâ, hoc organo secretâ, consistat; omnia illa Medicamenta, quæ huic organo pristinam soliditatem conciliant, efficiunt, ut Bilis concentrata, digerendis alimentis idonea, secernatur atque ita morbum profligabunt.

Quæ *Regnum Vegetabile* subministrat, *Medicamenta Amara et Adstringentia*, huic scopo maxime conveniunt, quo referri debent *Herba Gentianæ, Centaurii, Menyanthes trifoliatæ, Cortices Quercûs, Salicis &c.* Radices *Rhei*, præcipue vero *Cortex Cinchonæ*; quæ, humoribus *Intestinorum* inquinatis extracta, sanguini admiscentur, fibram *Animalem* roborant et adstringunt.

Præsentissimum vero in hoc morbo *Remedium Martialia* exhibent, utpote, quæ non tantum fibras constringendi virtute pollent, sed crudis etiam *Intestinorum Acidis* facillime solvuntur et magnam *Phlogisti* quantitatem in *Intestinis* extricant, quod in *Rachiticis* tantopere desideratur.

C A P U T X I V.

Qua Ratione Rachitis præcaveatur.

Corpus Sanum a morbis *Pharmaca* tueri nequeunt, cum hæc ipsa insigni corpus immutandi vi polleant; atque ideo, quemadmodum virtute suâ corpus ægrum ad sanitatem perducunt; ita sanum morbose afficiunt. *Præcaveatur* itaque morbus, non porrectis *Medicamentis*, sed remotis, quæ, unâ cum peculiari corporis indole, morbum creant, *Causis*.

Si

Si vero corporis habitus ita jam præter naturam immutatus sit, ut ad morbum producendum solâ Causâ Occasionali indigeat, hæc morbosa Dispositio utique Medicamentis corrigenda erit; cognoscitur autem hæc infantum ad suspiciendam Rachitidem proclivitas, si Cutis flaccidior, rugosa dependeat; si Facies tumore aqueo pallido infletur; si morosus infans sit et plactus semper continuet; si pedibus insistere recuset; aut, ubi jam incesit, nunc subito ignavus ab incesu desistat; si esuriens cibos semper appetat, et iisdem, licet magnâ copiâ ingurgitatis, saturari tamen nequeat; si alvus liquida sit, et vermes deiciat.

Nulla ætas ad suscipiendum hunc morbum idonea est, præter primam infantiam; hæc autem indoles corporis infantilis Naturæ legibus convenit, nec aliâ esse, quin ad alios morbos dispositio nascatur, potest; laxus nimirum corporis habitus; Jecinoris insigne volumen; quæ in infantibus omnibus, etiam sanissimis, observantur, ita sunt huic ætati propria, ut abesse ab eâ, sine summo sanitatis detrimento, nequeant; cum enim corporis infantilis sanitas unice in eo posita sit, ut vegetet; atque nutritione indies auctâ, Organa ad quemdam perfectionis gradum cito pertingant, si Medicamentis laxum corporis habitum immutare, aut Organorum fabricam justo magis consolidare tentemus, incremento corporis, ac proin sanitati infantis summum damnum inferemus; ideo

enim præcipue Hepar infantis tantum volumen complectitur, ut Bilis dilutior secernatur, quæ, ad generandam Acidi Phosphorei majorem quantitatem inepta, efficit, ut Organa non tam cito Calce Phosphorata impleantur atque ita corporis incrementum impediatur. — Pater ex his, illum corporis habitum, qui ad Rachitidem prædisponit, sanissimam sæpe esse corporis infantilis constitutionem, ac proinde Medicamentis Prophylacticis uti, perinde esset, ac aliud perniciosius malum creare.

Methodus igitur infantes sanos a Rachitide præcavendi sola superest, ut Causæ Occasionales removeantur, quæ, in corpus infantile sat fortiter agentes, hunc morbum necessario producunt. Inter has primo loco venit Atmosphæra humida et calida, quæ corporis structuram laxissimam reddit, secretiones vitiat atque ita Rachitidem provocat.

In Regionibus Batavis, ubi aquæ inundantes et in vapores resolutæ, aërem replent; ubi proin Atmosphæra humidissima incolarum corpus circumdat; ubi omni momento insignem aquæ copiam et Cutis et Pulmonum Absorbentibus Vasis suscipiunt, contra tam frequentem vehementempue morbi Causam parum potest Medicina; multum certe Magistratus posset, si stagnantes aquas exsiccare aut aliâ ratione amoveri, juberent.

Quantum non ingrescunt hujus mali Causæ, si

Qk

Civitates, in his Provinciis sitas, consideremus? **Aër** in istis jam vaporum aquosorum copiâ scater; alia præterea mœniis includitur; domus elatiores angustas plateas complectuntur; stagnat itaque **Aër** et tot incolarum halitu ac perspiratione de novo inficitur; accedunt vapores Paludum et Fontium; Pecudum stabulantium exhalationes; Cloacarum putrescentium foeda effluvia, atque inde **Atmosphæra**, jam aqueis particulis foeta, his pestiferis halitibus imprægnatur et quasi saturatur; ita accidit, ut corpus hominum, his mœniis detentorum, neque libere perspiret, neque se partibus corruptis exoneret, sed novas continuo partes aquosas et putrescentes resorbeat.

Si denique in Civitatibus istis populatissimis pauperum domicilia inspiciamus; (angusta, sordida, subterranea, aquis stagnantibus immersa, humidissima); mirum certe non est, si, ita auctâ mali Causâ, in pauperum tabernis infans non inveniatur, qui vitio Rachitico immunis existat.

Cum, quò magis augetur populus, tanto magis quoque increseat civium gibbosorum, curvorum, nanorum numerus, qui ad labores publicos inhabiles, sibi alendis impares, ære publico sustentari debeant; eo sane omnis Magistratuum cura dirigenda foret, ut hoc malum, quod magis in dies, non sine summo Reipublicæ detrimento, ingravescit et generis humani progeniem corrumpit, imminuatur. Nihil hic Medi-

cina prodest, cum Causas, continuo in corpus agentes, remove nequeat, cum ingens hic conventat Causarum caterva, quas aut corrigere aut destruere velle, labor æque inanis esset, ac Rhenum fluvium exhaustire.

Licet verò tollere Causas omnino nequeamus, facilius tamen easdem evitare et earundem perniciosum effectum fugere possumus. Magnum certe Provinciarum emolumentum foret, si Reipublicæ Antistites amplum extra mœnia domicilium exstrui curarent, in quo infantibus, primis vitæ annis, degere liceret, donec, corpore satis firmato, omne Rachitidis periculum evasisent. Ampla hæc domus sit, oportet, et loco elatiori sita, aëri libero transitus pateat, atque omnia aquarum stagnantium effluvia procul arceantur. Ita certe continget, ut, imminuto civium deformium numero, exiguis his sumptibus, majores Respublica effugiat.

Ditiores istarum Civitatum Incolæ neonatos infantes non hypocausto, terræ vicino, includant, sed in elatiores ædium partes transportent. Cubiculum, quo primis vitæ annis infantes detinentur, sit amplum, spatiosum, ventilatoribus et camino instructum, ut aër continuo renoveatur. Fundus arenâ, furno calectissimo exsiccatâ, conspergatur, cum experientiâ evictum sit, arenam siccam vapores, aëre solutos, potentius attrahere, atque ita Atmosphæram
pu-

puriorē reddi (6). Absint odores Mastiches, Stryracis et Fumigationes quæcunque, quæ humidis et heterogeneis particulis aërem replent, atque ita liberiorē perspirationem impediunt; juvat interim Juniperi frutex, vivā flammā deflagrans, quo, cubiculi aëre rarecente, particulæ heterogeneæ præcipitantur.

Infans non lecto, ex plumis confecto, foveatur, sed reponatur sacco, paleis repleto, quorum plures ad manus sint, ut, si unus urinâ madeat, altero facile commutari queat.

Maximæ vero parentibus curæ sit, ut infantis corpus non diu madidis linteis aut lecto, urinâ humido, immoretur; novis semper commutentur, neque madida in eodem cubiculo exsiccantur.

Ad alimenta quod attinet, et quæ etiam non raro Causam Rachitidis Remotam sistunt, Lac maternum optimum est neonato alimentum, ut jam supra demonstravi; si vero mater lactare infantem omnino non possit; conducatur ipsi nutrix sana, robusta, quæ eodem circiter tempore, ac mater peperit; nihil enim Lacte veterano effictæ nutricis infanti perniciosius. Si infantes dimidio anno majores sint, quan-

(6) Hoc solo Remedio Scorbutum, ergastulo monasteriensi semper infestum, penitus profligavit C. L. HOFMANN, Vid. Tractatus Vom SCHARBOCK.

quandoque Vini rubri haustus, lenia Aromata, pultibus, ex Lacte et Pane biscocto confectis, admista, ac repetitæ sæpius corporis Frictiones conducent.

C A P U T X V.

Qua Ratione Rachitidi medeamur.

Si de curâ Rachitidis agatur, duo hujus morbi stadia necessario distingui debent.

Primum est: Si corporis infantilis Tabes et Inertia observatur; si Abdomen inflatur; si Perspiratio acidum redoleat; si Fæces viridescentes alvo dejiciantur. *Alterum* est: Si hæc Symptomata augeantur, si Osium Epiphyses intumescant; si Costarum extrema nodosa observentur; si Frontis pars superior protrahatur; si Capitis moles augeatur atque in latus alterutrum devolvatur; si Alvus penitus obstruatur; si Ossa incurventur; si denique lenta Febricula et Sudores Acidi profusi accedant.

In primo morbi stadio, ad sanandum morbum, Pharmacia non indigemus, sed, subsidiis Diæteticiis ut plurimum perfecta sanitas restituitur. Quare primo ab humidâ et simul calidâ Atmosphærâ infantes arceantur, atque ratione loci, quo detinentur, ita tractentur, sicut priori Capite indicavi.

In

In initio morbi Bilis diluta tantum est, neque digestioni adeo idonea; verum non omnino deficit; demonstrant hoc Excrementa alvina, quæ ideo viridescunt, quia Bilis, Acido commixta, viridem colorem assumere solet.

Lac ergo infantibus, in primo morbi stadio constitutis, subito subtrahatur, et jam non amplius, nec Lacte materno nec Lacte pecudum pascantur, cum indigestum acescat et morbum adaugeat.

Neque etiam Jus carniū, neque Panis biscocutus aquā maceratus, infantibus istis convenit; cum, ut experientiā novimus, hæc Juscula cito acidam fermentationem subeant et hinc, Bile aquosiori non subacta, morbum deteriore[m] reddant.

Optimum et, quod par sibi non habet, nutrimentum infantibus in primo Rachitidis stadio constitutis est, Emulsio, quæ paratur Ovi Vitello, si parvā facturi quantitate additā, cum aquæ librā unā conteratur et infantibus pro potu ordinario subministratur. Primis vitæ mensibus, Lac istud artificiale sufficit, neque ulterius quidquam ad nutritionem requiritur; Si vero primos menses jamdum excesserit infans; tunc etiam Ovi albumen, Saccharo tritum, in cibum præberi potest; præterea autem sollicitè caveatur, ne Vegetabilia quæcunque aut cibi infantibus ingerantur, qui suā in ventriculo morā acescunt; omnis potius cura in eo versetur, ut victu Animali infantes vescantur, qui in
pu-

Putridam potius corruptionem, quam in Acidam fermentationem, abit.

Hæc, ex Ovo Gallinæ parata, Rachiticis alimentis, pluries optimum effectum edidisse, expertus sum; jam enim subito Acidum non eructabatur amplius; cessavit Diarrhæa viridescens; lusus corporis habitus, spe citius, disparuit et pristina sanitas artuumque agilitas rediit. — Neque etiam mirum hoc cuiquam videri potest, qui perpenderit, imbecilles esse digestionis in infantibus vires, et nihil certe digestu difficilius esse Acidis Vegetabilibus, cum hæc unica sint, quæ, peractâ sani hominis digestionis, penitus immutata reperiuntur. Ovum autem Gallinæ nunquam acescit, sed, si corrumpitur, computrescit; atque ideo ventriculo infantili immisum, tantas non requirit digestionis vires, cum, ex quibus constat, elementa proxima jam ad nutriendum corpus aptissima sint, neque ulteriori digestionis aut immutationis indigeant.

Cum in Rachitidis curatione Vegetabilia quæcumque, Lacticinia, Jura carniū et Panis Biscocti pul-
tes, omnino, ut perniciofa, damnum ac prohibeam; si infans Rachiticus jam anno dimidio major sit et ad sustentationem majorem alimentorum copiam requiratur, tenellas animalium carnes ita adaptatas, ut ingeri facile queant, reliquis cibis præfero: pertinet huc maxime commistio alba CLERKII, quam tamen
ita

ita immuto, ut hunc morbo magis congruat; Carnis nempe albi Caponis, aut Gallinæ asatæ sine pelle et pinguedine unciam unam, additis Ovi Vitellis duobus, in mortario lapideo cum aquæ fontanæ librâ unâ conteritur in pulvem, et dein Eleosaccharo Citri condire cibum, jubeo; ex hoc pulmento ter vel quater de die congrua quantitas infantibus ingeri potest; facile illum assument et facillime digerunt atque inde corpori vires et sanitas brevi tempore restituitur.

Nihil hic Medicamenta juvant, quæ difficulter infantibus ingeruntur et primam morbi Causam vix unquam auferunt.

Peccant autem graviter Medici plerique, qui, cum Ructus et Vomitus infantum Rachiticorum atque iteratas et acescentes videant alvi Dejectiones, fordibus expurgandis unice intenti, repetitis vicibus vel Rhabarbaro vel Sapone Veneto vel alio Medicamento purgante, alvum ducunt; non enim hi morbi Causam tollunt, sed contra morbi Effectum militant, continuo rediturum, si a Purgante desistant; quid? quod Intestina adhuc hac medendi methodo magis debilitant ac digestionis vires infringunt atque ita pejorem morbi statum relinquunt.

Non equidem inficior, non nunquam in hoc morbo Medicamentis alvum laxantibus opus esse; quin imo non rari sunt casus, ubi infesta fordium Symptomata tale Medicamentum necessario requirunt; maxime,

si

si Vermium magna copia Intestina vehementius irriter. Si signa Vermium adsint, tunc utique primo aut Seminis Saxtonici decoctum, aut Fel Tauri, aquâ solutum, adjecto Melle, præbeo et deinde ex granis Resinæ Jalappæ tribus ad quinque et Ovi Vitelli sufficiente quantitate emulsionem confectam ingeri jubeo. Hoc autem Medicamento non utor, nisi id necessitas postulet; neque enim eo adducor, si Vermes alvo excernantur; non enim ignoro, eosdem Mucos intestinali vappido generari et hinc morbi Effectum esse, qui non, nisi sublata Causâ, cessat.

Balnea quæcunque infantibus Rachiticis perniciofa sunt; juvat autem, eos sæpius aquæ frigidissimæ subito immergere et retrahere celeriter; panno lanaeo corpus fricare; hæc enim ratione tonus partium resolutarum restituitur et Irritabilitas augetur.

Ubi autem stadium morbi secundum apparuit; Ossa emollita et tumefacta summam non tantum, organorum laxitatem, sed et corruptam omnino nutritionem indicant; Terreis enim particulis deficientibus, vappidus ubique Mucus cellulis apponitur, id, quod crassa mucosa, quâ Ossa investiuntur, manifesto demonstrat.

Ut ergo in hoc stadio cura perficiatur, duplex facienda indicatio est: primo, ut morbi Causa Proxima tollatur; deinde, ut Corporis partes, tantopere relaxatæ, consolidentur. Quod ut fiat, circa Causas Externas amovendas et circa præsidia Dietetici-

ea idem observandum, quod ad præcavendam Rachitidem suasi et quæ in primo morbi stadio adhibenda proposui.

Iuvat deinde Medicamentis Amaris et Adstringentibus curam absolvere, inter quæ primo consideranda veniunt Herbæ, Cortices et Radices Amarae, quæ à variis Medicis in hoc morbo laudata, jam supra memini.

Notandum tamen, quæ ex his Vegetabilibus parantur, Tincturas et Extracta, eisdem in substantiâ exhibitis, multum anteponenda esse, cum pulvis, ventriculo et intestinis ingestus, Vappido Mucos quasi involvatur et, indigestus, iterum alvo excernatur. Præstant Tinctura Rhei aquosa, Extracta Corticis Peruviani, Gentianæ, Trifolii Fibrini &c. Quæ, aquâ soluta, addito Syrupio quocunque, propinentur. Ea tamen tantum istorum Medicamentorum quantitas infantibus ingeratur, quæ alvum non solvat, cum inde plus damni, quam emolumentî, oriatur; siquidem magna humorum copia in intestina alliciatur atque alvo dein excernatur.

Inter omnia vero Medicamenta Antirachitica principem locum tenent Martialia; cum enim digestionis vires in Rachiticis tantopere infractæ sint, Vegetabilia quæcunque, quin ipsa etiam Plantarum Amararum Extracta, longiore in intestinis morâ, Acidum contrahent.

Quæ

Quæ vero ex Chalybe parantur, Pharmaca, idcirco prærogativam merentur: primo, quod Acidum non generent, sed potius resorbeant; secundo, quod, Acidis soluta, maximum constituent Adstringens et Roborans Medicamentum; tertio, quod eadem, cum Acidis unita, magnam Phlogisti copiam extricent, quod in corpore Infantili Rachitico tantopere desideratur.

Atque inde etiam, licet omnino non negem, posse Martialibus, succis Vegetabilium vel Vino solutis, optatissimos in Rachitide effectus edi; ego tamen Chalybem in substantiâ præfero, atque Limaturæ Martis Alcoholisatæ grana duo ad decem, pultaceis infantum, ex Animali regno defumtis, Medicamentis commista, ter, quaterve quotidie ingeri jubeo. Aquæ Ferratæ Pyrmontanæ, Swalbacenses, Emsenses et cæteræ ad sanandam Rachitidem jure merito commendantur; cum, Acido tantum aëreo solutus, Chalybs, magnâ adhuc Phlogisti quantitate gaudeat et Acidis crudis, quæ primis infantum Rachiticorum viis continentur, relicto Acido Aëreo, facile uniatur.

Si infans, Rachitide laborans, Dentibus jam instructus sit, curandum est, ne carie exedantur; cum enim halitus Rachiticorum Acidis particulis plurimis imprægnatus sit, vapores autem Acidi ipsam Vitream Dentium substantiam corrodant; hæc unicâ ex causâ fit, ut Dentes penitus destruantur; sicut uberius de-

mon-

monstravit *Ill.* WEDEKIND, (8) præservari autem à carie facile possunt, si bis terve per diem pulvere Dentifricio Absorbente aut Alcalino dentes fricentur; præscripsit hunc in finem *Vir. Celeb.* pulverem ex Corallorum Rubrorum et radicis Calami Aromatici semjunciâ, vel crustam panis tostam, cum Tabaci cineribus mistam, aut Oleum Tartari per deliquium, aquâ dilutum, (9) quibus palliatis auxiliis Dentes a corruptione potentissimum præservantur.

Si frequens adsit Alvi Fluxus; vel Medicamentis Amaris vel Aquâ Calcis, largius epotâ, sistatur, ne tantâ humorum jacturâ malum indies ingravescat.

Si vero alvus pertinacius obstructa sit, exhibeatur Tinctura Rhei, Vino Martis adjecto, ut tonus Intestinorum restituatur augeaturque; præ cæteris verò immersiones in aquam frigidam et frictiones, sæpius repetitæ, commendari merentur.

E X-

(8) Aufsatze über verschiedene wichtige gegenstände der Arzneiwissenschaft. Pag. 382.

(9) Ibidem pag. 385.

EXPLICATIO TABULAE.

ETIAMSI superfluum videri posset, hanc de Rachitide Commentationem Tabulâ illustrare; vereor tamen magnopere, ne, quæ circa singularem osium Rachiticorum Indolem retuli, satis intelligantur, cum a nemine adhuc Medico has maximi momenti Observationes aut institutas aut evulgatas memini; atque idcirco

Fig. I. Os Frontale sani infantis trium circiter mensium exhibet, ut Osis totius et densitas et naturalis crassities appareat; maxime autem, ut Sutura Frontalis, quæ hoc ætatis termino adhuc superest, vera conditio conspiciatur.

Fig. II. Os Frontale infantis Rachitici ejusdem ætatis ostenditur. Hic statim oculo se exhibet

a.) Spongiosa illa fabrica, quæ tam in parte crani; exteriore, quam

b.) ad interiorem Osis Frontalis laminam observatur. Hanc Spongiosam fabricam, maxime laminæ mucosæ supernumerariæ, ipsis laminis osseis densioribus et compactioribus impositæ, deberi, supra (Capite III.) memini.

c. c.)

c. c.) Sunt confinia hujus laminæ, quæ, sensim sensimque attenuata, versus densiorem Ossium substantiam definit.

d. d.) Præcipue autem nostram attentionem meretur Sutura præternaturalis crassities, quæ, si cum illâ sani infantis (Fig. I. delineatâ) conferatur, triplo volumine increvit. Spongiosissima Ossis hoc loco fabrica est, et lacunis porisque interjectis conspicua. Maximam partem a supernumerariis laminis efformatur, sicut exhibet

Fig. III. Idem Os Frontis repræsentatur concavâ interiore parte, ut lamina supernumeraria appareat.

Scilicet, si Sutura Frontalis inspicitur, et calvariæ externam convexam partem et interiorem concavam, hâc laminâ vel potius membranâ mucosâ investiri, adnotatur.

Culro idcirco has utrasque, Osseo Cranio adhærentes, Membranas separavi, et hic depingi curavi; videtur in hâc Figurâ, si Sutura Frontalis lustratur, a. a. lamina Mucosa exterior, quæ albidâ et porosâ suâ substantiâ a densiori Osse subjecto facile distinguitur.

Maxime autem conspicua exhibetur Crusta Mucosa Rachitica, quæ totam interiorem Ossis Frontis superficiem tegit, et quæ

b. b. hic, pro parte reflexa, exhibetur, ut, hâc semotâ, vera ossis interior et densior lamina appareat.

Insignis adeo est Spuriæ hujus Crustæ crassities, ut fere dimidiam crassitie Suture partem efficiat porosa, spongiosissima, quæ, sensim attenuata, in oculorum Orbitis evanescit. Ubi illam cultro discidi, tres fere lineas crassitie continet, et ubi interiori osseæ laminæ adhæret, tota lacunosa est et rarissimam compagem ostendit.

Ossa Rachitica, quæ hic depinxi, per annum jam et quot excedit, dilutiori Vini spiritu aservo, qui Cupri particulis imprægnatus fuit. Acido, quo Cuprum solutum fuit, Terræ Calcareæ Ossis conjuncto et præcipitatis Cupri particulis, Os viridem colorem induit, cum Crusta Mucosa, Ossi viridi superstrata, alba remansisset.

Quando Rachitis desit et corporis nutritio restituitur, hæc strata mucosa, quæ Ossibus corporis plerisque, hoc morbo affectis, insternuntur, magnâ subito materiæ Terreæ copiâ replentur et in Os densissimum commutantur.

Hinc Ossa, Rachitide prius affecta, postmodum densissima et quasi eburnea evadunt. Est mihi Cranium Fœminæ 50 annorum, quæ in infanti Rachitide laboravit, quod, ultra pollicem crassum, totum ex compactâ osseâ substantiâ conflatur, ponderosissimum. — Crassio rem et multo ponderosio rem calvariam Collectio Academiæ Imperialis N. C., continet Erfordiæ.

Fig.

Fig. IV. Os Occipitis pueri quinquennis repræsentat, qui, longo tempore Rachitide affectus, alio postea ex morbo decessit.

Notatu dignissima est hæc Ossis deformitas, quam Rachitis induxit :

a. a. b. b. supersunt adhuc distincta vestigia, quibus

BB. partes Ossis Occipitis Condylodeæ, ab

A. processu hujus Ossis Basilari et a

C. parte Occipitali separantur.

Partes Condylodeæ ab interiori latere, Foramini Occipitali vicino, totæ intropressæ conspiciuntur, adeo ut ex utrâque parte

d. d. fovea sat notabilis appareat, atque hinc fit, ut Synchronos a. a. b. b. diductæ, nondum in unum continuum os coaluerint.

Hæc partium Condylodearum præternaturalis intropressio necessario efficit, ut et Cerebellum, et Protuberantia cerebri Annularis comprimatur, atque in hæc partium Rachitidis causa quæri debet, cum Encephali partes nobilissimæ afficiantur.

Cæterum, si morbus non per annos continuaverit, tanta Cranii deformatio non reperietur, et e contrario aucta Capitis moles efficiet, ut homines hoc morbo antea affecti, nunc ingenio et sagacitate excellent.

F I N I S.

GENEESKUNDIGE VERHANDELING
OVER DE
ENGELSCH E ZIEKTE,

TER BEANTWOORDING DER
V R A A G
VAN HET
PROVINCIAAL UTRECHTSCH GENOOTSCHAP
VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN.

„ Welke is de Aart van de RACHITIS of zooge-
„ naamde ENGELSCH E ZIEKTE”? Welke zijn hare
„ Oorzaken? Welke zijn de Redenen, dat dezelve zig
„ doorgaans in de allereerste Kindsheid ontdekt, zo
„ dat men de eerste beginselen zelden naa het derde
„ levensjaar der Kinderen bespeurt? Welke zijn
„ hare Kenmerken? Welke hare Toevallen? Welke is
„ hare Voorzegging? Kan menze voor eenige Midde-
„ len voorkomen, zo ja, door welke? Welke zijn de
„ beste Middelen tot hare Geneezing?

Onder de Zinspreuk

NATURAM SENSUS, RATIONE FULTI, REVELANT.


D O O R

J. F. ACKERMANN,

*M. D. Medelid van het Geneeskundig Genootschap
te Mentz.*

Waar aan in het jaar MDCCXCII. eene Zilveren
Medaille als een *Accesit* is toegewezen.

Uit het Latijn overgezet.



B R I E F

AAN HET GENOOTSCHAP VAN KUNSTEN EN WETENSCHAPPEN

T E U T R E C H T.

Z EER *Vermaarde Mannen!* Het Vraagstuk, door U der geleerden Waereld ter oplossing voorgesteld, is voorwaar van zo groot een gewigt, dat ik twijfele, of er in het zo uitgebreide vak der Geneeskunde eene stoffe te vinden zij, die zo veel tot welzijn van 't menschedom kan toebrengen.

Gij begeert, dat de Aart der *Engelsche Ziekte* juist bepaald; hare Oorzaken en eigenaartige Kenmerken aangetoond werden; Dat men de gesteldheid des lighaams, naa de Ziekte, afschetsse en voldoende Reden geve, waarom deeze ziekte zelden kinderen, boven drie jaaren oud, aantast; en aantone, of, en hoe, deeze kwaal kan voorgekomen worden; eindelijk welke de beste Middelen ter Geneezing zijn.

Om aan deeze Vraagstukken, naar mijn vermogen, te voldoen, heb ik dezen gewigtigen taak dus aangevangen; dat ik, eerstelijk, naauwkeurig opgeve, wat men bij deeze Lijderen door onze zinnen ontdekken kan — en daarna bijvoege, wat ik uit Waarneemingen door de Reden, en met mijn Oordeel heb kunnen afleiden, -

Ik

Ik heb deeze Verhandeling in drie deelen onderscheiden: in de *Eerste Afdeeling* word de Aart der Engelsche Ziekte ontvouwt; de *Twæde* bevat haare Oorzaken; in de *Derde* word de Genees-kundige Verhandeling opengelegt.

Ter ontvouwing van den Aart der Engelsche Ziekte, heb ik nodig geoordeeld, (naa de verschijnselen, die, zo wel in de zieke Kinderen, zelfs als in de Ontlede Lijken van de Kinderen, die aan deeze Ziekte gestorven zijn, waargenomen worden, te hebben laten voorafgaan) de Phijfiologische grondstellingen der Voeding, zo als die in de laatste vijf jaren door de vlijt der Ontleedkundigen ontdekt zijn, uit te leggen, om daar uit den Aart der ziekte zelve te kunnen afleiden.

In het volgend Hoofddeel heb ik, na ontwikkeling der Oorzaken, de gestelheid des Lighaams, die na de Engelsche Ziekte overblijft, beschreven en te gelijk Reden gegeven, waarom deeze Ziekte zo zelden een driejarig kind aantast.

Eindelijk heb ik in de laatste Afdeeling de wijze, waarop de Engelsche Ziekte kan voorgekomen worden te gelijk met haare eenvoudigste en veiligste Geneeswijze opgegeven.

Het zij U, *zer Verinaarde Mannen!* ter beoordeeling overgelaten of deeze mijne pogingen aan Uw billijken wensch voldoen.

Vaart Wel,

E E E

EERSTEAFDDEELING.

De Aart der Engelsche - Ziekte.

DAAR het in alle Ziekten des menschelijken lighaams moeilijk of zelfs volstrekt onmogelijk is, den Aart der ziekte zelve te kennen en te doorgronden, ten zij men de Veranderingen, die het lighaam tegennatuurlijk ondergaat, regt bevatte; zo is het vooral noodzakelijk, ter ontwikkeling van den Aart der Engelsche Ziekte, daar op te letten; vermits deeze Ziekte, die zich zelve, door zo veele en zo groote veranderingen in het lighaam ontdekt, hoop geeft, dat men omtrent haar Aart en Oorzaken zekere grondstellingen zal kunnen bepalen. — Want dat de Aart van veele Ziekten tot nu toe den Geneeskundigen onbekend is; moeten wij dit vooral in deeze twee redenen zoeken; deels, omdat bijna geene Phijfieke veranderingen in het lighaam zig lieten zien; deels, omdat het moeilijk was de algemeene Toevallen van de bijzondere eigenaartige Kenmerken der Ziekte te onderscheiden; waardoor niet zelden de beoordeeling zelve twijfelagtig was.

E E R.

E E R S T E H O O F D - S T U K.

De Gesteldheid van een Kind, tot de Engelsche Ziekte heeft.

De Ziekte, die ik mij voorgenomen heb te beschrijven, behoort tot de ziekten der Kinderen; immers tast zij nooit Bejaarden aan, offchoon veele Schrijvers, eene zeer zeldzame Ziekte, waar voor Jongelingen zo wel als Volwasfenen bloot liggen, uit hoofde der overeenkomst van zommige Toevallen, met den zelfden naam bestempeld hebben.

De Engelsche Ziekte is nimmer aangeboren en er verlopen meestal ten minsten twee of drie maanden naa de geboorte, eer de zekere Kenmerken der Ziekte zich aan den Geneesheer doen zien. (1)

Naar het mij voorkomt, kan deeze Ziekte zeer eigenaartig in twee Tijdperken verdeeld worden, waar

(1) SICH1 heeft eene aangeboren Engelsche Ziekte waargenomen, en STORCHIUS verzekerd, dat er sommige kinderen mede ter waereld komen. Zie TRNKA KRZOWITZ Historia Rachitidis. pag. 155. — Dan deeze en gelijkzoortige Waarneemingen zijn naauwliks geloofwaardig, vermits zij of over den Aart der Ziekte getwijfeld hebben, of deeze Ziekte is kort na de geboorte ontstaan.

waar van het laatste met de zwelling en kromming der Beenderen begint.

Daar de aanleidende Oorzaken niet zelden het grootste gedeelte der Ziekte bevatten; gebeurt het zelden, dat de Geneesheer, uit de lichaamsgesteldheid van een gezond kind, eenige Voorgeschiedenis tot deeze Ziekte kan vermoeden.

Zeer dikwijls tast deeze Kwaal de gezondste kinderen aan; als dezelve begint, schreeuwt het kind, door eene ongewoone pijn gemarteld, bijna zonder ophouden; — de kleur van zijne tronie veranderd reeds in de eerste dagen en is of uitermate bleek of morsig geel; weldra zwelt de buik op en binnen weinig tijds is zij uitermaten zeer gespannen; vooral is de bovenbuik aan de rechterzijde zeer opgezet en buitengewoon hard; het ligchaam vermagerd, zo zelfs dat een kind, dat te voren verwas, nu lelijk werd van de rimpels en de gedaante heeft van een oud mannetje; vooral vermageren de ledematen en teeren zodanig uit, dat zij als uit Beenderen alleen schijnen te bestaan; des nagts slapen zij bijna nooit, en als zij slapen, ontwaaken zij schielijk met groot geschreeuw; zij zijn meestal hongerig, en hoewel zij gestadig eeten en drinken, worden zij echter nimmer verzadigt; zuure oprispingen zijn gepaard met gemakkelijk braken van de gestremde melk; hun afgang bestaat

uit

uit verschillende deelen, waarvan andere vloeibaar zijn, en waarin kleine stukjes drijven; de afgang riekt zuur; de Pis is strak, gelijk die der runderen.

Men kan niet zeker bepalen, hoe lang dit eerste Tijdperk duurt, vermits het zelve, na mate er veele Toevallen te samen lopen en het geweld der Oorzaken verschillend, vroeger of later eindigt. — Dikwerf neemt de fletsheid des lighaams en de vermagering zeer spoedig toe, en daar komt eene groote logheid en onmagt tot beweeging bij, wilende deeze kinderen niet staan en gaande zelfs waggelen zij met zekere bevreesdheid.

Ter zelve tijd bespeurd men zwelling in de gewrigten en uitpuiling van de aengroeijselen der Beenderen, die gewoonlijk het eerst in de gewrigten der bovenste ledematen ontdekt word, vooral in het gewrigt der Voorhand met de *Radius* en *Ulna*; kort daarna zwellen de Enkels; dan zetten de einden der Ribben, daar zij zich met de Kraakbeenderen vereenigen, als knobbeltjes uit, en men vind niet zelden de hoofdjcs der kleine beenderen van de Agterhand en Agtervoet gezwollen.

Wanneer de Ziekte dus verre gevorderd is; word het Hoofd grooter en krijgt eene bijzondere gedaante, die deeze Ziekte kenmerkt. — Want het Voorhoofd puilt, ter plaatse daar het hoofdhair begint, zodanig uit, dat het overige schuins naar de

Oog-

Oogholten inloopt. — De bolle en ronde gedaante des voorhoofds word plat, en van weerenskanten zijn de voorhoofdsbuilen eenigermate verheven. — Het bekkeneel word grooter, zo, dat er ongelijke en niet geëvenredigde uitpuilingen in het agterste gedeelte des hoofds bespeurd worden — de Naden gapen en de Fontanel word wijder; door deeze uitzetting word het hoofd aanmerkelijk zwaarder, zo dat de spieren het zelve niet opbeuren nog ophouden kunnen, waardoor het hoofd of voor over hangt of zijdelings op de Schouders nedervalt.

Wanneer de Ziekte erger word, en de Toevalen zwaarder worden, dan bemerkt men eene wasagtige weekheid in de Beenderen, welke door door de Spieren, die zo slap en bijna kragteloos zijn, op onderscheidene wijzen gekromd en verdraaid worden; men bespeurd dit het eerst in de onderste Ledematen; het Deijbeen word naar voren en gewoonlijk buitenwaards gebogen; het Been (*Crus*) werd voorwaards naar binnen; en de Opperarm werd buitenwaards gekromd; en de Voorarmbeenderen worden voorwaards gedraaid; de Borst, werd zijdelings te zamen gedrukt; ze rijst van voren in een bult, zo, dat ze naar de kiel van een schip gelijkt, vermits de Ribben, zijdelings plat, schuins naar het Borstbeen lopen.

De Rugstreng vind men dan eens naar deeze,
dan

dan naar geene zijde gebogen, en word met der tijd, als het lighaam, tot herstel van het evenwigt, naar de tegengestellde zijde overheld, door eene dubbelde kromming ontciert.

Den Onderbuik vind men dikwerf aan eene der zijden uitpuilende en aan de andere als ledig ingezonken.

De Tanden botten langzamer uit dan bij gezonden, en zijn dan nog klein en met kerfjes; weldra worden zij zwart en ze bederven; zij zijn zeer bros, zo dat zij zelfs, als men maar zagtkens kaauw, in stukken springen; zij vallen ligtelijk uit, en men ziet dikwerf, dat zij niet door anderen verwisfeld worden.

De Stem dezer Kinderen is hees en knersfende (2) en naar mate der jaaren veel te zwaar. (3)

De Pis is geelagtig wit, troebel gelijk die der dieren en versreid, weinige uren na dat zij geloost is, eene zeer doordringende lugt, gelijk als die van vlug loogzout (4). De Pols is klein, zwak, en altijd langzamer dan natuurlijk.

De

(2) WEPSTER Sijstem der Practischen Arznijkunst. Tom. 3. pag. 128.

(3) ROSENSTEIN von der Kinder Kranckheiten, pag. 579.

(4) LEIDENFROST. R. WILKINGHOFF. Disfert. exhibens nonnulla de Rachitide, pag. 16.

De Buikontlasting is, gedurende dit tijdperk der ziekte, bijna altijd gestremd, zo dat om den tweeden of derden dag vloeibare stoffen geloost worden. — Tegen het einde der Ziekte bespeurt men Buikloop, waardoor de spijsen, bijna onveranderd, ontlast worden. Wanneer de Ziekte tot den hoogsten trap gestegen is, bemerkt men een Sluipkoortsje en een zuuragtig Zweet verteerd het lighaam; de vermagering van het lighaam, (het Hoofd en den Buik uitgezonderd) neemt zo toe, dat men, als het ware, vel over been ziet; hier bij komen herhaalde Bloedigen uit de Neus en uit het Tandvleesch, dat spongieus en rottend is. — Men bespeurd Kenmerken van Water in het Bekkeneel en in de Holligheden der Harsfenen, waartoe behoort eene verwijderde en voor de lichtstralen bijna ongevoelige Oogappel; — Slaapziekte; — Lamheid der onderste Ledematen; — Stuiptrekkingen van het geheele lighaam, die spoedig door den dood gevolgd worden.

T W E E D E H O O F D - D E E L.

Verschijsfelen, die in de Lyken zijn waargenomen.

Ik heb veele Lighamen geopend van Kinderen, die de Engelsche Ziekte gehad hadden, en heb die

afwijkingen der natuurlijke gesteldheid, dewelke door de Ontleding kunnen nagespeurd worden, vlijtig onderzocht, en durve verzekeren, dat er geene Ziekte des menschelijken lighaams is, die zo veele, zo groote en zulke klaarblijkende veranderingen te weeg brengt, en uit welker vergelijking zo veel licht over den Aart en Oorzaken der Ziekte verspreid word, dan in deeze kwaal.

Alhoewel ik in het verhaal der Ziektekundige Verschijnselen gemakkelijk de Redenen daar van zoude hebben kunnen opgeven, heb ik echter liefst verkozen, thans alleen hier de Waarnemingen bij te brengen, en het geen in het samenstel der beledigde werktuigen ontdekt word, afzonderlijk te behandelen, op dat ik niet schijne, de Waarneemingen, verward met derzelver beoordeeling, te hebben voorgedragen, terwijl de Aart der Ziekte zelve dus verre onbekend is; en, op dat de Ziektekundige opgave der Redenen, die ik uit de Ontledingen afleide, tot een vasten grondslag ter ontwikkeling van hare Oorzaken, verstrekken moge.

Ten einde hierin eene geregelde leiding te volgen, zal ik een begin maken met de beschrijving der Werktuigen, die ik in de onderscheidene holigheden des lighaams bevonden hebbe, regennatuurlijk gesteld te zijn.

Den Buik geopend hebbende, doen zich terstond
de

de *Maag* en de *Darmen* voor, zodanig door de Lucht, die zij bevatten, uitgezet, dat dezelve met de punt van een mesje doorstoken zijnde, de lucht er met eene siffeling uitgaat; de vliezen der *Darmen* zijn zeer dun en zo, dat zelfs de grotere takken der bloedvaten op zommige plaatsen naauwlijks doorschijnen, zijnde de overige kleindere geheel zonder bloed. — de *Dunne Darmen*, bijna geheel zonder spijs, zijn niet zelden met veele lange *Maden*, (*Ascarides Lumbricoides*) bezet; de *Dikke Darmen* zijn met onverteerd voedsel opgevuld, en in den zak van het *Cæcum* (*den Blinden Darm*) vind men niet zelden zeer veele *Wormen*, waarvan ik er twee of drie in het *Wormwijze Aanhangsel* ingekropen vond. — Het Klapvlies van den *Kronkeldarm* is zeer naauw gesloten en de lucht dringt in den *Regten Darm* niet door, offchoon men de *Darmen* zelfs sterk drukt. — Den *Regten Darm* vind men dikwerf zamengevallen en slap, en wanneer men de *Slijm* en rauw voedsel, in denzelven bevat, door water verdund, naauwkeurig onderzoekt, ziet men niet zelden veele kleine *Wormpjes* en *Maden* van dat soort, welker hoofdjes zo dun zijn als een hair, (*Trichocephali*).

Het *Darmnet* is zonder vet, dun, gelijk een *Spinne-Webbe*.

Het *Darmscheel* levert soms, behalven dat het

zonder vet is, niets onnatuurlijks op; dikwerf echter zijn deszelfs Klieren vergroot en opgezet, en deeze heb ik eens tot zulk eene grootte toegenomen gezien, dat zij de dikte hadden van twee vuisten.

De *Milt* is zomwijlen te zamen gedrukt en hard; soms ziet men ze vergroot en sponsagtig.

Het zelve neemt men in het *Alveles* waar, het welk bijna niet ontaart; en ik heb het zelve in alle de Lijken, die ik geopend hebbe, slechts twee malen iets groter gevonden, dan gewoonlijk, dog echter niet verhard.

De *Lever* word in alle Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, verbazend groot, zo dat ik zomwijlen gezien heb, dat ze den Onderbuik zelfs bereikte; ze vertoonde nogthans zo min uitwendig iets tegennatuurlijks in haar maakzel. — De *Galblaas* heb ik zomtijds bijna geheel ledig gevonden, meestal gevuld met een wit slijmerig vogt, bijna niet geel, nog bitter; — nimmer heb ik bij deeze Lijderen, het welk ook andere Schrijvers getuigen (5), de Galblaas, met natuurlijke Gal gevuld

HALLER MATH. Disf. de Rachitide in Collect. Disf. Vindob. Tom. I. pag. 167.

VOGEL Prælect. pag. 551.

vuld gezien, maar zij bevatte of weinig en slijmerig vogt, of veel, maar zeer dun.

De *Nieren* heb ik nimmer gevonden dat eenig gebrek in hun Zamenstel hadden; ook niet de *Pisblaas*, alhoewel ik die altijd met Pis zeer opgezet gevonden heb.

Bij de opening van de holligheid der Borst, vond ik dezelve bijna altijd gevuld door een weijagtig vogt, offchoon weinig in hoeveelheid; de *Longen* zijn zomwijlen klein, naauwlijks rood, hier en daar zamengevallen, samengetrokken en verhard; dikwerf gezond; — de Waterklieren, die bij de verdeeling der Luchtbuizen, (*Bronchia*) zich voordoen, zijn bijna altijd uitgezet en als een ongelijk lighaam vergroot; de *Thijmklier*, die in de Kinderen grooter is en bij het toeneemen der jaren kleiner word, vind men in deeze Lijderen uitermaten groot.

Daar ik de aangroeiing der Longen aan het Borstvlies zomwijlen in de Lijken deezer Kinderen heb waargenomen, zal het nodig zijn, hier te herinneren, dat dit geen gevolg deezer ziekte, maar dat het of een aangeboren kwaal is, of dat het het door eene andere oorzaak is te weeg gebragt.

Het Bekkeneel doorgezaagt hebbende, vond ik dat het harde Harsfenvlies vrij sterk daar aan gehegt was; en na dat dit, niet zonder eenig geweld, er afgescheiden was, liep er uit de gebroken vaatjes,

die zig anders als roode puntjes in dit vlies vertoonen, eene groote hoeveelheid weijagtig vogt met bloederige streepjes doormengd; het harde Hersenvlies weggénomen hebbende, vond ik in de Cellerjes van het Spinnewebsvlies (*Arachnoidea*) en het Dunne Hersenvlies (*Pia Mater*) zeer veel heldere Weij, die vooral in de Vooren tusfchen de kronkelingen der Hersenen zich als waterblaasjes voordeed; het Dunne Hersenvlies was zeer gemakkelijk van de Hersenen aftescheiden; de Hersenen zelve, waren als pap en weken voor het Ontledend mes weg.

Dan, dat mij opmerkenswaardig voorkomt, en dat dus verre van niemand is aangetekend, is, dat ik bij twee Kinderen, in de zo weeke zelfstandigheid zelfs der Hersenen, zeer harde knobbels als Knoesten (*Scirrhi*) gevonden heb; bij een driejarig meisje, dat de Engelsche Ziekte had gehad, vond ik zo een *Scirrhus* in het Merg der voorste Hersenkwabbe, agter de Reukzenuw verholén; een tweeden in de agterste linker kwabbe, agter de agterste hoorn van de driehoornige holligheid (*Ventriculus tricornis*). In een jongerje, nog niet volkomen twee jaaren oud, heb ik dezelfde verharding der Hersenen waargenomen, bijna in derzelve midden bij het *Corpus Striatum*; Deeze *Scirrhi* der Hersenen, die ik in twee Lijken heb waargenomen

door

doorgesneden zijnde, waaren inwendig grijsagtig zwart, en schenen als uit eene vaste, digt in een gepakte Cellulosa te bestaan.

De Holligheden der Hersenen bevatten altijd eenig Water in zig en het dunne Hersenvlies vind men bij de *Plexus Choroides* altijd met Waterblaasjes bezet.

DERDE HOOFD-DEEL.

Het maakzel der Beenderen in Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben.

Dewijl de Beenderen, in deze Ziekte het meest aangedaan worden, hebben veele Geneeskundigen gedacht, dat de Hoofdoorzaak der Ziekte, daar in, hare zitplaats had; ik achte het dus der moeite waardig, afzonderlijk in 't kort op te geven de wijze, waarop de Beenderen tegennatuurlijk ontaarten en welk een gesteldheid zij door de Engelsche Ziekte verkrijgen.

De eerste en voornaamste verandering in de Beenderen, die door deze Ziekte zijn aangedaan, is dat zij week worden, zo dat zij zonder gevaar van te breeken gebogen en gekromd, ja met een mes, als spek, kunnen worden doorgesneden. — Deze

tegennatuurlijke weekwording en waschagtige buigzaamheid bescpeurd men in alle de Beenderen des lighaams, en de toevallen der ziekte leeren ons, dat eerst de Cylindrique Beenderen der uiterste Ledematen en de einden der Ribben; daarna de Wervelen van de Ruggegraat, en eindelijk de Beenderen van de Voorhand en de einden der Voorvoet, week worden. — Zelfs zijn de Beenderen van het Hoofd hiervan niet uitgezonderd: Ik bezit een Voorhoofdsbeen van een éénjarig kind, 't welk zo buigzaam is, dat het als papier behandeld en opgerold kan worden; desgelijks kan ook de Opperkaak met de vingers t'zamen gedrukt worden; alhoewel ze, na de drukking, zich door derzelver veerkragt in haare vorige gedaante hersteld. — De Onderkaak komt mij eenigzints harder voor, maar kan echter ingedrukt worden; vooral zijn de *Procesfus Condylodëi* en *Coronodëi* zeer week. — Zelfs heeft het hardste Been van het Hoofd, 't welk het Zintuig van het Gehoor bevat, deszelfs vorige hardigheid verloren en kan gemakkelijk met een mes gesneden worden.

Dan, wanneer wij den aart der weekgeworden Beenderen, en het onmatig verschil met derzelver natuurlijke gesteldheid nauwkeurig gadeflaan, vinden wij daar in zeer veel dingen, die, offchoon ze tot dus verre den Gereeskundigen nog onbekend zijn, waarlijk opmerkenswaardig zijn. Te weten

Voor-

Vooreerst; is er een groot onderscheid tusſchen de door de Engelfche Ziekte aangedane Beenderen en die, welke door de Zuuren geweekt, zegt worden. — Deeze worden, na de ontbinding der aardeelen, door het Zuur, (wanneer het *Gluten* alleen overig blijft) zegt en handelbaar, zonder eenige verdere verandering te ondergaan; geene worden te gelijk meer uitgezet en zwellen als een ſponsagtigen klomp.

Ten Tweede; men beſpeurd deeze tegennatuurlijke zwellung vooral in die Beenderen, welker maakzel los en Celluleus is, (b. v.) in de Lighamen der Rugwervelen en in de ſponsagtige Beentjes der Voorhand en Voorvoet. — Men vind bij deeze Kinderen de Lighamen der Wervelbeenderen, die gewoonlijk in derzelver bovenſte en onderſte oppervlakte uitgehold zijn, uitgezet en overal van eene gelijke dikte.

Ten derde; de Aangroeijſelen (*Epiphyſes*) der lange Beenderen, en de einde der Ribben zijn meer gezwollen, dan het beenig einde (*Diaphyſis*) en het lighaam of midden der Beenderen. De reden deezer ongelijke zwellung moet men in het natuurlijk loſfer zamenſtel der Aangroeijſelen zoeken. — Het is immers bekend, dat de vaſte zelfſtandigheid van het been in deſzelfs midden is, daar de Cellerjes klein en t' zamen nauw vereenigd zijn; dat deeze Cel-

letjes, naar mate zij nader komen aan de einden der Beenderen, die de gewrigten maken, zo groot worden en zig zo uitbreiden, dat deeze Cellerjes door de geheele zelfstandigheid van het Been gevonden worden; daar in tegendeel het middelste gedeelte der Beenderen zich als eene vaste, met merg gevulde buis voordoet. — Daar en boven is het den Ontleedkundigen bekend, dat de uitsteekende einden der beenderen (*Diaphyses ossium*) meerdere en grootere voedende slagaderen hebben, die des te wijder en meerder in getal gevonden worden, hoe spongieuser het samenweefzel der Beenderen is, waar zij ingaan.

Ten vierde; vermits de sponsagtige Beenderen en de Aangroeijzelen der lange Cijlindrique Beenderen, wijder Cellerjes hebben, zo zijn ook de Cellerjes van het Beenvlies, die in de beenagtige zelve overgaan, van een losser samenweefzel; waarom men ook het Beenvlies bij hun, die de Engelsche Ziekte sterk hebben, in een gezwollen, slijmig, wit, zeer spongieus Vlies ontaart vind, waarmede de weeke Beenderen, vooral derzelver einden, bekleed zijn.

Men vind het Bekkeneel ook dikwerf met dit slijmig Vlies bedekt, vooral het Voorhoofdsbeen en de Opperhoofds-Beenderen: — het is 't dikste bij de randen der Beenderen en word allengskens dunner, hoe nader het komt na het midden van het Been,

Been, dat het echter nimmer bereikt, vermits het midden des Beens, uit hoofde der meer gevorderde Beenwording, harder en vaster is. Door dit slijmig Vlies zijn de Beenderen nog meer gezwollen, en ik bewaar een Voorhoofds-Been in Brandewijn, dat ter plaatse, waar het met de andere helft door de Voorhoofds Naad vereenigd word, bijna een halven duim dik is.

Daar de Beenderen, die het gewelf van het Bekkeneel uitmaken, na verloop van het eerste jaar, met tandjes en beenige kerfjes zeer nauw vereenigd worden, vind men bij Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, dat zij een weinig van den anderen afstaan, en als dunne schubbetjes op den anderen liggen.

Daar en boven hangt de geheele onregelmatige gedaante des Hoofds eeniglijk af van de mismaaktheid der Beenderen, die het Bekkeneel uitmaken, welke zomwerf zo verre van den anderen geweken zijn, dat de Naden door afzonderlijke Beentjes gefloten worden. — Waarom men dezelve in alle de Naden van de Hersenpan deezer Lijderen vind, offchoon ze in getal en gedaante bij onderscheiden voorwerpen zeer verschillende zijn.

Zomwerf gebeurd het, vooral, wanneer de Ziekte reeds verouderd is, dat de *Bodem* van het Bekkeneel door zijne eigene zwaarte word ingedrukt, en de

Pro-

Procesfus Bafilaris van het Agterhoofdsbeen, na boven wijkt. — Dit kan egter waarschijnlijk niet geschieden, zonder veel hinder aan de Zielsvermogens toetebrengen.

VIERDE HOOFDSTUK.

Eenige gevolgen, getrokken uit de Verschijnselen, die bij deeze Lijderen worden waargenomen.

Wanneer wij verder in het veld der Natuurkundige Wetenschappen willen uitweiden, moeten wij al onze vlijt daar heenen wenden, dat wij *eerst* alleen en afzonderlijk opgeven, wat men omtrent een voorwerp, dat wij ter onderzoek genomen hebben, ontdekt, en, *dan* na de zaak wel beredeneerd te hebben, het besluit opmaken, wat er omtrent dezelve nader moet gezegt en bepaald worden. — Dit voetspoor volgende, zal ik, daar ik reeds de toevallen der Engelsche Ziekte en de Waarnemingen in de Lijken, door deeze kwael weggerukt, heb opgegeven, nu voortbrengen, wat ik uit dit alles zal kunnen afleiden.

De vermagering deezer Kinderen is een algemeen toeval in deeze Ziekte, en zo wij de Ontleding raadpleegen, vind men de Huid zonder Ver; het Vetylies
zeer

zeer overvloedig en flets; de Spieren bleek en uitgeleerd. — Offchoon de verbazende grootte des Hoofds en de zo gezwolle Buik eene algemeene uitteering fchijnen uittesluiten, zo blijkt echter bij nader onderzoek, dat men hier geene vermeerdering, maar eerder eene vermindering en verlies der deelen befpeurt; dewijl de gaping der Naden; de tegennatuurlijke verwijding van de met water opgefulde holligheden der Hersenen; de opfpanning der Darmen door lucht en de verduining van haare Vliezen, als ook de Buikspieren, die naauwlijks dikker dan papier zijn, genoegfame kenmerken van eene algemeene uitteering zijn, waar door geheel het lighaam ondermijnt word.

Deeze algemeene vermagering der Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, toont aan, dat het lighaam van de nodige voeding en herftel der verlorene deelen verftoken word; daar nu deeze Kinderen door de gebruikte fpijzen niet gevoed worden, hangt dit hoofdzakelijk van deeze twee Naaste Oorzaaken af: want of de uit het voedzel bereide Chijl is tot de voeding onbekwaam, of de Wegen, waardoor de Chijl naar alle de deelen des lighaams gevoerd word, zijn verftopt. — Dog men bemerkt bij deeze Kinderen geene verftopping in deeze Wegen, en zelfs fchijnen de opflurpende Vaten, die in het Darmscheel zijn, in tegendeel meer dan gewoonlijk verwijd te zijn;

en

en de Darmscheels-klieren, die dikwerf in de lijken der Kinderen, die de Engelsche Ziekte hadden, tot eene wanschapeñe grootte zijn opgezet, beletten den doorloop van de Chijl ook niet; daar R. A. VOGEL (6) reeds vermoedede, en REZIA (7) onlangs bewezen heeft, dat de veruitgezette Ingewanden en Klieren niet verstopt, maar eerder verwijderd zijn; men moet dus de vermagering en uitteering deezer Lijderen niet toeschrijven aan de verstopping der Darmscheel-klieren en belette doorvloeijing van de Chijl, maar veel eerder aan deszelfs onvermogen en ongeschiktheid tot voeding van het lighaam en herstel der verlorene deelen.

Wanneer het lighaam kwalijk gevoed word, is dit er vooral de reden van, dat de deeltjes, die tot onderhoud der Werktuigen nodig zijn, uit de voedende sappen niet worden afgescheiden en aan de deelen des lighaams hangen blijven.

Indien wij nu dit op de Engelsche Ziekte toepassen, dan komt hier de vraag op uit: welke deelen worden in het lighaam van een kind, dat door deeze Ziekte aangetast is, voornamelijk vereischt?
dit

(6) *Prælectiones de cognoscendis et curandis morbis.*

(7) *Specimen Observ. Anatom. et Patholog. Ticini 1784. disfert. 1. et 2. de Viscerum, quam dicunt, obstructione cum molis incremento.*

dit valt niet moeilijk te beantwoorden. — De Beenderen leveren het voornaamste en duidelijkste Toeval op in deeze kwaal, daar dezelve zo week worden, dat zij door de zwakke Spieren op onderscheide wijze kunnen gekromd en gebogen worden; vermits nu deeze weekwording en buigzaamheid der Beenderen alleen daarvan afhangt, dat zij, geheel verstoken van de Aard-deelen, als 't ware, enkel uit lijmige stoffe bestaan, blijkt het klaar, dat de Aard-deelen tot voeding en herstel des lighaams voornamentlijk vereischt worden; alhoewel nu de Beenderen, daarom dat zij meerendeels uit Aard-deelen gevormd worden, nu van dezelve ontbloot, meer, dan de overige deelen des lighaams, den aart der Ziekte ontdekken, en het gebrek der Aard-deelen aanduiden, volgt echter zeker, dat ook de overige deelen, door gebrek van dit aardagtig beginsel, moeten ont-aarten; want, gelijk de Beenderen aan eene grotere hoeveelheid der Aard-deelen, in evenredigheid tot de overige bestaandeelen, hunne stevigheid verschuldigd zijn, om als een grondslag en steun voor het overige lighaam te verstrekken; zo verkrijgen ook de overige deelen uit dit zelfde beginzel, dat tot haare zamenstelling medewerkt, die vastigheid en kragt der vezelen, die tot oeffening der werkingen van het lighaam noodzakelijk vereischt word; hier van daan is het, dat in deeze Lijderen, uit een volstrekt

ge-

gebrek van dit aardagtig beginfel, tot de voeding gefchikt, eene zo groote flapheid der Spieren en buitengewoone bleekheid der Spiérvezelen be-
 fpeurd word; van hier die groote fletsheid der Huid en van het Vervlies. — Maar ook om dezelfde re-
 den ontbreekt aan de Vliezen die vastigheid en
 veerkragt der vezelen, die zij ter behoorlijke oeffe-
 ning hunner werking zo zeer benodigt hebben; —
 daarom is ook de Darmbuis bijna geheel kragte-
 loos, en word door de Lucht, die uit de Spijzen
 losgelaten word, (het zij de Darmen die niet
 t' onder kunnen brengen, of onmagtig zijn om ze
 te loozen) zodanig uitgezet, dat de Buik als een
 ton gespannen is en klinkt, als men 'er op slaat. —
 De Bloedvaten zijn, offchoon de de langfame Pols-
 slag genoeg de zwakheid van het Hart aanduid,
 wonderbaarlijk verwijderd, zo als de Ontleding aan-
 toont. — hier toe moet ook gebragt worden de uit-
 zetting der Ingewanden en Klieren, vooral van de
 Lever, die men altijd en in alle Kinderen, die aan
 deeze Ziekte gestorven zijn, verbaazend groot vind.
 De oorzaak, dat deeze, tot affcheiding der vogten
 gefchikte, Werktuigen zodanig vergroot worden, is
 alleen gelegen in de verwijding en uitzetting van
 derzelver Bloed- en Watervaten, het welk wederom
 veroorzaakt word door derzelver flapheid en ge-
 brek van yeerkragt, waardoor dezelve voor het door-
 lo-

lopend Bloed en Weijvogt ligtelijk wijken, en geen vermogen hebben om zich te kunnen zamentrekken, en in hunnen vorigen staat te herstellen.

Daar er nu in de Beenderen gebrek van Aard-deelen bescpeurd word, en daar van alleen derzelver weekheid en buigzaamheid afhangt, zo volgt van zelfs, dat van de verminderde evenredigheid der Aard-deelen tot de overige bestaandeelen de slapheid en zwakheid der overige Werktuigen afgeleid worden.

V Y F D E H O O F D . S T U K .

Het een en ander over de Voeding en over de Afscheiding der Vochten, dat tot dit stuk behoort.

Op dat men gemakkelijker begrijpe, het geen ik op mij genomen had, over de bepaling van den Aart der Engelsche Ziekte te zeggen, heb ik nodig geoordeelt, aangaande deeze voorname werking des Lighaams, eenige weinige stukken, uit de nieuwste ontdekkingen der Natuurkundigen, hier in te lasen.

Het menschelijk Lighaam, waaromtrent eigenlijk alleen de Vraag verkeerd, word zamengesteld uit bestaandeelen, die niet zo zeer in aart, als wel in evenredigheid verschillen. Hier toe behoren de Beenderen, Kraakbeenderen, Spieren, Vliezen van onder-

H

schei-

scheiden maakzel en het Zenuwmerg. Omtrent deeze natuurlijke vorming des Lighaams, verschillen de Natuurkundigen niet; dan het is zo gemakkelijk niet, het werktuiglijk zamenstel des Lighaams wel te beoordeelen, overmits de oirsprongelijke vorming der werktuiglijke deelen, doordien deeze niet onder het oog valt, nog zo duister is, dat de Natuurkundigen tot dus verre het hier moeten opgeven; en men kan deeze verborgenheden op geene andere wijze ontwikkelen, ten zij men Proeven met eigen Waarneemingen paare, en het geen door deeze twee wegen niet ontdekt kan worden, met ons Oordeel en door de Reden uitvorsche.

Het Celluleuse of Vervlies, heeft zo de overhand in alle werktuiglijke deelen van ons lighaam, dat er geen deel zij, of het word er uit zamengesteld, en kan in dit Vlies weder ontbonden worden. — De Bekleedzelen des lighaams bestaan klaarblijkelijk uit zulk een celluleus Vlies', 't welk, daar het de Spieren bekleed, uit wijde, losse cellerjes bestaat, die hoe meer zij aan de oppervlakte des lighaams komen, des te kleiner en meer zamengepakt worden.; — uit het zelve Celluleus Vlies, zijn de Spieren, Bloedvaten, Vliezen, Klieren en Ingewanden volstrekt eeniglijk zamengesteld; — dat de Hersenen van gelijksoortig maakzel zijn, blijkt klaar, als men dit weeke ingewand door het vogt van

Mor-

Morgagni hard maakt. Ja zelfs de Beenderen tonen dit maakzel ons duidelijk aan, want zo dra de Aard-deelen door het Salpeterzuur ontbonden en weggenomen zijn, kunnen de Celletjes gemakkelijk verwijderd en uitgerekt worden.

Deze Cellulosa, die de zelfstandigheid der werktuiglijke deelen uitmaakt, vereenigd zich teffens met dezelve, zo zelfs, dat de Huid door dit Celluleus samenweefzel in de Spieren overgaat; deeze worden hierdoor wederom naauw met de Slagaderen vereenigd en gaan zelfs in het Celluleus maakzel der Beenderen over, na vooraf een dik Vlies, dat de Beenderen bedekt, gemaakt te hebben, dat men het Beenvlies (*Periosteum*) noemt.

En wanneer men dit Vlies in eenige deelen des Lighaams niet ontdekt, moet men dit toefchrijven aan eene meerdere ophooping der kleinere Celletjes, die, of door haare gewoone hardigheid niet kunnen van den anderen gescheiden worden, of door te groote weekheid naauwlijks samenhangen, en dus afgescheiden zijnde, scheuren; daardoor schijnen deeze Celletjes in de Beenderen en in het weke merg der Hersenen en Zenuwen als geheel te ontbreken, alhoewel men dezelve, bij het neemen van Proeven, weldra ontdekt.

De Slagaderen, die het bloed voeren, uit de linker holligheid van het Hart voortgesprongen, door-

- lopen geheel het lighaam; verdeelen zich in zeer veele takken en zo fijn als hairtjes geworden zijnde, maken zij verscheiden Netsgewijze Vlegtelingen, (*Plexus Retiformes*), vervolgens op nieuws zamen gelopen en met andere hoofdtakjes vereenigd zijnde, keeren zij onder den naam van Aderen naar het Hart te rug — De Slagaderlijke Vlegtingen, die hiertoe voornamelijk behoren, worden uit de laatste verdeelingen der Vaten gemaakt en bestaan uit de kleinste S-agadertjes, gesproten uit de laatste verdeeling van den Slagader, die met den anderen vergaderd, te rug lopende en wederom vereenigd, eindelijk in eeren tak verzameld worden, die den Ader uitmaakt. — Dit samenweefzel der Vaten, vind men tuschen de laatste verdeeling der Slagadertjes en Adertjes, en uit deeze Vlegtingen bestaan onmiddelijk alle afscheidende Werktuigen; want daar er geen deel des Lighaams is, of het bestaat uit Cellulosa, zo is er geen Cellulosa, of men vind er dusdanige Slagaderlijke Vlegtingen in; dit zo fijn maakzel der werktuigen ontdekt men door het Microscop, als men de Vaten met gekleurde Wasck opspuit (8).

In ieder Cellerje vind men ook verscheiden Opflur-

(8) P. MASCAGNI Vascularum Lymphaticorum C. H. Historia et Ichniographia. Senis. 1787. part. I. Sect. II.

slurpende Vaten, tot twee, drie en vier in getal, volgens de Waarneemingen der Ontleedkundigen (9).

Door de voorstuwende kracht van het Hart, en door het zamentrekkend vermogen der Slagaderen, word het bloed tot in de kleinste Vaten voortgedreven, en de zo fijne Slagaderlijke Vlegtingen, die door zeer fijne Vliezen gemaakt worden, uitgezet; en daar door is het, dat het vloeibaarste gedeelte van het bloed, de Weij namelijk (*Serum*), en het frembaar Watervogt (*Lympha*) door de kleinste buisjes als uitzweet en de Celletjes vervuld.

Daar nu de Cellerjes bestaan uit verscheiden deeltjes, die in verschillende evenredigheid zijn t' zamen vermengt, moeten deeze Cellerjes, door frembaar Weijvogt (*Lympha*) en Weij (*Serum*) gevuld, uit deeze vogten noodwendig die deeltjes aantrekken, die met dezelve de meeste overeenkomst hebben; zo dat de Lijmige voornamelijk aan de Spieren; de Olieagtige aan de Hersenen; de Aardagtige aan de Beenderen vastkleven.

Op deeze wijze alleen kan men bevatten, hoe het Menschelijk Lighaam gevoed word. — Want dewijl de Deelen van het Dierlijk Lighaam vroeg of laat tot verrotting overhellen; zo word door deeze inwendige ontfantenis der deelen de stoffe, die de Cellerjes
uit-

(9) Ibid. part. I. sect. III.

uitmaakt, geheel tot haare eerste beginzelen ontbonden, uit haaren zamenhang gedreven en nieuwe deeltjes, die door de Slagaderlijke Vlegtingen worden aangevoerd, verwisseld.

De overige Deeltjes, die in de Celletjes worden aangevoerd, dog daar door niet worden aangetrokken, worden te gader met die, welke te voren met de Celletjes vereenigd, nu tot haare eerste beginzelen ontbonden zijn, door de Opflurpende Vaatjes naar de Chijlbuis (*Ductus Thoracicus*) te rug gevoerd en met het bloed vermengd; of door het lighaam weder omgevoerd; of, als tot de voeding ongeschikt, door de ontlastende Werktuigen des lighaams geloosd.

Tot de geschikte vorming der werktuiglijke deelen, waardoor deeze hunne werkingen volbrengen, word eene juiste en bepaalde evenredigheid der bestaandeelen vereischt; daar nu deeze deelen uit het Bloed, of liever uit deszelfs streembaar Weijvogt (*Lympha*) gevormd en aanhoudend vernieuwd worden; en het bloed uit de Chijl bereid word; komt het eindelijk daarop neder, dat men deeze voedende Sappen des lighaams als de Oorzaak der ziekte moet aanmerken, wanneer namelijk de juiste evenredigheid der voedende deelen ontbreekt.

ZESDE HOOFD-DEEL.

Over den Aart der Engelsche Ziekte.

Vermits Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, met het zelfde voedsel opgebracht worden, waardoor gezonde Kinderen kragt en sterkte bekomen, moet de reden, waarom zo veele Aard-deelen, die met het voedsel in het ligchaam komen, tot de voeding onbekwaam worden, alleen in eene ontaarting van de Chijl gezogt worden; dit toonen ook de toevallen der Ziekte en de verschijnzelen in de Lijken duidelijk aan, daar al wat uit het ligchaam deezer kinderen geloost word, Teken en van *Zuur* aankondigen; hiertoe behoren vooral de dunne Afgang, die uit den geelen groenagtig is en *Zuur* ruikt; de Oprispingen en Brakingen van *Zuuragtig*, gestremd Zog; de Uitwaseming en het *Zweet*, dat duidelijk *Zuur* ruikt; en dit alles geeft een klaar bewijs, dat het geheele ligchaam deezer Kinderen als van het *Zuur* doortrokken is.

En, wanneer men de Buik opent van een Kind, dat aan de Engelsche Ziekte gestorven is, bespeurt men geene Loogzoutige stank van Vrotting, maar eene doordringende *Zuuragtige* stank. — De stoffen, die men in de Maag en Ingewanden vind, ruiken ook *Zuur*, en ik heb menigmaal met de *Heliotropium*

pium geleverd papier, in deeze stoffe gedoopt, rood zien worden.

Uit deeze verschijnzelen kan men de reden afleiden, waarom de Aard-deelen, die met het voedsel in de Chijl overgaan, bij deeze Kinderen tot de voeding onbekwaam zijn; want daartoe word vereischt, dat de voedende deelen met de Chijl en het Bloed vermengd worden, en in deeze levensvogten vrijelijk drijven; dus kunnen deeze Deeltjes (als het streembaar Weijvogt, met dezelve bezwangerd, te gelijk met het Bloed door deeze zo fijne Slagaderlijke Vlegtingen doorvloed,) schielijk aan de Cellerjes door eene Chemische aantrekking vastkleeven, en dus de Deelen, die door verdere ontwikkeling verloren zijn, herstellen. Maar, wanneer de Deeltjes, die anderzints zeer geschikt zijn tot de voeding, door eene meerdere aantrekkingskracht met vreemde Deelen vereenigd worden, dan die, welke plaats heeft tusfchen de voedende Deeltjes en tusfchen de Cellerjes, waar in zij werden overgestort, zo zullen deeze Deeltjes zig nu niet aan de Cellerjes vasthegten, maar worden, als ongeschikt tot de voeding, door de opflurpende Vaten in het bloed te rug gevoerd, en door de ontlastende Werktuigen des lighaams geloosd.

De slappere Zuuren uit het Rijk der Planten, (*Acida Vegetabilia*) vereenigen zich ligtelijk met de Kalkaarde, en maken een Middenzout, dat zich in

water laat oplossen, en door eene groote hoeveelheid van het zelve kan gesmolten worden: tot deeze Zuuren behoort het Zog of het Melk-zuur, dat, ofschoon het uit een vogt, dat in een Dierlijk lighaam voortkomt, bereid word, echter met de Plant-Zuuren daarin overeenkomt, dat het de Kalkaarde gemakkelijk ontbind, welke ontbinding zich met het Water vereenigd, zonder de Aarde lostelaten. — Ik heb meermalen verscheiden Beenderen van Kinderen in het Melk-Zuur gelegd, die binnen agt dagen zo week waren geworden, dat zij als Wasch gebogen en gekromd konden worden (1).

Deeze eigenschap der Zuuren komt egter niet alleen aan de Zuuren toe uit het Rijk der Planten, maar ook sommigen der sterkste Minerale Zuuren hebben het zelfde vermogen, vooral, wanneer er bij een Aardagrig Middenzout een onverzadigd gedeelte van dit Zuur bijgedaan word: b. v. Het verdunde Salpeter-zuur ontbind gemakkelijk de Kalk-

aar-

- (1) FAUCHY en GEOFFROY hebben gevonden, dat een ijvoren lepel in het Melkzuur week was geworden, (Histoire de l'Academie de Paris 1743. Observ. de Phys. cap. 13.) en RUISCH. Thesaur. Anatom. VI No 13. Thesaur. Max. No 1611. Thes. nov. N. 129. en HUNOLD (Histoire de l'Academie des Sciences de Paris) heeft ook door genomen proeven bevonden, dat Menschenbeenderen in Melk-zuur en Azijn waren week geworden.

aarde, en laat de Kalk niet los, hoe zeer men ook het zelve met water aanleegt.

Daar en tegen vind men ook in alle Rijken der Natuur veele Zuuren, die wel met de Kalkaarde zich vereenigen, maar eene, in water onoplosbare, *Selenites Calcareæ* zamenstellen. Hiertoe behoren het Vitriool-Zuur, de Fluor Mineralis, het Zuiker- en Phosphorisch Zuur.

Daar nu het Phosphorisch Zuur, voornamelijk en bijna alleen, in het lighaam van een gezond Mensch en andere Dieren gevonden word, en het zelve met Aarde vereenigd, de stoffe der Beenderen; maar met het Loogzout van Planten, een *Sal Microcosmicum* (*Menschelijk Zout*) uitmaakt; zo blijkt het, dat dit Zuur alleen in het Dierlijk Lighaam bereid word. — Dit geschied echter niet in Kinderen, die met het Zuur gekweld zijn; de Zuuren der Planten en het Zuur, dat uit 't Zog ontwikkeld word, blijven raauw; worden met de Chijs in het bloed gevoerd en komen also in de Cellietjes zelve.

Dus al wat van deeze Aard-deelen in de Chijs of het Bloed bevat word, word door deeze rauwe Zuuren, die uit de Darmen onveranderd aangevoerd zijn, ontbonden en maaken een Midden-Zout uit, dat, als het door veel Weij word ontbonden, ongeschikt word om aan de beenige Cellietjes vast te kleeven, ofte tot het zamenstel der overige Werktruglijke
dee-

deelen te kunnen dienen; waarom het door de opslurpende Vaatjes, die zig overal in de Cellerjes openen, word opgenomen, wederom met het Bloed vermengd, en door de Long, Huid en Nieren geloosd word. Er worden dus in het lighaam van een Kind, dat deeze Ziekte heeft, geene Aard-deelen aan de Cellerjes aangezet, en daardoor word de Werktuiglijke vorming tegennatuurlijk veranderd.

Daar nu de Beenderen in gezonde menschen voornamelijk uit eene gephosphoreerde Kalk bestaan; moeten deeze in die Kinderen, in wier lighaam dit Aardagtig Midden-zout, zo geschikt tot de voeding der werktuiglijke deelen, ontbreekt, noodzakelijk grote veranderingen ondergaan; want zij worden dan alleen door het Lijmige gedeelte gevoed, worden daarom zagt en buigzaam, en kunnen de Spieren, zich zamentrekkende, naar alle zijden gebogen en gekromd worden.

Daarenboven terwijl de voedende Vaten der Beenderen en de Cellerjes zelve, van deeze Aard-deelen verstoken worden, worden die teffens van heure kragt en vorige stevigheid beroofd, waar door zij voor de vogten, die daarin voortgestuwd worden, wijken en wijder worden en uitzetten; het geen ten gevolge heeft, dat het Been zelve zwelt, en als eene sponsagtige gedaante aanneemt.

Nademaal nu het samenstel der overige Werktuiglij-

lijke Deelen eene meerdere of mindere hoeveelheid van deeze gephosphoreerde Kalk, waardoor zij heure kracht en vastigheid verkrijgen, erlangt, zo worden deeze nu ook door gebrek der Aard-deelen ontbonden; hier door werd de slapheid der Spieren; de fletsheid van de Huid; de Trommelzugt en tegennatuurlijke groei der Ingewanden, die wij in de Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, waarneemen, gemakkelijk verklaard.



TWEEDE AFDEELING.

De Oorzaken der Engelsche Ziekte.

ZEVENDE HOOFD-DEEL.

De Algemeene Oorzaak deezer Ziekte.

VERMITS het gebrek van Aard-deelen, waardoor het Dierlijk Lighaam gevoed word, alleen aan de Zuuragtige Chijl moet worden toegekend; zal het nu niet moeilijk zijn, reden geven, waarom het voedend Zap bij deeze Kinderen met dit Zuur zo zeer bezwangerd is.

In Kinderen, die de Engelsche Ziekte niet hebben, offchoon zij met Planten-Zuuren en Melk of Zog gevoed worden, bespeurd men echter geene tekenen van geloosd Zuur, maar in tegendeel bemerkt men, (en dit bevestigen ook de Waarneemingen ook de Proefneemingen,) dat en derzelver Chijl en de Ontlastingen eerder tot de verrotting overhellen.

Het hangt dus van eene goede Spijsverteering af, dat de Spijzen, zelfs die veel Planten-Zuur in zich bevatten, zodanig veranderd worden, dat zij gelijk
Dier-

dierlijke deelen tot voeding derzelven bekwaam worden. Dat nu de Spijsverteering voornamelijk geschied door de Sappen en Vogten, die in de Darmen en Ingewanden der Buik afgescheiden worden, heeft SPALLANZANI aangetoont. (2)

Wanneer dus de Zuuren, waarmede het Kind gevoed word, door deeze ontbindende Vogten niet in een Dierlijken Aart veranderd worden, volgt het, dat deeze Vogten bedorven en ontaart zijn.

Als ik de Ingewanden deezer Kinderen ontleed en derzelver afgescheiden Vogten onderzocht heb, dan heb ik vooral de Lever zeer groot, en de Galblaas met eene bedorve kragteloze Gal, die bijna geene bittere smaak heeft, gevuld gevonden; maar het Speekzel en het Alvleesch-sap (*Succus Pancreaticus*) heb ik nimmer, zo veel ik mij herinneren kan, ontaart gevonden.

Dus neme ik aan te bewijzen, dat de Algemeene Oorzaak der Ziekte, hiertoe gebragt moet worden.

De voornaamste Werking der Spijsverteerende Deelen bestaat daarin, dat zij de Planten en rauwe Dieren-Zuuren zodanig veranderen, dat ze tot de voeding der Werktuigen des lighaams bekwaam worden. Het komt derhalven hierop aan, dat deeze Zuuren zodanige verandering ondergaan, dat deeze of met Olie vermengt het dierlijk Vet maken, of met Aard-

(2) Disfertazione di Fifica Animale e Vegetabile, Tom. I.

Aard-deelen vereenigd, een Midden-zout zamenstellen, dat in het Weijvogt onoplosbaar is, en geschikt tot de voeding der Deelen van het Dierlijk Lighaam.

Dit Aardagtig Midden-zout bestaat uit Kalkaarde en Phosphorisch Zuur: daar nu de Kalkaarde bijna in alle Spijzen is, maar het Phosphorisch Zuur in de meesten ontbreekt, durve ik, zonder eenige vrees van een overhaastig Oordeel, gerust stellen, dat de overige Zuuren in de Spijsverteerende Deelen, tot een Phosphorisch Zuur overgaan, te meer, daar men in de ontlastingen van gezonde Dieren geene overblijfselen der ingenomen Zuuren verder ontdekt.

Hoe nu de Zuuren die wij gebruiken, den Aart van het Phosphorisch Zuur aanneemen, kan men, ofschoon niet zeker, echter met zeer veele waarschijnlijkheid nagaan. Het Phosphorisch Zuur komt met de overige Deelen, die men uit het Dierlijk lighaam ontlast, niet alleen daarin overeen, dat het zelve met zeer veel Phlogiston bezwangerd is; maar dit Dierlijk Zuur is zelfs, volgens Scheikundige Proevneemingen, met zeer veel Phlogiston verzadigd, vermits daardoor onderscheiden lighaamen, die aan de vrije lucht worden blootgesteld, als door een allerfijnst, zeer zuiver vuur, door Phosphorus namelijk, verbranden en verteerd worden. Wat belet ons dus, te stellen, dat de gebruikte Zuuren, door het bijkomend Phlogiston in de spijsverteerende deelen, in een Phosphorisch

risch Zuur veranderen? ja zelfs, waarom zouden wij niet zeggen, dat *daarin* het voornaamste der spijsverteering gelegen zij, dat er bij de rauwe Zuuren veele Phlogiston komt en dat deeze, met het Phlogiston vereenigd, den Dierlijken aart aanneemen. — Dit bevestigen de Plant-eetende Dieren; daar men bij derzelver Ontleding ontdekt, dat hunne Spijsverteerende Werkuigen meer zamengesteld en ruimer, en dat ook hun Gedarmte veel langer is.

Onder alle de Spijsverteerende Sappen van het Dierlijk Lighaam is er geen, dat zo veel Phlogiston in zig bevat, als de Gal, die uit het zwarte, dikke Bloed van den Poortader en vooral uit het Phlogiston bereid, in de Galblaas stilstaande, hoe langs hoe meer Phlogiston ontwikkelt, het geen de verdikking der Gal en de Galsteenjens duidelijk aantonen; vermits deeze in het vuur vlam vatten, en eindelijk, na eene zwavelagtige damp verspreid te hebben, verbranden.

Ik meene dus overtuigend bewezen te hebben, dat door de nauwere vereeniging van het spijsverteerend Vogt met de Zuuren, die na de Darmen gebragt worden, het Phosphorisch Zuur geboren word.

Eerstelijk: Om dat dit Zuur bijna nooit buiten het dierlijk Lighaam gevonden word.

Ten Tweeden: Om dat de rauwe ingenomen Zuuren niet wederom uit het Lighaam geloosd worden.

Ten

Ten Derde: Om dat de genomen proeven overvloedig bewijzen, dat het Phosphorisch Zuur met Phlogiston bezwangerd is.

Ten Vierde: Om dat de Gal, boven alle de Spijsverteerende vogten, het voornaamste en eenigste is, dat zo veel Phlogiston bevat, en, als het ware, uit hetzelfde bestaat.

Daar het nu hier mede dus gelegen is, twijfel ik geenzints, of de Geneeskundigen zullen met mij gereedelijk instemmen, wanneer ik de naaste oorzaak deezer Ziekte in de verdunde, bedorven en kragteloze Gal stelle; vooral, zo zij onbevooroordeeld te werk gaan en in agt neemen, dat de Galblaas in alle ontleden Lijken der Kinderen, die aan deeze Ziekte gestorven zijn, gevuld is met één lijmig witagtig vogt, waarin de smaak niets bittert ontwaart.

Dit kragteloos en ontaart vogt, dat men in plaats der Gal vind, is dus onbekwaam, om de Planten-zuuren, als ook het Zuur, dat uit de gestremde Weij van de Melk of het Zog ontwikkel word, te veranderen, dat is, met het Phlogiston te verzadigen; waardoor dezelve onveranderd met de Chijl vermengd worden en met de Kalkaarde vereenigd, een Middenzout maken, dat in de overige Dierlijke vogten, in het Weijvogt namentlijk en de strembare Weij, gemakkelijk ontbonden word.

Daar nu dit Zout, dus ontbonden, uit hoofde der

meerdere verwandschap of overeenkomst met het Weijvogt, nog aan de andere werktuigelijke deelen, offchoon in derzelver Celletjes gevoerd, vastkleeft, zo word hetzelve door de opslurpende Vaatjes, als ter voeding ongeschikt, in het Bloed te rug gevoerd en uit het Lighaam uitgevoerd.

Daar nu het Phosphorisch Zuur, wanneer de Gal wel gesteld is, uit de ratwe Zuuren in het Dierlijk lighaam bereid word; en het zelve, met Kalkaarde vereenigd, een Midden-Zout uitmaakt, dat in de Dierlijke vogten onoplosbaar is, doch met de zelve slechts Mechanisch vermengt, met het Bloed rond gevoerd word, zal hetzelve in de Celletjes gebragt, door geene andere aantrekking verhinderd, aan de zelve, als een nieuw voedend Deeltje, vastkleeven.

Behalven het Phosphorisch Zuur, 't welk met de Kalkaarde vereenigd een *Selenites Calcareae* en met het Wijnsteen-Zout (*Sal Tartari*) maakt, een zogenaamd *Sal Microcosmicum*, dat niet zelden in eene groote hoeveelheid met de Pis geloosd word, zo vind men ook in de tweede Wegen van het Dierlijk Lighaam, het Vet-Zuur, (*Acidum Pinguedinis*) en zomwijlen eenige spoooren van het Zuiker-Zuur (*Acidum Sacchari*).

Het Vetzuur, meest altijd met Olie vermengt, maakt het Vet uit, dat men in het Vervlies (*Membrana Cellulosa*) vind: dat hetzelve uit andere
Zuur

Zuuren, tot ons voedsel gebruikt, bereid word door bijkomst van het Phlogiston, is buiten allen twijfel, doordien de proefneemingen van den beroemden CRELLIUS met het Vet genomen, aantonen, dat dit Zuur door de Destillatie ontwikkeld en losgemaakt, onder de vorm van doordringende en vlugge dampen word opgeheven (3). Her zelve schijnt dieshalven, van het PhosphorischZuur, dat wij weeren met dit vlugge beginsel als verzadigd te zijn, alleen in mindere hoeveelheid van Phlogiston te verschillen.

En dit is mogelijk de reden, waarom men in die Menschen en Dieren, welker Lever eenigzints ziekelijk is, eene zo groote aanwas van Vet waarneemt; want daar de Gal, die in een kwalijk gesteld werktuig bereid is, niet zo eene genoegzame hoeveelheid van Phlogiston bij de rauwe Zuuren voegen kan, als er tot bereiding van het Phosphorisch Zuur vereischt word, zo word het Verzuur geboren, dat met Olie verzadigd, het Vet uitmaakt; ten minsten hebben voorname Mannen in alle vette menschen en die in het Vet als begraven zijn, een of ander ongemak in de Lever waargenomen.

Nu moet ik nog het gevoelen van den beroemden FOURCROY, (4) aangaande de weekwording der
 Been-

(3) Chemisches Journal, Theil. I. pag. 60.

(4) Memoires de la Societé Royale de Medicine de Paris
 1782 — 1783. pag. 497.

Beenderen, wederleggen. Deeze meent gevonden te hebben, dat de naaste oorzaak der Engelsche Ziekte in den al te grooten overvloed van het Phosphorisch Zuur gelegen is; vermits de Kalkaarde, met dit Zuur verzadigd, in onze Vogten niet ontbonden word en dat deeze Aarde gemakkelijk word opgelost, zo dra het Phosphorisch Zuur boven het punt van verzadiging gaat; zo als dit omtrent de Gijps bekend is, die, offchoon in het Water onoplosbaar, echter, door het bijdoen van Vitriool-Zuur, dadelijk ontbonden word. — Dan, offchoon ik niet ontkenne, dat in zommige Ziekten, waarin eene weekwording der Beenderen word waargenomen, (b. v. in die, welke MORAND (5) beschrijft, als ook in die, welke FRANK (6) de Engelsche Ziekte der volwassenen noemt,) dit Toeval aan eene overvloed van het Phosphorisch Zuur moet worden toegekend, blijkt het echter klaar uit de verbranding van het Lijm der Beenderen in het open Vuur en derzelver spoedige Aschwording, dat in Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, het Phosphorisch Zuur, niet alleen, niet in eene te groote hoeveelheid word gevonden, maar dat het ten eenemaal ontbreekt.

Niets belet dus, en zelfs komen alle de Toevallen
der

(5) Histoire de la Maladie Singuliere, Paris 1452.

(6) Delectus Opusc. Medic. Tom V. pag. 304 et seq.

der Engelsche Ziekte daarop uit, dat het heerschende Zuur, waardoor de Kalkaarde tot de voeding ongeschikt word, de Engelsche Ziekte veroorzaakt, en dat het onvermogen der Gal de naaste oorzaak der Ziekte is.

ACHTSTE HOOFD-DEEL.

De verwijderde Oorzaken (Causæ Remotæ) der Engelsche Ziekte.

Als de Oorzaken, die uitwendig op het Lichaam werken, in eene wederkeerige betrekking staan met de tegennatuurlijke ongesteldheden, die reeds in het Lichaamsgestel aanwezig zijn, dan ontstaat er eene Ziekte.

Deeze uitwendige Oorzaken worden onder de Aanleidende (*Occasionales*) gesteld; maar de ontaarting van het veranderd Lichaams-gestel behoort tot de Voorbeschikkende (*Prædisponentes*).

De algemeene en naaste Oorzaak deezer Ziekte ons thans bekend zijnde, gaan wij tot de Verwijderde over, en zullen het eerst over de Voorbeschikkende handelen, zonder evenwel de Algemeene Oorzaak, die het onmiddelijk gewrogt der Verwijderde is, uit het oog te verliezen.

De Kindsheid alleen is door deszelfs eigenaartig gestel, tot de Engelsche Ziekte voorgeschikt; men

vind immers in alle Kinderen de Lever, in evenredigheid tot de andere Deelen des Lighaams, veel grooter als in de Volwasfenen, en zij is, zelfs bij de gezondste Kinderen, altijd bijna tot aan den Navel uitgestrekt.

Dat deeze aanmerkelijke vergroting van de Lever, allen van de meerdere uitzetting en verwijding der Vaten, waaruit zij geheel bestaat, afhangt, leert ons de Ontleedkunde duidelijk, daar immers in de Vrugt alle werktuiglijke Deelen, als bijna geheel uit eene geleiagtige stoffe zijn zamengesteld, en het Bloed uit de Nageboorte regtsstreeks naar de Lever vloeit, zo moet dit Ingewand door deeze sterke aandrang meer dan de anderen vergroot worden.

Deeze verwijding der Vaten moet, daar dezelve tot de afscheiding der Gal dienen, noodwendig ten gevolge hebben, dat de afscheiding in dit Ingewand bij Kinderen onderscheiden is, van die der Volwasfenen. — Zo als men ook in de gezondste Kinderen zelfs vind, dat de Gal veel dunner is, dan in meer bejaarden.

Door deeze uitzetting van de Lever bereikt wel de Natuur aan den eenen kant haar oogmerk uitneemend wel, nademaal deeze wateragtige Gal niet magtig is, om alle de Zuuragtige Spijzen, waarmede het Kind gevoed word, in Phosphorisch Zuur te veranderen, waardoor eene mindere hoeveelheid van Phosphorische

Kalk

Kalk in het Lighaam van deeze Kinderen bereid word, het Lighaamsgestel losser blijft, en dus de groei des Lighaams niet verhinderd word. — Dan deeze zo noodzakelijke gesteldheid van de Lever maakt, aan den anderen kant, eene voorgeschiktheid tot de Engelsche Ziekte, waardoor dezelve, zodra de Aanleidende Oorzaken medewerken, dadelijk geboren word.

Hoe slapper de Vezelen van het Lighaam in de Kinderen zijn, des te meer zijn zij vatbaar voor de Engelsche Ziekte; want de Ingewanden en derzelve Vaten worden ligter uitgezet en verwijd, waardoor eene meer wateragtige Gal, tot de Spijsverteering ongeschikt, word afgescheiden.

Daarom worden de te vroeg geborene Kinderen door deeze Ziekte eerder aangetast, vermits hunne werktuigelijke Deelen als dan nog geheel en al uit eene lijmige stoffe bestaan, en derhalven zeer ligt regennatuurlijk verwijd worden.

Kinderen, geboren uit Ouders, welker Lighaamsgestel slap en week is; die een lui en zittend leven lijden; die overdadig eeten en te veel warme dranken gebruiken; die reeds door den minnehandel of ouderdom uitgeput zijn, en die meermalen een Druipert gehad hebbende, met hun uitgemergeld Zaad Kinderen hebben verwekt; zijn aan de Engelsche Ziekte het meest onderhevig. — En daarvan

is het, dat men deeze Ziekte ook bijna nooit ontmoet onder de stevige landlieden, maar meestal onder de groote en aanzienlijke lieden.

Dat de vrouwelijke kunne meerdere geschiktheid tot deeze Ziekte heeft, durve ik niet stellen (7); vermits in de eerste leeftijd het Lighaams-geftel van een gezond Meisje, met dat van een frissen Jongen niet verschilt; ook bevestigen de Waarneemingen deeze stelling niet.

Nu ga ik over, om optetellen, welke de Aanleidende Oorzaken zijn, die met de Voorgeschiedten deeze Ziekte voortbrengen; wij zullen het eerst handelen over de Natuurlijke Dingen, die verkeerd en als vijandelijk op het Lighaam van het Kind werken.

De voornaamste en meest voorkomende Oorzaak deezer Ziekte is de *Lucht*, als ze met veele waterige Dampen bezet is; en ze krijgt des te meer vermogen, wanneer ze te sgelijk door de Warmte is uitgezet. Want, indien de Kinderen, die in deeze hunne leeftijd reeds van eene slappe en weekke Lighaamsgesteldheid zijn, in eene vogtige en warme Lucht leven, word niet alleen de vrije uitwafeming verhinderd, maar zelfs, daar het Lighaam als door Waterdampen omringd is, word er door de opslurpen-

(7) Dit zegt DE VACHER DE LA FEUTRIE in *RICHTER'S Chirurg. Biblioth. Theil. II. St. II. pag. 65.*

pende Vaatjes, die zo wel in de Celletjes der Longen als de geheele oppervlakte des Lighaams openstaan, veel Water in het Lighaam gebragt, en met de Vogten vermengd, waardoor de afgescheiden Vogten, tot de voeding bestemd, zo verdund worden, dat ze de Vezelen van het Lighaam daardoor slap en week maken; maar daar en boven, (en dit is wel het voornaamste,) worden hierdoor de Vaten wijder en zij scheiden een Vogt af, dat, door het Water zeer verdund, en tot deszelfs werking ongeschikt is. — De Vaten der Lever, die in de Kinderen reeds van een losfer maakzel zijn, worden dus wijder en het Vogt, dat zij afscheiden, word door het Water dermate verdund, dat het den naam van Gal niet verdiend, en kan dus, onbekwaam tot de Spijsvertering, geen Phlogiston bij de Zuuren bijdoen; dus kan de Spijs geen Dierlijken aart verkrijgen.

Deeze vogtige Luchtsgesteldheid is Oorzaak, dat deeze Ziekte in de Landen, die nabij de Zee liggen, als Engeland, Holland en anderen, zo dikwerf voorkomt; — en dat men deeze droevige kwaal zo veelvuldig aantreft in de hutten der armen, die al hunne Huisraad te gelijk met zich in één klein slaapvertrekje hebben. — Hier van daan, dat men in de Steden, die nabij de Zee gelegen zijn, waar de schamele Inwoonderen in zeer vogtige Huizen, ja zelfs in Kelders woonen, geen Kind vind, of het heeft

door de Scheikundige proefneemingen van zeer vermaarde Mannen bewezen (9). Daar ze door de zagrere Zuuren; ja zelfs door de sterkste Vitriool, Salpeter en Zeezout-Zuuren niet gestremd word. — Het Zog is dus het beste voedsel voor Jonggeboornen, waarbij de Koemelk, Ezelinne en Schapenmelk niet komen. Want de Dieren-melk word eerder Zuur dan de Vrouwen-melk, vermits zij door de Gal in de Kinderen niet tot voedsel bereid kan worden.

Hier toe behoort ook de Pap, die schielijk eene Zuure gisting ondergaat, en de gezuikerde Spijzen, die daar en boven door hunne Zeepagtigen aart de vaste Deelen des Lighaams verflappen en ontbinden.

Wanneer de Kinderen eenige kracht in de Spieren hebben gekregen, is hun de lighaamsbeweeging hoogst noodzakelijk; daardoor immers word de omloop des Bloeds bevorderd, en gevolgelijk ook de voeding; — daar en boven vermeerdert hier door de kracht en stevigheid der Vezelen. — Het is derhalven voor deeze kleine Kinderjes zeer nadeelig,
en

(9) *Spielman* de lacte humano optimo infantum recens natorum alimento: *Voltelen*, obs. chemic. med. de lacte hum. ejusque cum asinino et ovillo compar. Traj. ad Rhenum 1775. Cap. III § 1. — *Bergius* Schewd. Abhandl. B. 34. pag. 40.

en dit is niet zelden de Oorzaak deezer Ziekte, als men hun alle lighaams beweeging onthoud, en ze in de Zisttoelen als opgesloten houd; vooral wanneer zij aanhoudend met de blote Billen boven den Pot zitten, waardoor de rottige uitwaseming van de Pis en Drekstoffen weder worden opgeslurpt.

Ziekten, waardoor de Kinderen in hunne allereeste jeugd worden aangetast, vooral zo daardoor de Werktuigelijke Deelen der Spijsverteering worden aangedaan, of het Lighaam verzwakt word, verwekken ook zeer dikwijls deeze Ziekte; hiertoe nu behoren al te sterke Ontlastingen, als Bloedstoringen, Buikloop en sterk Zweeten, het moeilijk uitbotten der Tanden, Kinkhoest, Wormen en meer anderen, die ik onnodig achte optenoemen.

Voor al moeten wij de tusfschenpoozende Koorts, (*Febris Intermittens*) bijzonder in de Herfst-tijd, niet uit het oog verliezen; die volgens getuigenis van SYDENHAM (1) zeer dikwijls in de Kinderen door de Engelsche Ziekte gevolgd word; en geen wonder, daar wij weten, dat na deeze Koorsfen de Buiks-Ingewanden als opgeblazen en grooter worden; dit hebben de Geneesheeren verkeerdelijk Verstopping genaamt, daar de beroemde REZIA (2) de

(1) Opera Medica, Genevæ 1775. Tom. I. pag. 59.

(2) Libro Citato.

de Vaten eerder verwijd en uitgezet gevonden heeft, het geen men ligtelijk kan afleiden, daar de omloop van het Bloed door de Vaten, wier natuurlijke stevigheid door gebrek van voedsel gedurende de Koorts minder word, door de prikkeling der Koorts sterker word. — Wanneer dus de Koorts een Kind aantast, zullen de Vaten der Ingewanden, die nog zo weinig vastigheid hebben, eerder uitgezet en de Lever grooter worden, waardoor eene wateragtige Gal, tot de Spijsverteering onbekwaam, word afgescheiden en dus de Naaste Oorzaak der Ziekte word voortgebracht.

NEGENDE HOOFD-DEEL.

Waarom Kinderen, boven drie jaren oud, deeze Ziekte niet krijgen.

Na den Aart en Oorzaken der Engelsche Ziekte te hebben nagegaan, zal ik tot dit Vraagpunt overgaan.

De Vrucht bestaat in de eerste dagen na de zwangerschap uit Slijm, geheel dun en doorschijnend, en zelfs schijnt het zamenstel des Lighaams, op de helft der Dragt, uit geene andere stoffe dan uit eene dikkere Lijmige stoffe te bestaan. — Het is dus overeenkomstig met de Waarneemingen, als wij stel-

stellen, dat s'Menschen eerste beginzelen door Slijm, dat het strembare Weijvugt van het Moederlijk Bloed oplevert, gevoed worden. — En wel in de eerste Maanden der Zwangerheid word door de Vaten der Moederhoek niets, dan dit strembaar, zeer dun Weijvugt naar de Vrucht gevoerd; dan na mate de Moederhoek en de Navelftrengs Vaten grooter worden, vloeien er ook andere Deelen, als Olie en Aardagtige Deelen door; die echter, in evenredigheid tot het strembare Weijvugt, in eene mindere hoeveelheid naar het Kind gevoerd worden, dan er in s'Moeders Bloed bevat is. — Dit bevestigt het Lighaams-gestel van een Jonggeboren Kind, nademaal die vasten stevigheid der vastere Deelen, die bij volwasfen werd waargenomen, in deeze geheel ontbreekt; zijnde de Spieren lijmagtig en als ontbloot van Peezen; de Beenderen zwak en flap, en uit los vereenigde Vezelen bestaande, zo dat dezelve eerder gebogen dan gebroken kunnen worden.

Dan zodra het Kind geboren is, en zijn eigen leven, (onafhankelijk van de Moeder:) leeft, dat is de Lucht inademt en door Spijzen gevoed word, die het door den Mond neemt, bespeurt men weldra verandering. — Wanneer het door geschikte Spijze gevoed word, en in eene zuivere Lucht leeft, groeit het lighaam meer en meer op, en word te gelijk stevig en sterk. — Maar zo men het voedsel geeft, dat

dat moeilijk te verteeren is, of dat het nog slappe Lighaams-geftel door andere uitwendige Oorzaken verder ontbonden word, dan krijgt het Kind de Engelfche Ziekte, en de voeding word teffens met den groei des Lighaams verhinderd.

Wanneer het Kind in de eerste jaaren goed en gefchikt voedsel krijgt, en daardoor de Lighaamskrachten dagelijks toeneemen, dan worden de Beenderen fteviger; de Spiervezelen worden meerder, zij worden rooder, en krijgen Peezige Einden; de Ingewanden, die in de holligheden van het Lighaams bevat zijn, en in de eerste jaren losfer en meer uitgezet waren, verkrijgen door dit voedsel haare vastigheid en grootere veerkragt. — Hierdoor worden haare Vaten nauwer en het geheele Ingewand kleinder; dat nu deeze vermeerderde vastigheid en kragt, die het Lighaam verkrijgt, aan de Aard-deelen moet toegekend worden, is uitgemaakt, daar de grootere evenredigheid van Aard-deelen, de Spieren, de Beenderen en Vliezen van volwasfen Menschen van die der Kinderen onderscheit.

Hoe vaster en fteviger nu de Ingewanden worden, des te meer worden zij tot de affcheiding van hunne eigene, zuivere en door Waterdeelen min verdunde, Sappen gefchikt: dus zal de Lever, vaster van maakzel geworden, eene geele, sterke, bittere Gal uitstorten, niet meer zo ontaart en Waterig als die
door

door de flappe, sponsagtige Lever in de Jonge Kinderen bereid word.

Deeze kragtige Gal is nu ook geschikt tot verteering der anderzints bezwaarlijk verteerbare Spijzen; zij verandert die in een Dierlijken Aart; zij vermengt het Phosphorisch Zuur, dat door het bijgevoegde Phlogiston gemaakt is, met Aarde, welke aan de Werkutglijke Deelen langs hoe meerder stevigheid geeft, en maakt die ter verrigting van hun eigen Werking van dag tot dag geschikt.

Indien dus het Kinderlijk Lighaam langzamerhand gevoed word met eeten, dat gemakkelijker verteert, en het word teffens behoed voor de schadelijke uitwerking der uitwendige Oorzaken, zal het als bij trappen het gevaar der Engelsche Ziekte ontduiken, terwijl het Lighaam door meerdere kragt der Spijsverteerende Deelen nu zo gesteld word, dat het ligtelijk de uitwendige en Aanleidende Oorzaken te loor stelt, en dat, offchoon die Oorzaken met zo veel kragt op het Lighaam werken, als waardoor zij in jongere Kinderen de Engelsche Ziekte zouden hebben te weeg gebragt, dit nu egter onbeschadigd blijft.

TIENDE HOOFD-DEEL.

Gesteldheid Van het Lighaam, na de Engelsche Ziekte.

Wanneer het Lighaamsgestel door gunstige omstandigheden, of door de hulp des Geneesheers verandert, ofte de Aanleidende Oorzaken ophouden, verminderen de Toevallen der Engelsche Ziekte langzamerhand en de Lijder word hersteld.

De Werktuiglijke Deelen der Spijsverteering worden door verloop van tijd sterker, en daar door gaan de Spijzen, nu wel verteerd, tot beter voedsel voor het Lighaam over. — De Beenderen, die door gebrek der Aardagtige Deelen geheel week waren geworden, verkrijgen ook nu door toevoer van nieuwe Aarddeelen vast- en stevigheid; de Spieren krijgen sterkte en kragt; de Vliezen en de Vaten, die uit dezelve 't zamengesteld zijn, worden vaster en meer veerkragtig; desgelijks vermeerderd ook de Prikkelbaarheid der Deelen en het Zamen-trekkend Vermogen der Vaten; daardoor worden de Vogten, volgens de Wetten der Dierlijke Huishouding, op nieuw rond gevoerd; de Deelen worden gelijkelijk gevoed, en dus word de gezonden staat des Lighaams hersteld.

Als de Toevallen deezer Ziekte ophouden, en de
Ziek-

Ziekte word beter, bespeurt! men een bijzonder verschijnsel, namelijk de te voren gekromde en verdraaijde lange Beenderen krijgen niet zelden hunne vorige gedaante weder; de Oorzaak daarvan moet gezocht worden in den toevoer der Aard-Deeltjens, in dat tijdperk der begonnen voeding, waarin de Beenderen, die eerst week geworden waren, wederom eenige kragt hebben bekomen, en nu door hunne veerkragt hunne vorige gedaante herkrijgen. — Dan, wanneer de Ziekte lang geduurd heeft, en de Spieren aan de eene zijde der Ledematen opgekrompen zijn, dan blijven de Beenderen zo gebogen, en alle hoop op herstel deezer wanstaltigheid, zo door de Natuur als door de Konst, is geheel verloren.

In den loop deezer Ziekte gebeurd het niet zelden, dat de Ruggegraat, die sponsagtig is, door de Spieren, die aan één der Zijden sterker werken, een weinig na die kant overhelt en gekromd word. — Maar daarna, wanneer de Spieren, na de Ziekte, meerder kragt bekomen, zo worden ook de Spieren van die eene Zijde sterker dan die der andere, waardoor de Ruggegraat, om dat de Lighaamen der Wervel beenderen aan de ééne zijde als atgeschuurd zijn, naar die zijde overhelt. — Die aan dit gebrek onderhevig is, zal, wanneer zijn Lighaam buiten den Haak raakt, en de geheele langte der Colom van de Ruggegraat, de leiding, die deeze door de

kromte gekregen heeft, volgt, hetzelfde door gedurige pogingen naar de tegenovergestelde Zijde overbuigen, en, door deeze verandering van het postuur van zijn Lighaam, hersteld hij wel deszelfs evenwigt, maar, nadat de Engelsche Ziekte geheel genezen is, veroorzaakt hij zig eene tweede kromte van de Ruggegraat, zo dat deszelfs buiging een S maakt. — Deeze wanstaltigheid, die alleen uit de Engelsche Ziekte ontstaat, word *Scoliosis* genaamt, waardoor de Borst van voren en de Rug van achteren als een Bult uitpuilen.

De Naaste Oorzaak der Ziekte weggenomen zijnde, worden de Beenderen, die gedurende de Ziekte week en sponsagrig geworden waren, nu (als de Aarde tot derzelver voeding gebezigd word) uit hoofde van de verwijding der voedende Vaten, spoedig door veel Aarde gevuld, en verkrijgen in korten tijd meerdere vastigheid, dan zij zouden gehad hebben, wanneer zij door deeze Ziekte nimmer waren aangedaan geweest. — Dit blijkt duidelijk in de Beenderen van volwasfenen, die in hunne eerste jeugd de Engelsche Ziekte gehad hebben, dewelke van eene zo dikke en vaste zelfstandigheid zijn, dat zij niet dan met zeer veel moeite kunnen doorgezaagd worden, en dan vind men dezelve zo hard als Yvoor. — Men vind ook de Beenderen, na dat de Ziekte reeds voor langen tijd genezen is, dik-

dikker, doordien het sponsagtig Beenvlies als eene zeer dikke Beenige Korst op het Been ligt.

Dan, vermits, na de Ziekte, in zo korten tijd, eene zo groote hoeveelheid Aard-deelen door de verwijde voedende Varen, naar de Beenderen gevoerd word, verkrijgen dezelve zo spoedig zodanig eene vastigheid, dat daardoor de groei des Lighaams gedurende het geheel leven verhinderd word; die is de reden, waarom zij, die in hunne eerste jaren de Engelsche Ziekte gehad hebben, nimmer tot dien trap van vollen wasdom geraken, die zij zouden bereikt hebben, indien zij van deeze Ziekte waren bevrijd gebleven.

Uit dit alles kan men de reden opmaken, waarom zij, die door deeze Ziekte niet worden weggerukt, vooral zo de kwaal tot na het vijfde jaar geduurt heeft, Bultig, Dwergagtig, Krom of anderzints mismaakt zijn.

ELFDE HOOFD-DEEL.

De Dood, door de Engelsche Ziekte veroorzaakt.

De meeste en bijna alle Ziekten, waardoor het Menschelijk geslacht verwoest word, doen dit, wanneer door dezelve het Lighaam ontbonden en vernield word, door de verrotting der Deelen. — Het tegendeel bespeurd men in deeze Ziekte; want deeze Lijken verspreiden in plaats van eene Loogzoutige

rottige Lucht, Zuuragtige Dampen; een klaar bewijs, dat de dood in deeze Ziekte op eene geheel andere wijze veroorzaakt word, als in andere Ziekten: dit bevestigt ook het verschil der Toevallen gedurende den loop der Ziekte,

Want in de overige Ziekten, waardoor het Lichaam vergaat, beginnen de Deeltjes van het Lichaam te verrotten en, wanneer zij in hun hoofdbeginfelen ontbonden worden; dan vermeederen de ontwikkelde Vonkjens zeer de warmte des Lighaams, en de scherpheid der vlugge rottende Deelen prikkelt het Hart en de Vaten, waardoor de Koorts word veroorzaakt,

Dan in deeze Lijderen word de Verrotting der Deelen, door het Zuur doortrokken, verhinderd, waarom men ook bijna geene warmte des Lighaams bespeurt, maar veel eer koude en bleekheid der Ledematen.

De Pols word niet radder, maar langzaamer dan de natuurlijke en traager, en gedurende den geheelen loop der Ziekte is er geen Koorts, uitgezonderd een Sluip-koortsje, dat er zomtijds op 't einde der Ziekte bijkomt.

Word de Dood in andere Ziekte verhaast door verschillende Oorzaken, waardoor de Werktruijke Deelen door onbinding van derzelver bestaandeelen vernield worden; zo sterven deeze Lijders door eene andere Oorzaak, te weten, door bedorven Spijsvertering

ring en overvloed van raauw Zuur; behalven eene bedorven Slijm, word er tot de voeding van het Lichaam niets anders aangewend; hierdoor word eene algemeene Uitteering, Verslapping en Ontbinding der Vezelen veroorzaakt, en langzamerhand vergaat alle de Prikkelbaarheid: daar nu hiervan alleen s' Menschen leven afhangt, is de Dood, na dat de Prikkelbaarheid uitgebluscht is, onvermijdelijk; want de Slagaderen, onbekwaam door hunne eigen kragt het Bloed voorttefluwen, maken een hinderpaal voor het Hart, dat door de groote verzwakking van deszelfs Vezelen deeze hindernisse niet kan overwinnen, en dus houd met den omloop des Bloeds te gelijk het Leven op.

Het Sluipkoortsje, dat men op het einde der Ziekte bespeurd, word geenzints door de Prikkelende Deeltjes van het verrotte Bloed, (gelijk in ander Ziekten) veroorzaakt, maar hangt af van de pogingen van het Hart, om het weerstandbiedende Bloed, dat in de Slagaderen, die reeds alle Prikkelbaarheid verloren hebben, als stil staat, voort te stuuwen. — Hier bij komt, dat, wanneer de omloop des Bloeds zo aanmerkelijk vertraagd is, de bedorvene Deelen door de Ontlastende Wegen niet geloosd worden, en langzamerhand beginnen te rotten, het welk de verrotte stinkende Buiksonstastingen, die men aan 't einde der Ziekte waarneemt, klaar aantoonen.

DERDE AFDEELING.

De Geneezing der Engelsche Ziekte.

TWAALFDE HOOFD-DEEL,

*De Middelen ter Geneezing deezer Ziekte, door
de Artzen aangetoond.*

D AAR het geen er wegens het Onderscheid deezer Ziekte en haare Voorzegging hier te zeggen stond, reeds genoeg door zeer *Vermaarde Mannen*, die deeze Ziekte beschreeven hebben, gezegd is, en van *SWIETEN*, de Uitlegger van den Grooten *BOERHAVE*, deeze taak bijna geheel afgedaan heeft (3), en op dit stuk in de opgegeve Vrage, als genoeg bekend en klaar, niet word aangedrongen; zo ga ik dadelijk, na den Aart en Oorzaken der Engelsche Ziekte behandeld te hebben, over tot derzelver Geneeskundige Behandeling; en geve eerst de Ge-
nees-

(3) Comment. in *H. Boerhaave* Aphorismos de cogn. et cur. morbis. Tom V. p. 592 et seq.

neesmiddelen op, die door onderscheiden Schrijvers tegen deze Ziekte zijn aanprezen.

De meeste Middelen, die ter genezing der Engelsche Ziekte voorgegesteld worden, zijn uit het *Planten-Rijk* genomen.

GLISSONIUS voornamentlijk prijst zeer de *Rhabarber* aan (4), gelijk ook meer anderen doen (5).

WILLIAM FORDYCE heeft veele Lijders genezen met eene gifte van drie tot ses grein Rhabarber en tien grein Sal Polychrest, alle ochtend toegediend, waardoor vooral de Buikloop verminderde (6). ZEVIANI verzekert, dat de Rhabarber nimmer goede uitwerking doet, ten zij vereenigd met het *Ens Veneris* (7).

ROSENTEIN is in vermoeden, dat de Water Patick (*Rumex Aquaticus*), die soms in plaats van de Rhabarber gebezigd kan worden, wel eenig vermogen tegen de Engelsche Ziekte heeft (8).

De Meekrap, (*Rubia Tinctorum*) die tot in de Beenderen doordringt en dezelve volgens ge-

not

(4) Tractatus de Rachitide.

(5) Strack; de Rachitide in Act. Phys. Med. Hasliacis. Vol. I. Art. 24.

(7) New inquiry into the Causes of putrid and inflammatory Fevers.

(7) Della cura dei *Bambini* attaccati delle Rachitide: Veron. 1761. et in Comm. Lips. Vol. 12. pag. 419.

(8) Loco citato. pag. 596.

nomene Proeven rood verwt, is ook tot de Genezing deezer Ziekte, die flegts als eene Ziekte der Been-deren beschouwt is, gebruikt. LEVRET heeft deeze Wortel het eerste inwendig voorgeschreven; hij liet een Once *Tartarus Solubilis* en even zo veel *Mee-krap* met 4 pond Water koken, en dan gaf hij dit, na er Honing te hebben bijgevoegd, den Kinderen te drinken (9).

Hij heeft veele navolgers gehad, waaronder den Vermaarden ROSENSTEIN, die gewilt heeft, dat men het afkookfel van deeze Wortel met veel Water aangengt en met Venkel als ook Oranjeschillen smakelijk gemaakt, den Kinderen tot hunnen gewonen Drank zoude geven (1). HALLER verkiest de Infusie deezer Wortel boven het Afkookzel (2). SICH1 (3) heeft waargenomen, dat dit middel, in gevalle het Kindje dit bitter Afkookzel tegenstaat, aan de Minne ingegeven, heilzaam is.

HALLER tekent aan, dat de Steenbreke, (*Saxi-fraga*) door de Engelschen in deeze Ziekte gebezigd, dikwerf zeer wel aan de verwagting heeft beantwoord (4).

PFR.

(9) l' Art des Accouchemens. p. 280.

(1) L. C. pag. 594.

(2) L. C. pag. 197.

(3) Vid. *Frnka*, L. C. pag. 262.

(4) L. C. pag. 197.

HARTMANN (5) geeft deeze Lijders de Hertstonge (*Scolopendria*) en Steen-Ruik (*Ruta Muraria*) tot ses Drachmen, gekookt met Water tot twaalf Oncen.

Hij tekent ook aan, dat de *Tamarisc-bast*, in Water afgetrokken, met vrugt is toegediend (6).

STÖRK prijst de Dolle Kervel, (*Cicuta*) tegen de Engelsche Ziekte aan, en verzekerd, dat een Jongetje, die andere Middelen vrugteloos gebruikt had, daar door volmaakt hersteld is, hebbende in 8 dagen de gifte tot 6 grein daags gebragt (7), daarna heeft hij met nut gebruik gemaakt van Pillen uit het Extract van Dolle Kervel, Spaansche Zeep en Sijroop van Duiven-Kervel (*Syrupus Fumariae*) (8).

Hij verzekert ook, dat door het *Extract* van Munnikskappen (*Aconitum*) de Engelsche Ziekte en de Winddoorn (*Spina Ventosa*) geheel genezen zijn (9).

HALLER prijst de Duivelsdrek, (*Asa Fetida*) zeer aan, door welke alleen twee Broeders, die de Engelsche Ziekte hadden, volmaakt hersteld zijn (1).

Het

(5) Formulæ Remediorum Lips. 1771. No. 697.

(6) L. C. No. 771.

(7) Libell. de Cicuta. Vindob. 1761. Casu 32 et 24.

(8) Mediz. Pract. Unterricht für Feld und Land Wundartze, Wien. 1776. theil II. pag. 197.

(9) Libellus de Stramonio, Hyosciamo, Aconito Vien. 1762. pag. 110.

(1) L. C. pag. 197.

Het zachte Afkookzel van *gebrande Eikels*, welker vermogen door SCHRÖDER ter geneezing van zo veele Ziekten beproefd is, word door Hem, als een geschikt Geneesmiddel tegen de Engelsche Ziekte, zeer aangeprezen (2).

DE HAEN getuigt, dat het door Waarnemingen gebleken is, dat de Koorts-bast (*Cortex-Peruvianus*) zeer veel in deeze Ziekte der Kinderen vermag (3).

Dan CULLEN beklaagt zig, dat men dezelve, uit hoofde der sterke bitterheid, in geene grote hoeveelheid aan de Kinderen kan ingeven (4).

ROSENSTEIN verzekert, dat Hij door het *Sal Essentiale* van de *Kina*, gedurende negen Maanden, tot tien grein dagelijks toegediend, deeze Ziekte heeft genezen (5).

WEPSTER heeft Stovingen en Clijsteeren uit het Afkookfel van de *Kina* met een goeden uitslag gebruikt (6).

Hiertoe behooren ook de Inlandsche Basten, Kruiden en Wortels, die dikwerf in plaatse der *Koortsbast* met vrugt zijn toegediend (t. w.) de *Eike* en
Wil-

(2) Von den Wirkungen der Eichlen pag. 28 — 33.

(3) Ratio medendi.

(4) First Lines of Practics of Physick, Tom. IV.

(5) L. C. pag. 589.

(6) L. C. pag. 148.

Willigebast (7) de Nagelwortel (*Radix Gel Urbani*), - Zevenblad (*Tormentilla*) &c. Waterkers (*Trifolium Fibrinum*); kleine Santorij (*Centaureum Minus*) &c.

Tot de tweede Classe der Geneesmiddelen, uit het *Rijk der Delfstoffen* genomen, behoren

De Staal-middelen: CAMPER roemt uitermate zeer de *Crocus Martis* met opslurpende Middelen vereenigd.

STÖRCK mengt het *Vijfel* van *Staal* met de *Rhabarber Wortel*, en geeft daarvan tweemaal des daags tien grein (8).

Er is er, die het gebruik van het *Staal* in substantie afraden, uit hoofde der zwakheid der Maag in deeze Lijdertjens, en verkiesen daarom liefst hetzelfde, in een Planten-Zuur ontbonden, toe te dienen. — BOERHAEVE prijst den, door hem bereiden *Staalwijn*, als een voor Vrijsters en Jonge Kinderen onschatbaar, Geneesmiddel, zeer aan (9).

BOER-

(7) GUNTZ heeft uit de *Cortex Salicis Capreae* Badstovingen gemaakt, en het Afkooksel van de *Salix Vitellina* tot Drank gegeven, zie deszelfs Disfert. de Cort Salicis.

(8) Loco Citato.

(9) *Elementa Chemicæ*. L. B. 1732. Tom. II. pag. 445.

BOERHAVE (1) ARMSTRONG (2) en HALLER (3) hebben onderscheiden Genees - wijnen (*Vina Medicata*) uit het Staal, Specerijen, bittere en zamentrekkende Kruiden gemaakt, aangeprefen. — Wanneer men den Staal - wijn den Kinderen niet in kan krijgen, dan raad ROSENSTEIN de natuurlijke of de door konst bereide *Minerale Staalwateren* aan (4). de *Flores Salis Ammoniaci Martiales* ofte anders gezegt het *Ens Veneris Boylei* zijn als een Specificq middel tegen de Engelsehe Ziekte aangeprezen; ZEVIANI getuigt, dat Hij zig van dit Middel altijd met een zeer gelukkig gevolg heeft bediend (5), en BOERHAVE heeft het zelve tot twee grein daags voorgeschreven (6).

BENEVOLI heeft de *Flores Salis Ammoniaci* met Koperdeeltjes bezwangerd, met goed gevolg laten gebruiken, volgens getuigenis van VAN SWIETEN (7).

De *Kwikmiddelen* worden van de meesten als
fcha-

(1) Mater. Medic. ad § 1489.

(2) Über die gewohliche Kinder Kranckheiten und deren behandlung pag. 103.

(3) L. C. pag. 197.

(4) L. C. pag. 598.

(5) L. C. pag. 129. et seq.

(6) Mat. Med. ad § Cit.

(7) In Comm. Tom. V. pag. 628.

schadelijk in deeze Ziekte, verworpen. — Echter prijst ze de Hoogl. BROMFIELD, in 't begin der Ziekte aan, die in het verkeerd denkbeeld stond, dat hij door dit Middel de Klierverstoppingen losmaakte (8).

VOGEL raad het gebruik der Kwikmiddelen aan, wanneer de Engelsche Ziekte met Wormen vergezeld is (9).

De Spiesglasmiddelen (*Antimonialia*) zijn ook in deeze Ziekte beproefd: te weten het *Sulphur Auratum Antimonii* de *Kermes Mineralis*, *Vinum Antimoniatum Huxhami*; UNZER raad aan om deezen Kinderen in plaatze der Snoeperijen en Zoeigheden liever Spiesglas-Koekjes te geven (1).

Dat de *Aluin*, onder de Middenzouten iets vermag ter Geneezing deezer Ziekte, schijnt deszelfs zamentrekkende, en versterkende kragt aan te duiden: men geeft het in Water of in Weij van Melk ontbonden, voor den gewoonen drank. — Zommige Engelsche Geneesheeren bereiden een Bad uit eene grootere hoeveelheid Aluin (2).

Aan

(8) Chirurgical Observations and Cases, vld. *Richters* Chirurg. Biblioth. B. II. ft. 2. pag. 137.

(9) Prælect. Cit. pag. 552.

(1) Den Artz. Tom. 8. pag. 187.

(2) Zie *Wepster* l. c. pag. 149.

Aan de Aardagtige Middelen, die het *Zuur* opslurpen, word, daar ze het eerste gewrogt der Ziekte wegeemen, door de Artsen zeer veel toegeschreven: hier toe behooren Krijt, Kreeftoogen, Eijerschalen enz. — DE HAEN verhaalt, dat Hij door het Poeder van Gecalcineerde Oesterschelpen alleen, veele Kinderen die de Engelsche Ziekte hadden, genezen heeft, (3). alſchoon CULLEN getuigt, hiervan geene de minſte uitwerking te hebben gezien (4), intuſſchen verzekerd HALLER, dat alleen door het gebruik van Aardagtige Middelen een Kind, dat de Engelsche Ziekte had, hersteld is (5).

ROSENSTEIN verkiest de *Loogzoutigen* boven de *Opſlurpende Aardagtige Middelen*: hij ontbind een halv Once *Zout van Wijnſteen* in een pond Water en geeft daar van aan de Kinderen van 20 tot 100 druppen (6). ABILGARD heeft bij het Afkookſel der Koortsbast en Meekrap het Zout van Wijnſteen gedaan, met dat gelukkig gevolg, dat hij een Jongetje, dat de Engelsche Ziekte had, en overal met Zweeren bezet was, volkomen hersteld heeft (7).

Uit

(3) L. C. Tom. IX. pag. 248.

(4) L. C. pag. 256.

(5) Disf. citat. pag. 196.

(6) L. C. pag. 596. et seq.

(7) Societ. Med. Havniensis Collect. Vol. I. pag. 1.

Uit het *Dieren-rijk* hebben de Geneëskundigen weinig Middelen ter Genezing deezer Ziekte gevonden.

ROSENSTEIN en KNAOK (8) hebben de *Osfengal* bij wijze van Pillen gebruikt, en METZGER beveelt het *Zap van Pisfebedden* aan (9).

Voormaals heeft de Heelkunde ook het haare ter Genezing der Engelsche Ziekte toegebracht. — GLISSONIUS tekent aan, dat door de Oude Geneesheeren, ten dien einde, Aderlatingen, Scarificatiën in de Schulp van het Oor, Bloedzuigers, Koppen, Etterdragten en Spaansche Vliegen, (wie zoude dit immer geloofd hebben!) beproefd zijn (1).

HALLER heeft de Wrijvingen met een Wollen Lap, doortrokken met den Damp van Mastik, Wierook, Stijrax, Benzoë, in de Engelsche Ziekte nuttig en heilzaam bevonden (2).

HARTMANN wil, dat men uitwendig verscheiden smeeringen doe, vooral op den Buik en de Ruggegraat (3). HALLER gebruikt daar toe het *Unguentum de Styrace*, de Duivels-drek, den Geest

(8) L. C. pag. 597.

(9) Entwurff einer Medicina Ruralis in Comment, Lipsf. Tom. 27 pag. 98.

(1) L. C. pag. 340 et seq.

(2) L. C. pag. 199.

(3) L. C. No. 603.

Geest van het *Ammoniak Zout*, den Geest van Lepelblad en de Kaneel-olie (4). de Schotten smeeren de Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, met het *Oleum Hepatis Scatinae*, waarmede WEPSTER veelen genezen heeft (5).

DE RTIENDE HOOFD-DEEL.

Beoordeeling der Geneesmiddelen tegens de Engelsche Ziekte.

Wanneer men iets zekers omtrent de kracht der Geneesmiddelen in de Ziekten bepalen wil; moet men den Aart en de Oorzaaken der Ziekte, als ook de wijze, waarop de Middelen op het Lighaam werken, wel kennen; dan hoe verre wij van deeze wijze van beoeffening der Geneeskunde afzijn, weet en erkent ieder rondborstig Geneesheer, en Hij zal dit zonder bloofen, niet kunnen lochenen: zeker is het, dat wij veele Geneesmiddelen aan de onzekere proeven der Kwakzalvers verschuldigd zijn; een gelukkige, dog toevallige, uitkomst heeft er veelen ingevoerd; weinigen zijn er door beredeneerde Waarneemingen ontdekt.

De

(4) L. C. pag. 200.

(5) L. G. pag. 149 Sequ.

De menigte van Geneesmiddelen, die tegen de Engelsche Ziekte werden aangeprezen, is daarom zo groot geworden, omdat de Ziekte onder derzelver gebruik niet zelden ophield; dan meestal is de Kwaal niet door deeze Middelen t'ondergebracht, maar ze is of door het wegneemen der Aanleidende Oorzaken, of door eene gunstige verandering in het Lichaam te weeg gebracht.

De Hertstong (*Scolopendria*), Steenruit (*Ruta Muraria*), Steenbreek (*Saxifraga*), Water Patick (*Rumex Aquaticus*) hebben weinig, ja ik durve verzekeren, niets tot de Genezing deezer Ziekte toegebracht; vermits derzelver zamentrekkende kragt zo gering is, dat ze met recht onvermogen moeten gehouden worden, om de zo zeer verzwakte Deelen samen te trekken en te versterken.

De Duivelsdrek (*Asa fetida*), Dolle Kervel (*Cicuta*) en Munnikskap (*Aconitum*), die door HALLER en STORK, zo zeer tegen de Engelsche Ziekte geprezen worden, durve ik zeggen, dat in deeze Ziekte meer kwaad dan goed gedaan hebben. — Want vermits de prikkelbaarheid in het lichaam van een kind, dat de Engelsche Ziekte heeft, uit hoofde der afgenomen kragt der deelen (*tonus*) vernietigd is, wat voordeel, bid ik u, kan men van deeze Middelen verwagten, die door hunne uitdampende deelen, uitwijzens de gedane Proeven en

Waarneemingen, het vermogen der Zenuwen zo zeer krenken?

De *Kwikmiddelen* zijn voor deeze Ziekte geheel niet dienftig, daar dog deeze bijna alleen in de Dierlijke Slijm ontbonden worden en die daarna, onveranderd, langs onderscheiden wegen uit het Lighaam uitdrijven, en daar die Slijm het eenige voedsel is van een Kind, dat de Engelsche Ziekte heeft, moet gevolgelijk, als men de Slijm nog wegneemt, de voeding geheel ophouden, en de dood verhaast worden; zij zijn echter uitwendig van nut in een *Beeneeter* bij Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben.

De bereidingen uit het Spiesglas, (*Antimonium*) zijn, vooral in Zuuren ontbonden, vermits zij het gedarmte sterk prikkelen, en veele Vogten daar na toe lokken, nadeelig, vermits daar door de kragten van het zwak Lighaam nog meer gekraakt worden, en de voeding, die reeds bijna ophoud, geheel en al wegneemt, daarom behoort men deeze uit het getal der Geneesmiddelen tegen de Engelsche Ziekte geheel uit te schrappen, ten zij ze in zulk een gift werden toegediend, dat daardoor niet de Buikontlasting, maar wel de omloop van het Bloed en de Uitwaseming bevorderd werd.

De Geneesheeren hebben geloofd, dat de opflurende Aarde en de Loogzouten zeer voordeelig zijn,

ver-

vermits daardoor de kragt van het Zuur bedwongen word; en ik wil niet ontkennen, dat zij zomwerf het hunne tot Genezing der Engelsche Ziekte hebben toegebracht; dan men zal mij niet ligt wijsmaken, dat door deeze Middelen de Engelsche Ziekte in den grond genezen is, vermits zij de Hoofdoorzaak niet kunnen wegneemen, offchoon het Zuur voor een korten tijd door dezelve getemperd word.

De Hulpmiddelen, die de Heelkunde ter Genezing deezer Ziekte aan de hand geeft, zijn voor de Lijders allernadeeligst; want, doordien het Lighaamsgeftel, uit hoofde der zo zeer verminderde zamenhang der Vezelen, zo ver af is van den staat van ontteeking; zullen de Aderlatingen; de herhaalde Infnijdingen (*Scarificatien*); de Etterdragten, en wat dies meer is, niet alleen geen nut doen, maar veel eer, door verlies der Sappen, de kwaal verzwaren; maar daar de Wrijvingen van het Lighaam, door eene matige prikkeling der vaste Deelen, meerder kragt geven, de Prikkelbaarheid vermeerderen en den omloop des Bloeds bevorderen, moeten ze in de Engelsche Ziekte niet verzuimd worden. — Dan de Olieagtige Smeeringen, vermits ze door de verstopping der Poren de Uitwafeming beletten, zijn aftekeuren en te verwerpen.

Vermits de Eerste en Naaste Oorzaak der Ziekte, in de tegennatuurlijke vergroting der Lever door de

verwijding van haare Vaten; en in eene kragteloofte en wateragtige Gal beftaat; zo zullen alle die Mid- delen, waardoor dit Ingewand meerder kragt bekomt, uitwerken, dat er eene fterkere Gal, die tot de Spijs- verteerling bekwaam is, afgefcheiden, en dus de Ziekte t'ondergebracht word.

Aan dit oogmerk voldoen de *Bittere Zamentrek- kende Geneesmiddelen*, die het Plantenrijk oplevert; als de Bitterwortel (*Gentiana*), kleine Santorij (*Centaureum minus*), Waterklaver (*Menyanthes Trifoliata*) de Eijken en Willigen bast enz. de Rhabarber, boven al de Koortsbast, die in de Vog- en van het gedarmte afgetrokken, met het Bloed ver- mengd, de Vezelen verfterken en zamentrekken.

De kragtigfte Geneesmiddelen in deeze Ziekte, leveren de *Staalmiddelen* op, niet alleen uit hoofde van haare zamentrekkende kragt, maar ook omdat ze ligtelijk in de raauwe Zuuren, die in de Inge- wanden zijn, ontbonden worden en veel Phlogifton in het Gedarmte ontwikkelen, dat in de Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, hoofdzakelijk ontbreekt.

VEERTIENDE HOOFD-DEEL.

Voorbehoeding tegen de Engelsche Ziekte.

Een gezond Lighaam kan door geen Geneesmiddelen tegen Ziekten beveiligd worden, vermits die het vermogen hebben om het Lighaam aanmerkelijk te veranderen; en daarom even zo als zij een Ziek Lighaam door haar vermogen herstellen; zo maken ze ook een gezond Lighaam Ziek. De Ziekte word dus niet afgewend door toegediende Geneesmiddelen, maar door het wegneemen der Oorzaken, die te gelijk met eene bijzondere Lighaams-gesteldheid de Ziekte verporzaken.

Maar wanneer het Lighaamsgestel reeds tegen-natuurlijk zo veranderd is, dat het alleen eene Aanleidende Oorzaak nodig heeft ter voortbrenging der Ziekte, dan moet deeze Ziekelijke Voorgeschiedheid zekerlijk door Geneesmiddelen verbeterd worden. Deeze Voorgeschiedheid der Kinderen tot de Engelsche Ziekte nu, kan men ontdekken, als de Huid slap en gerimpeld; het Aangezicht bol en bleek is; als het Kind knorrig is en aanhoudend schreeuwt; als het niet staan wil; of, als het reeds gelopen heeft, en op eens loom word, en niet meer lopen wil; als het altoos hongerig is, en hoe veel het ook eer,

nimmer kan verzadigd worden; als het een dunnen afgang heeft en Wurmen loost.

Geen Leeftijd is voor deeze Ziekte varbaar, dan de eerste Kindsheid, en deeze Lighaams-gesteldheid der Kinderen komt met de Wetten der Natuur overeen, en ze kan niet anders zijn, of er ontstaat eene Voorgeschiedheid tot andere Ziekten; het slappere Lighaams-gestel dog en de zo groote Lever, zelfs in de gezondste Kinderen, zijn aan deeze Leeftijd zo eigen, dat zij, zonder het grootste nadeel voor de gezondheid, niet anders kunnen zijn; daar nu de gezondheid van het Lighaam van een Kind eeniglijk hierin gelegen is, dat hetzelfde groeit en de Werktuiglijke Deelen, door de voeding dagelijks toeneemende, schielijk tot een zekeren trap van volkomenheid geraken; zullen wij aan den groei van het Lighaam, en aan de gezondheid van het Kind het grootste nadeel doen, indien wij door Geneesmiddelen het slappe Lighaams-gestel veranderen, of het maakzel der Werktuiglijke Deelen meer, dan behoorlijk, trachten te versterken; want de Lever is in Kinderen voornamentlijk daarom zo groot, op dat er eene dunner Gal zoude afgescheiden worden, die, ongeschikt tot bereiding van eene grotere hoeveelheid Phosphorisch Zuur, oorzaak is, dat de Deelen niet zo spoedig met gephosphoreerde Kalk gevuld worden,

den, en dus de groei des Lighaams belet worde.

Dus blijkt het hier uit, dat de gesteldheid van het Lighaam, waardoor het tot de Engelsche Ziekte voorgeschiedt word, dikwerf de gezondste staat is van het Lighaam der Kinderen; en dus zoude het gebruik der voorbehoedende Geneesmiddelen even eens zijn, als eene andere kwaal te veroorzaken, die nog schadelijker was.

Dus is de eenige wijze van Voorbehoeding deezer Ziekte, de Aanleidende Oorzaken, die, op het Lighaam van het Kind sterk werkende, deze Ziekte noodzakelijk voortbrengen, afwenden en wegteneemen; onder deeze verdient eene vogtige warme Lucht de eerste plaats, die het Lighaams-gestel zeer slap maakt, de afscheidingen verhinderd en dus de Engelsche Ziekte veroorzaakt.

In de Nederlanden, daar de overstromende Wateren de Lucht met de opgeheven dampen bezwangeren, waar dierhalven de inwoonderen in eene vogtige Lugtgesteldheid leven en de opslurpende vaten der Huid en Longen aanhoudend veel water opneemen; vermag de Geneeskunde tegen eene zo algemeene en vermogende oorzaak weinig. — Hier kan de Overheid meer doen, met die Plasfen uit te droogen of op eene andere wijze wegteneemen.

Dan hoe zeer neemen de Oorzaken deezer Ziekte

niet roe, wanneer wij de Steden, in die Provinciën gelegen, nagaan? De Lucht, reeds met veele Waterdampen bezwangerd, word in dezelve door de hooge Muuren als ingesloten; de hooge Huizen bevatten enge Straaten; dus staat er de Lucht in stil, en word aanhoudend door de menigvuldige inwoonderen en uitwasemingen verder bedorven. Hier bij komen nog de dampen van Moerasfen en Waterbronnen, de uirademingen der Beesten in de Stallen en stinkende Riolen, waardoor de vogtige Dampkring met deeze schadelijke Dampen nog meer vervuld en als verzadigt word; en dit is oorzaak, dat de bewoonderen deezer Steden niet vrij uitwasemen en hun Lighaam zich van die bedorven deelen niet ontlast, maar zelfs op nieuwer waterige en verrotte deelen opslurpt.

Wanneer wij nu nog eens de Huisjes der, arme Lieden in die zo bevolkten Steden bezien; (die klein, morsig, en onderaardsch zijn en die in stilstand water liggen en zeer vogtig zijn,) zo behoeven wij ons niet te verwonderen, dat men, wegens deeze vermeerderde oorzaak der Ziekte in de schamele Hutten der Armem geen Kind vind, dat van de Engelsche Ziekte vrij is.

Daar nu, hoe een Stad meer bevolkt is, het getal der Geboggelden, Krommen en Dwergen ook grooter word, die ongeschikt tot werken, onbekwaam zijn om voor zich de kost te winnen, door
het

het Gemeen moeten onderhouden worden; moest de zorg der Overheid vooral daar heen zig uitstrekken, om deeze Kwaal, die dagelijks, tot het grootst nadeel van het Gemeenebest, toeneemt en het menschelijk geslacht ondermijnt, te verminderen. — Hierin kan de Geneeskunde niets doen, daar ze de Oorzaken, die aanhoudend op het Lighaam werken, niet kan afweeren; daar er hier een groote hoop van Oorzaken bij een komt, welken te verbeteren of te vernietigen, eene zo dwaaze onderneeming zoude zijn, als den Rhijn te willen uitputten.

Dan, offchoon wij de Oorzaken niet geheel kunnen wegneemen, kunnen wij ze egter gemakkelijker vermijden en haare schadelijke uitwerking voorkomen; het zoude daarom een groot voordeel voor de Provinciën zijn, als de Overheid buiten de Steden een groot Gebouw maken liet, waarin de Kinderen in de eerste jaren van hun leven mogten woonen, tot dat zij sterker geworden zijnde, het gevaar deezer Ziekte ontworsteld waren. — Dit Huis moet ruim en hoog gelegen zijn, de Lucht moet er een vrijen doortogt door hebben en in den omtrek geen dampen van stilstaand Water zijn. Zo zoude het Gemeenebest, door met deeze geringe onkosten het getal van mismaakte Burgers te verminderen, grotere uitgiften sparen.

De rijkere Inwoonders moeten hunne jonggeboren
Kin-

Kinderen in geen warme Benedenvertrekken opsluiten, maar op Bovenkamers doen huisvesten; de Kamer moet ruim en groot zijn, met Winddrijvers en een Schoorsteen voorzien, opdat de Lucht gestadig vernieuwd worde; de grond moet bestrooid worden met Zand, dat bij eene heete Kachel gedroogd is, vermits de ondervinding geleerd heeft, dat het drooge Zand de vogtigheid der Lucht zeer sterk naar zich trekt en dus de Lucht zuivert (6). Men moet zig van den reuk van Mastik en Stryax, alsook van allerlei berookingen, die de Lucht met vogtige en vreemde uitwasemingen besmetten en de Doorwaseming verhinderen, onthouden. Intusschen is Jenever in den brand gestoken, zeer voordeelig; daardoor word de Lucht in het vertrek verdund, en de schadelijke Deelen zakken naar den grond.

Het Kind moet in geen Vederbed gebroeid worden, maar men moet het op eene Matras van Stroo leggen, en er verscheiden bij de hand hebben, om dezelve, als zij door de Pis nat geworden zijn, te verschoonen. — Vooral moeten de Ouders zorgen, dat de Kinderen niet lang met nat Linnen, of in een Bed,

(6) Door dit Middel alleen is de Scorbut, die in het Munsterfche Rasphuis zeer sterk heerschte, geheel verdreven, C. L. HOFMANN. Zie de Verhandeling van SCHARBOCK.

Bed liggen, dat door de Pis vogtig is geworden, zij moeten altijd met nieuwe verwisfeld, en het vogtige buiten het vertrek gedroogd worden.

Wat het Voedsel aangaat, dat niet zelden de Aanleidende Oorzaak deezer Ziekte is, daarop moet men naauwkeurig agt geven; de Moeder-Melk is, zo als ik te voren reeds heb aangetoond, het beste voedsel voor jonggeboren Kinderen; en kan de Moeder zelve het Kind niet zogen, dan moet men zich van eene gezonde sterke Minne voorzien, die bijna gelijktijdig met de Moeder bevallen is, want niets is voor een Kind schadelijker dan oud Zog van eene bejaarde Minne. — Zijn de Kinderen boven het half jaar oud, dan is een teug rode Wijn en zagte Specerijen, bij een uit Melk en Beschuit gemaakte Pap gemengt, met herhaalde Wrijvingen van het Lighaam zeer nuttig.

VIJTIENDE HOOFD-DEEL.

Geneeswijze der Engelsche Ziekte.

Bij de Genezing deezer Ziekte moet men haare twee Tijperken wel in agt neemen.

Het eerste is: wanneer men vermagering van het Lighaam en Loomheid bespeurt, de Buik opzet, de Uitwaseming Zuur riekt, en de Buiksonstlasting groen is. —

is. — *Het tweede*: Als deeze Toevallen verergeren; de einden der Beenderen zwellen en die der Ribben knobbelig worden; het bovenste gedeelte van het Voorhoofds-been uitpuilt; het Hoofd grooter word en naar een der Zijden overhelt; de Buiksontlasting opstopt, en de Beenderen krom worden, en er eindelijk een Sluipkoortsje en sterk Zuurriekend Zweet bijkomt.

In het eerste Tijdperk heeft men geene Geneesmiddelen nodig, doordien eene goede levenswijze gewoonlijk tot herstel der gezondheid voldoende is: men moet dus deeze Kinderen voor eene vogtige warme Luchtsgesteldheid behoeden, en, ten opzichte van hun verblijfplaats, zo handelen, als ik te voren heb opgegeven.

In het begin der Ziekte is de Gal dun, en tot de Spijsverteering ongeschikt, egter ontbreekt zij niet geheel en al; dit immers bewijzen de groene Buiksontlastingen, vermits de Gal met het Zuur vermengd, een groenen kleur aanneemt.

Men moet dus in dit Tijdperk der Ziekte, den Kinderen met den eersten de Melk onthouden; zo wel de Moeder-melk als die der Dieren, doordien die onverteerd zijnde, Zuur word, en dus de Ziekte verergert.

Ook is de Bouillon en Beschuit, in Water geweekt, deezen Kinderen nadeelig; vermits de onder-

dervinding geleerd heeft, dat deeze spoedig eene Zuure gisting ondergaan, en dus, door de wateragtige Gal niet te ondergebragt zijnde, aanleiding geven tot verergering der Ziekte.

Het beste voedsel, en dat zijns gelijk niet heeft, dat men in dit Tijdperk der Ziekte deezen Kinderen kan geven, is eene zogenaamde Amandel-melk, (*Emulsie*), die uit een Doijer van een Eij met een weinig Zuiker, in een pond Water gewreven, gemaakt is, die hun tot gewonen drank gegeven word. In de eerste levensmaanden is deeze, door konst bereiden, Melk, voldoende, en daar is niets meer tot de voeding nodig; maar is het Kind ouder, dan kan men het ook het Wit van het Eij geven, dat met Zuiker gewreven is; men moet intusschen zorgvuldig toezien, dat men het Kind geen Groenten geeft, of zulke Spijzen, die in de Maag Zuur worden; liefst moet men den Kinderen Vleesch geven, dat eerder tot de Rotting overgaat, als tot Zuure gisting.

Ik heb dikwerf de beste uitwerking van zulk een Voedsel, dat uit Hoender - Eijeren bereid word, gezien; daardoor heb ik de Zuure Oprispingen en groenen Buikloop spoedig overwonnen; de slappe Lighaams gesteldheid was, buiten verwagting, ras verdwenen, en de vorige gezondheid en vlugheid der Ledematen hersteld, en men zal zich hierover niet ver-

verwonderen, als men overweegt, dat de kragten ter verteering der Spijzen in de Kinderen zwak zijn, en dat er niets moeilijker te verteeren is dan de Planten-Zuuren, die de eenigste zijn, welke, na de Spijsverteering, in een gezond Mensch geheel onveranderd gevonden worden. — Dan de Hoender-eijeren verzuuren nimmer, maar, als zij bederven, zo verrotten ze; zij hebben dus in de Maag der Kinderen zo veele kragten niet nodig tot hunne verteering, doordien derzelver Hoofdstoffen reeds van zelfs tot de voeding des Lighaams geschikt zijn, en dus geene verdere verteering ofte verandering nodig hebben.

Daar ik nu in de Genezing der Ziekte alle Groenten, Melkkost, Vleeschfoupen en Beschuitpappen als schadelijk veroordeele en verbiede; zo verkieze ik egter, als het Kind meer dan een half jaar oud is, en tot de voeding meer voedsel nodig heeft, boven ander eeten, Malsch Vleesch, zo toebereid, dat het gemakkelijk kan gebruikt worden, hiertoe behoort vooral de *Commistio Alba* CLERCKII, die ik egter dus verandere, dat ze voor deeze Ziekte meer geschikt zij; ik laat namelijk, één Once wit Capoenen of Hoender Vleesch, zonder vel of ver, met twee Doijers van Eijeren, en één pond zuiver Water in een Mortier zamen wrijven, en doe er als dan voor den aangename smaak Olie van Citroenschil-

schillen met Zuiker gewreven (*Elæosaccharum Ci- tri*) bij; waarvan ik drie of viermaal des daags eene genoegsame hoeveelheid aan het Kind laat toedienen; zij gebruiken het gemakkelijk en verteeren het zeer gemakkelijk, wordende daardoor de Lighaamskragten en de gezondheid spoedig hersteld.

Hier helpen geene Geneesmiddelen, die men den Kinderen zeer bezwaarlijk kan inkrijgen, en die ook zeer zelden de Eerste Oorzaak der Ziekte wegnemen.

De meeste Geneesheeren doen zeer kwalijk, wanneer zij de Zuure Oprispingen en herhaalde Zuure Buikontlastingen ziende, zich alleenlijk tot de ontlasting der Drekstoffen bepalen; en hun herhaalde Purgatien uit Rhabarber, Spaansche Zeep of andere Buikzuiverende Middelen toedienen. — Hierdoor immers neemen zij de Oorzaak der Ziekte niet weg; maar integendeel word de kwaal door deeze Middelen erger, en zal gedurig weder bespeurd worden, zodra men met de Buikontlastende Middelen ophoud; daarenboven worden de Ingewanden door deeze Geneeswijze zeer verzwakt, de kragten der Spijsverteering verbroken, en dus laten ze de Ziekte in veel slijmer staat.

Ik wil egter niet stellen, dat in deeze Ziekte nimmer Buikzuiverende Middelen nodig zijn: er zijn zelfs zommige gevallen, waarin ze zeer dienstig

M

zijn,

zijn, vooral wanneer veele Wormen de Darmen sterk Prikkelen. — Zijn 'er tekenen van Wormen, dan geve ik of een afkookfel van het Wormkruid, of Osfengal, in Water ontbonden, met Honig; en daarna laat ik ze eene Emulsie gebruiken uit drie tot vijf grein van de Resina Jalappæ, met eene genoegsame hoeveelheid van Eijerdoijers; van dit Middel egter bediene ik mij nimmer buiten noodzakelijkheid; ook niet, wanneer er Wormen geloosd worden, daar het mij niet onbekend is, dat zij uit bedorven Darmslim voortkomen, en dus een gewrogt der Ziekte zijn, dat niet, dan na wegneeming der Oorzaak, ophoud.

Alle Baden zijn voor deeze Kinderen zeer nadelig, dan het is zeer nuttig, hen dikwerf schielijk in koud Water te dompelen, en zeer spoedig uittrekken; daarna het Lighaam met een Wollen Lap te wrijven; want hier door herkrijgen de slappe Deelen hunne veerkragt, en de Prikkelbaarheid vermeerderd.

Wanneer de Ziekte in haar Tweede Tijdperk is ingetreden, dan toonen de week geworden en gezwollen Beenderen niet alleen eene grote slapheid der werktuiglijke Deelen aan, maar ook dat de geheele Voeding bedorven is. — Want, daar de Aarddeelen ontbreken, zo word er een bedorven Slijm in de Cellen gebragt, het geen de slijmige Korst, die de Beenderen bedekt, klaar bewijst.

In de Geneezing van dit Tijdperk moet men op twee aanwijzingen agt geven: *Voor eerst*; dat de Naaste Oorzaak der Ziekte worde weggenomen; *vervolgens*; dat de zo zeer verzwakte Deelen des Ligbaams gesterkt worden; hiertoe moet men omtrent het afweeren der Uitwendige Oorzaken en de Levenswijze het zelfde in agt neemen, dat ik tot behoeding der Ziekte aangeraden, en in het Eerste Tijdperk der Ziekte aangeprezen heb.

Daarna moet men door Bittere, Zamenrekkende Middelen de Geneezing volmaken; onder deeze zijn de bittere Kruiden, Basten en Wortels, door verscheiden Geneesheeren in deeze Ziekte aangeprezen, en waarvan ik te voren de voornaamsten gemeld hebbe.

De Tincturen egter en Extracten, die uit deeze Planten bereid worden, zijn verre te verkiezen boven derzelver gebruik in substantie, vermits het Poeder; in de Maag en Darmen, in de bedorven slijm als omwonden, onverteerd geloosd word. — De *Tinctura Rhei Aquosa*; het *Extractum Corticis Peruviani*, *Gentianæ*, *Trifolii Fibrini*, &c. zijn uitmuntend; men geeft ze in Water ontbonden; met eene bijgevoegde Sijroop: men moet dezelve in zo eene hoeveelheid toedienen, dat er de Buikontlasting niet door bevorderd worde; nadien dit meer schade dan nut zoude toebrengen, vermits

daardoor veel Vogten naar de Ingewanden gelokt en geloosd worden.

Maar onder alle de Middelen voor de Engelsche Ziekte zijn de voornaamsten, de *Staal-Middelen*; want daar de kragten der Spijsverteering in deeze Lijders zo zeer verzwakt zijn, zo worden alle Planten, en zelfs de Extracten der bittere Planten, door hun langer verblijf in het Gedarmte, Zuur.

Dan de Middelen, die uit het Staal bereid worden, verdienen daarom de voorkeur. *Voor eerst*: om dat zij geen Zuur veroorzaken, maar het zelve eerder opslurpen; *ten tweeden*: om dat zij, in Zuuren ontbonden, het allersterkst zamentrekkend en versterkend Geneesmiddel uitmaken; *ten derden*: om dat zij, met Zuuren vereenigd, zeer veel Phlogiston uitlaten, het geen in het Lighaam van een Kind, dat de Engelsche Ziekte heeft, vooral vereischt word.

En daarom offchoon ik niet ontkenne, dat het Staal, in Plantfappen of in Wijn ontbonden, allergewenschte uitwerkingen in deeze Ziekte heeft, is het, dat ik het Staal in substantie verkies; en ik late de *Limatura Martis Alcoholifata*, drie of viermaal daags, van twee tot tien grein, gemengd met Pap en met Geneesmiddelen, uit het Dierenrijk genomen, ingeven. — De Staalwateren, als die van Pijrmout, Swalbach, Ems en anderen worden daar-

om

om te regt ter geneezing deezer Ziekte aan te prezen; vermits het Staal alleen in het Lugt-Zuur ontbonden, nog veel Phlogiston bevat, en zich met de rauwe Zuuren, die in de eerste Wegen der Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, gevonden worden, met het overgebleven Lucht-Zuur, gemakkelijk vereenigen.

Wanneer een Kind, dat de Engelsche Ziekte heeft, reeds Tand en heeft, moet men zorg dragen, dat deeze door Beenbederf (*Caries*) niet aangedaan worden; daar dog de adem deezer Lijders met veele Zuurdeelen bezwangerd is en de zuure Dampen de verglaasde Korst der Tand en wegvreeten, is dit de eenige Oorzaak, dat de Tand en geheel verteeren, zo als de vermaarde WEDERKIND dit in het breede heeft aange- toond (8). Zij kunnen echter voor het bederf ligt be- hoed worden, als zij twee of driemaal daags met een opslurpend of loogzoutig Tand - Poeder gewreven worden; tot dat einde heeft hij een Poeder voorge- schreven uit Rood Coraal en den Calmus Wortel (*Calamus Aromaticus*,) van ieder een half Once; of gebrande Korst van Brood met Tabaksasche; of (*Oleum tartari per deliquium*) met Water gelengd (9), door welke verzagtende Middelen de Tand en zeer kragtig tegen het bederf worden voorbehoed.

Als

(8) Aufsatzen über verschiedene wichtige Gegenstände der Arznei - Wissenschaft. Pag. 382.

(9) Ibidem pag. 385.

Als een Kind, dat de Engelsche Ziekte heeft, dikwijls aan den Afgang is, dan moet die of door bittere Geneesmiddelen, of door eene ruime teug Kalkwater gestopt worden, op dat door het verlies van zo veel Vochten de Ziekte niet dag aan dag toeneeme.

Maar heeft het bij aanhoudenheid geen ontlasting, dan moet men de Tinctuur van Rhabarber met den Staalwijn geeven, om de veerkragt der Darmen te herstellen; vooral verdienen de dompelingen in koud Water en dikwijls herhaalde Wrijvingen zeer te werden aangeprezen.



UITLEGGING

D E R

P L A A T.

OFSCHOON het overtollig moge schijnen, deeze Verhandeling over de Engelsche Ziekte met een Plaat optehelderen; vreeze ik echter zeer, dat men, het geene ik omtrent den bijzonderen aart der Beenderen, die door de Engelsche Ziekte zijn aangedaan, gezegt hebbe, niet genoeg verstaan zal, daar ik niet wete, dat deeze Waarneemingen, die van het grootste belang zijn, tot dusverre door een Geneeskundigen gedaan of uitgegeven zijn; en daarom vertoont

I. Afb. het Voorhoofds-Been van een gezond Kind, dat bijna drie maanden oud is; op dat daardoor de vastigheid en natuurlijke dikte van het geheele Been blijke; maar vooral, op dat de waare staat van den Voorhoofds-Naad, zo als die in dien leeftijd nog aanwezig is, gezien werde.

II.

II. Afd. vertoont het Voorhoofdsbeen van een Kind van gelijken ouderdom, dat de Engelsche Ziekte heeft: hier doet zig aanstonds op

a.) dit Sponsagtig maakzel, het welk zo wel aan het uitwendig gedeelte van het Bekkeneel, als

b.) aan de inwendige zijde van het Voorhoofdsbeen te zien is. Ik heb te voren (in het *III Hoofdeel*) reeds gezegt, dat dit Sponsagtig maakzel grootendeels zijn oorsprong heeft van de slijmagtige boventallige Plaat, die op de vastere en meer zamengepakte Been-Plaatjes ligt.

c. c.) zijn de einden van deeze Plaat, die langzamerhand dunner geworden, daar, waar de zelfstandigheid der Beenderen vaster word, eindigt.

d. d.) Vooral verdient onzen aandacht de tegennaaturlijke dikte van den Naad, dewelke, vergeleken met die van een gezond Kind, in

Afb. I. afgetekend, driemaal dikker is. — Hier terplaatze is het maakfel van het Been zeer Sponsagtig en door Holletjes en Poren, die er tusfchen beiden zijn, duidelijk te zien: grooten deels word het uit overtallige plaatjes geformd, zo als de

III. Afb. aantoont, waarin het zelfde Voorhoofdsbeen voorkomt, met deszelfs inwendige holle Zijde, opdat de overtollige Plaat zig vertoone.

Te weten: als men den Voorhoofds-Naad beziet, dan zal men bemerken, dat en het uitwendige bolle
ge-

gedeelte van het Bekkeneel en het inwendige holle gedeelte met deze Plaat of liever met dit slijmig Vlies bekleed word.

Ik heb daarom beide deze, aan het beenig Bèkkeneel vast gehegte, Vliezen met een Mes afgescheiden, en hier doen afbeelden; men ziet het in deze Afbeelding, als men den Voorhoofds-Naad beziet.

a. a.) Is de uitwendige slijmige Plaat, die door haare wiragtige en poreuse zelfstandigheid zig van het onderliggende vaster Been ligtelijk onderscheidt.

Voor al vertoont zig de slijmige Korst, die geheel de inwendige oppervlakte des Voorhoofdbeens bedekt, zeer zigbaar.

b. b.) Hier is dezelve gedeeltelijk omgeslagen, op dat, na het wegneemen daar van, de waare inwendige en vastere Been-Plaat zig vertoone.

De dikte van deze bastaard of valsche Korst is zo aanmerkelijk, dat zij bijna de helft der dikte van den Naad uitmaakt; zij is Poreus en zeer Sponsagtig, en dunner geworden, eindigt ze aan de Ooghokten: — daar, waar ik ze doorgesneden heb, heeft zij bijna de dikte van drie Lijnen, en, waar ze aan de inwendige Plaat van het Been vastzit, is ze vol holligheden en vertoont een zeer ijl maakzel.

De Beenderen, die door de Engelsche Ziekte zijn aangedaan, die ik hier heb afgebeeld, heb ik reeds ten minsten een jaar, in gelengde Brandewijn, die met

met eenige Koperdeeltjes bezwangerd was, bewaard; het Zuur, waarin ik de Koperdeeltjes in opgelost heb, zig met de Kalkaarde van het Been vereenigd, en de Koperdeeltjes losgelaten hebbende, heeft het Been eene groener kleur gekregen, daar de slijmige Korst, op het groene been liggende, is wit gebleven.

Wanneer de Engelsche Ziekte over is, en de voeding van het Lighaam hersteld word, dan worden deeze slijmige Lagen, die de meeste Beenderen des Lighaams, die door deeze Ziekte aangedaan zijn, dekt, spoedig met eene groote hoeveelheid van Aardstoffe gevuld, en in een zeer vast Been veranderd.

Hierdoor worden de Beenderen, die te voren door de Engelsche Ziekte waren aangedaan, naderhand zeer vast en als IJvoor. — Ik heb een Bekkeneel van eene Vrouw van 50 jaaren oud, die in haaren jeugd de Engelsche Ziekte had gehad, dat meer dan een duim dik is en geheel en al uit eene vaste beenige zelfstandigheid bestaat, dat zeer zwaar weegt. In de verzameling der Keijzerlijke Academie der Natuuronderzoekeren te Erford word er een bewaard, dat nog dikker en veel zwaarer is.

IV. Afb. vertoont het Agterhoofdsbeen van een vijfjarigen Jongen, die lang aan de Engelsche Ziekte gekwijnend had, en daarna aan eene andere Ziekte is gestorven.

De

De mismaaktheid van dit Been, die door de Engelsche Ziekte is veroorzaakt, is zeer opmerkelijk.

a. a. b. b. zijn duidelijke overblijfselen, waardoor

B. B. de Knokvormige gedeelten van het Agterhoofds-Been (*Partes Condijloidea*) van

A. deszelfs Wiggebeensuiteekfel, en van het

C. Agterhoofds gedeelte gescheiden worden.

De Knokvormige gedeelten ziet men aan de inwendige zijde, digt bij het Agterhoofdsgat, geheel ingedrukt, zo dat er van weerskanten

d. d. eene zeer aanmerkelijke groeve is, die maakt, dat de Kraakbeenige zamenvoegingen

a. a. b. b. van den anderen verwijderd, nog niet tot een doorgaand Been vereenigd zijn.

Deze tegennatuurlijke indrukking der Knokvormige gedeelten moet noodwendig ten gevolge hebben, dat de kleine Hersfenen en de Ringwijze Uitpuiling der groote Hersfenen gedrukt worden; in deeze verandering der deelen moet men de reders zoeken, waarom men in Kinderen, die de Engelsche Ziekte hebben, niet zelden eene stomphheid van Geest bespeurd, vermits hierdoor de edelste gedeelten van de Hersfenen aangedaan worden.

Voor 't overige, wanneer de Ziekte niet veel jaren geduurd heeft, zal men zulk eene groote wanftakigheid

heid van het Bekkeneel niet vinden; in tegendeel zal de meerderſe groote van het Hoofd maken, dat menſchen, die te voren door deeze Ziekte zijn aangerast geweest, nu in verſtand en ſchanderheid uitmunten.

E I N D E.

